

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2008-520212

(P2008-520212A)

(43) 公表日 平成20年6月19日(2008.6.19)

(51) Int.Cl.		F I		テーマコード (参考)
C 1 2 Q 1/68 (2006.01)		C 1 2 Q	1/68 Z N A A	4 B O 2 4
C 1 2 N 15/09 (2006.01)		C 1 2 N	15/00 A	4 B O 6 3

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 21 頁)


(21) 出願番号	特願2007-541638 (P2007-541638)	(71) 出願人	507060099 北京博奥生物芯片有限▲責▼任公司 中国北京市昌平区生命科学▲園▼路18号 ， 1 0 2 2 0 6
(86) (22) 出願日	平成16年11月23日 (2004.11.23)	(71) 出願人	507061421 清▲華▼大学 中国北京市▲海▼淀区清▲華▼大学， 1 0 0 0 8 4
(85) 翻訳文提出日	平成19年5月15日 (2007.5.15)	(74) 代理人	100078282 弁理士 山本 秀策
(86) 国際出願番号	PCT/CN2004/001340	(74) 代理人	100062409 弁理士 安村 高明
(87) 国際公開番号	W02006/053463	(74) 代理人	100113413 弁理士 森下 夏樹
(87) 国際公開日	平成18年5月26日 (2006.5.26)		
(31) 優先権主張番号	200410090423.3		
(32) 優先日	平成16年11月18日 (2004.11.18)		
(33) 優先権主張国	中国 (CN)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 バイオチップをベースにした核酸結合タンパク質の試験方法

(57) 【要約】

バイオチップをベースにした、核酸結合タンパク質の試験方法は、以下の工程を包含する：1. 試験されるべき複数の核酸結合タンパク質を含む生物学的サンプルに、核酸捕捉プローブを含む複数のグループの溶液を入れ、このようにして、核酸捕捉プローブ - 核酸結合タンパク質複合体を形成する工程であって；このような核酸捕捉プローブは、目的の核酸結合タンパク質と結合し得る結合配列の少なくともあるセグメントを含む、工程；2. このような核酸捕捉プローブ - 核酸結合タンパク質複合体を分離し、次いで、核酸捕捉プローブを回収する工程；3. 工程2に記載の核酸捕捉プローブを、バイオチップの基板上にある複数の一本鎖プロットングプローブとハイブリダイズさせる工程であって；このようなプロットングプローブの配列は、このような核酸捕捉プローブまたは、その鎖の片方と補償する、工程；4. ハイブリダイゼーションの結果を検出する工程。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

バイオチップをベースにした核酸結合タンパク質を検出するための方法であって、該方法は、以下：

1) 数種のグループの核酸捕捉プローブを含有する溶液を、標的核酸結合タンパク質を含有する生物学的サンプルに加える工程であって、該工程によって、該核酸捕捉プローブと該核酸結合タンパク質との間で複合体が形成され、該核酸捕捉プローブは、少なくとも1つの該標的核酸結合タンパク質が結合し得る配列を含む、工程；

2) 該核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を単離して、該複合体中の該核酸捕捉プローブを収集する工程；

3) 工程2)において収集した捕捉プローブを、バイオチップの基板上に固定化した一本鎖固定化プローブとハイブリダイズさせる工程であって、該固定化プローブは、対応する核酸捕捉プローブ、または、該核酸捕捉プローブの一本の鎖に対して相補的な配列を含む、工程；および

4) 該ハイブリダイゼーションの結果を検出する工程を包含する、方法。

【請求項 2】

請求項1に記載の方法であって、前記工程2)における核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を単離する工程が、前記工程1)からの混合物サンプルをゲル電気泳動し、ゲルスライスを切り出し、そして、ゲル精製もしくは電気溶出法によって回収して、単離された核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を得るプロセスである、方法。

【請求項 3】

請求項1に記載の方法であって、前記工程2)における核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を単離する工程が、前記工程1)からの混合物サンプルをクロマトグラフィーに供し、単離された核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を得る工程である、方法。

【請求項 4】

請求項1に記載の方法であって、前記工程2)における核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を単離する工程が、前記工程1)からの混合物サンプルを、タンパク質を吸着し得る膜を用いて濾過して、単離された核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を得る工程である、方法。

【請求項 5】

請求項1に記載の方法であって、前記工程2)における核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を単離する工程が、各核酸結合タンパク質を特異的に認識する抗体を前記工程1)からの混合物サンプルに加え、そして、抗体精製法により単離して、単離された核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を得るプロセスである、方法。

【請求項 6】

請求項1に記載の方法であって、前記工程2)における核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を単離する工程が、キャピラリー電気泳動によって前記工程1)からの混合物サンプルを分離し、そして、該核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を収集するプロセスである、方法。

【請求項 7】

請求項1に記載の方法であって、前記核酸結合タンパク質が、二本鎖DNA (dsDNA) 結合タンパク質、RNA結合タンパク質、一本鎖DNA (ssDNA) 結合タンパク質、または、試験管内進化法によって生成された天然に存在しないタンパク質結合核酸アプタマーである、方法。

【請求項 8】

前記dsDNA結合タンパク質が、転写因子である、請求項7に記載の方法。

【請求項 9】

前記核酸捕捉プローブが、核酸結合タンパク質によって結合され得る核酸配列を含む、請

10

20

30

40

50

求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 10】

各グループの前記核酸捕捉プローブの一本の鎖が、突出末端配列を有する、請求項 9 に記載の方法。

【請求項 11】

各固定化プローブが、その対応する核酸捕捉プローブの突出末端配列に対して相補的である、請求項 10 に記載の方法。

【請求項 12】

前記核酸捕捉プローブの突出末端が、標識分子によって標識されている、請求項 11 に記載の方法。

10

【請求項 13】

前記標識分子が、ビオチン、ジゴキシン、蛍光色素、量子ドット、金粒子、またはナノ粒子である、請求項 12 に記載の方法。

【請求項 14】

請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の方法であって、各グループの前記核酸捕捉プローブの一本の鎖が、3' 突出末端を含み、そして、前記工程 3) のハイブリダイゼーションの前に、前記収集された核酸捕捉プローブを増幅するための、プライマーを用いた増幅プロセスが行われ、該プライマーは、該核酸捕捉プローブの 3' 突出末端配列にハイブリダイズし得る、方法。

【請求項 15】

請求項 14 に記載の方法であって、前記 3' 突出末端を有する核酸捕捉プローブの各グループにおける 3' 突出末端配列は同一であり、そして、前記プライマーの配列は、該 3' 突出末端配列に対して完全に相補的である、方法。

20

【請求項 16】

前記プライマーを増幅のために使用する場合、該プライマーは、標識分子で標識される、請求項 15 に記載の方法。

【請求項 17】

前記プライマーの 5' 末端が標識される、請求項 16 に記載の方法。

【請求項 18】

前記標識分子が、ビオチン、ジゴキシン、蛍光色素、量子ドット、金粒子、またはナノ粒子である、請求項 18 に記載の方法。

30

【請求項 19】

前記プライマーを増幅のために使用する場合、標識分子で標識されたヌクレオチドが、前記増幅プロセスに加えられる、請求項 15 に記載の方法。

【請求項 20】

前記標識分子が、ビオチン、ジゴキシン、蛍光色素、量子ドット、金粒子、またはナノ粒子である、請求項 19 に記載の方法。

【請求項 21】

請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の方法であって、各グループの前記捕捉プローブの一本の鎖が、前記 3' 突出末端および 5' 突出末端を含み、そして、前記工程 3) のハイブリダイゼーションの前に、前記収集された核酸捕捉プローブを増幅するための、2つのプライマーを用いた増幅プロセスが行われ、該プライマーの一方は、3' 突出末端および 5' 突出末端を含む該核酸捕捉プローブの 3' 突出末端配列にハイブリダイズし得、該プライマーのもう一方は、3' 突出末端および 5' 突出末端を含む該核酸捕捉プローブの 5' 突出末端配列と同一の配列を含む、方法。

40

【請求項 22】

請求項 21 に記載の方法であって、前記 3' 突出末端および 5' 突出末端を含む各核酸捕捉プローブの 3' 突出末端配列が同一であり；かつ、前記 3' 突出末端および 5' 突出末端を含む各核酸捕捉プローブの 5' 突出末端配列が同一であり、前記プライマーの一方は、3' 突出末端および 5' 突出末端を含む該核酸捕捉プローブの 3' 突出末端配列にハイ

50

ブリダイズし得、前記プライマーのもう一方は、3'突出末端および5'突出末端を含む該核酸捕捉プローブの5'突出末端配列と同一の配列を含む、方法。

【請求項23】

前記2つのプライマーを増幅のために使用する場合、前記プライマーは標識分子で標識される、請求項22に記載の方法。

【請求項24】

前記プライマーの5'末端が標識される、請求項23に記載の方法。

【請求項25】

前記標識分子は、ビオチン、ジゴキシン、蛍光色素、量子ドット、金粒子、またはナノ粒子である、請求項24に記載の方法。

10

【請求項26】

前記2つのプライマーを増幅のために使用する場合、標識分子で標識されたヌクレオチドが、前記増幅プロセスに加えられる、請求項22に記載の方法。

【請求項27】

前記標識分子は、ビオチン、ジゴキシン、蛍光色素、量子ドット、金粒子、またはナノ粒子である、請求項26に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、核酸結合タンパク質を検出するための方法、特に、バイオチップをベースにした核酸結合タンパク質を検出するための方法を開示する。

20

【背景技術】

【0002】

(背景)

核酸結合タンパク質は、二本鎖DNA(dsDNA)結合タンパク質、一本鎖DNA(ssDNA)結合タンパク質、およびRNA結合タンパク質などを含む。

【0003】

dsDNA結合タンパク質は、dsDNAの特定の配列に結合する、タンパク質またはタンパク質分子複合体のグループである。dsDNA結合タンパク質は、源核生物のリプレッサータンパク質およびオペレータータンパク質、ならびに、真核生物の転写因子(TF)などを含む。これらのdsDNA結合タンパク質は、dsDNAの特定の配列(オペレーター/プロモーター)への結合によって、標的遺伝子の発現を活性化、阻害、減少または増強し得る。原核生物において、リプレッサータンパク質およびオペレータータンパク質の機能は、比較的単純である。これらは、細胞の代謝に関する酵素をコードする遺伝子、および、抗生物質耐性遺伝子を調節して、外部環境に対する細胞の生理学的な活性を調節する。真核生物において、転写因子は、多くの活動に関与する。細胞周期、アポトーシスおよび腫瘍新生などは、全て、特定の転写因子に関連する。生物系、特に、真核生物の遺伝子発現調節ネットワークにおいて、遺伝子をコードするタンパク質の発現としては、転写因子を介した転写の活性化、転写、転写後修飾(スプライシング、ならびに、RNAの5'および3'のキャッピング)、翻訳、翻訳後修飾(リン酸化、グリコシル化、アセチル化など)が挙げられ、そして、転写前、転写後、および翻訳後の段階で調節される。

30

40

【0004】

転写因子による転写の活性化は、遺伝子発現調節ネットワークにおける最初でかつ重要な段階である。外部環境に対する生物系のストレス応答の多くは、特定の転写因子による、特定の遺伝子の活性化または停止を伴う。研究は、多くの真核生物の遺伝子の発現が、1以上の特定の転写因子によって調節されることを示す。より複雑な生物は、より多くの転写因子と、より複雑な遺伝子発現調節機構を有する。推定すると、5%より多くのタンパク質をコードする遺伝子が、転写因子をコードする。多くの転写因子は、癌に密接に関連する。例えば、いくつかの転写因子(例えば、FOSおよびC-Myc)は、悪性腫瘍

50

のみで発現されるか、または、癌遺伝子の発現を増強し得る；他の転写因子（例えば、p53およびE2F）は、弱く発現するか、または、悪性腫瘍においては発現しない。従って、生物における特定の転写因子、または、全ての転写因子のレベルをある時点で検出することは、それらの標的遺伝子のデータと組み合わせ、転写前の調節情報を得ることを可能にする。この情報は、組織における腫瘍新生を診断したり、薬物標的をスクリーニングしたり、細胞のストレス応答機構を研究したり、細胞のシグナル伝達経路の活性化および停止を観察したりするなどのために使用され得る。

【0005】

cDNAマイクロアレイ技術は、ゲノムの遺伝子をコードする全ての転写因子のmRNAプロファイリングを提供することを可能にする。しかしながら、活性な転写因子のみが、遺伝子発現の調節に寄与する。転写因子の活性は、通常、リン酸化、アセチル化、グリコシル化などを含む多数のタンパク質修飾、または、転写因子の細胞内局在化によって調節される。従って、活性な転写因子の量は、転写因子のmRNAまたはタンパク質の量と必ずしも相関するわけではない。例えば、転写因子Yin Yang 1 (YY1)のmRNAおよびタンパク質の発現レベルは、細胞周期の間、安定しているが、活性なYY1のレベルは、異なる細胞周期の段階において、大きく変化する。従って、cDNAマイクロアレイ技術は、研究者が興味を抱く転写因子の発現情報を提供することができない。

【0006】

「活性な」dsDNA結合タンパク質を検出するための従来の方法は、ゲルシフト法（EMSA：電気泳動移動度シフトアッセイ、ゲルシフト、バンドシフト）である。試験されるタンパク質は、放射性同位元素で標識された既知のdsDNA分子と混合される。反応生成物は、非変性条件下で、ポリアクリルアミドゲル電気泳動により解析される。電気泳動の間に、タンパク質により結合されるdsDNA分子は、タンパク質によって結合されていないdsDNA分子よりも遅く泳動される。電気泳動の後、結果は、オートラジオグラフィーによって読み取られ得る。フィルム上では、分離した電気泳動バンドが見られ得、そして、dsDNAと核酸結合タンパク質との間の結合を検出するために使用される。近年、ゲルシフト技術は向上している。例えば、放射性同位元素の代わりに蛍光が使用されている。非特異的な結合を解決するために、dsDNA結合タンパク質に特異的な抗体を用いて、DNA-タンパク質複合体を検出する。この方法は、スーパーシフト（Super-shift）と呼ばれる。ゲルシフト法は、DNAとタンパク質との間の相互作用の研究を促進した。しかし、この方法は明らかな欠点を有する：この方法は、複雑な手順を伴い；時間と労力がかかり（実験には丸一日かかる）；スループットが低く（一度に、1つのdsDNA結合タンパク質のみが検出される）；複数のdsDNA結合タンパク質が検出されるべき場合、大量のサンプルを必要とし；放射性同位元素が使用される場合、人間に対して有害であり；そして、化学色素もしくは蛍光色素が使用される場合、高額なものとなる。

【0007】

MercuryTM転写因子キットは、BD Biosciences Clontech Inc. (Palo Alto, CA)の製品である。このキットは、転写因子の検出のための96ウェルプレートを提供する。1つの転写因子によって特異的に結合され得るdsDNAプローブが、各ウェルの内面上に固定化される。タンパク質サンプルがウェル内に加えられた後、固定化されたdsDNAプローブが、サンプル内の対応する転写因子と結合する。洗浄した後、転写因子を特異的に認識する一次抗体と、この一次抗体を特異的に認識する、酵素標識した二次抗体が、一つ一つ加えられる。化学色素が、アッセイの検出のために使用される。この方法は、従来EMSA法よりも速く、そして、生体に有害な放射性同位元素の代わりに化学色素が使用される。しかし、この方法は、依然としてスループットの低い方法であり、1つのウェル内で常に、1つの転写因子のみが試験され得る。多数のdsDNA結合タンパク質を検出するためには、大量のサンプルが必要とされる。転写因子特異的な抗体に対する必要性があり、そして、この転写因子抗体の多くは、市販されていない。

10

20

30

40

50

【0008】

生物系において生理的な活動を調節する、いくつかの配列特異的な ssDNA 結合タンパク質および RNA 結合タンパク質が存在する。ますます多くの、標的のタンパク質分子の特異的に結合し得る「抗体様」アプタマーが、近年の試験管内進化 (in vitro evolution) 法により獲得されている。これらの核酸結合タンパク質を検出するためのハイスループット法は存在しない。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

本発明の目的は、バイオチップをベースにした、ハイスループットで、高感度で、かつ、特異的な、核酸結合タンパク質の検出方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0010】

(発明の開示)

本発明は、バイオチップをベースにした、核酸結合タンパク質の検出方法を提供し、この方法は、以下の工程を包含する：1) 数種のグループの核酸捕捉プローブを含有する溶液を、標的核酸結合タンパク質を含有する生物学的サンプルに加える工程であって、この工程によって、核酸捕捉プローブと核酸結合タンパク質との間で複合体が形成され、この核酸捕捉プローブは、少なくとも1つの標的核酸結合タンパク質が結合し得る配列を含む、工程；2) 核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を単離して、複合体中の核酸捕捉プローブを収集する工程；3) 工程2)において収集した捕捉プローブを、バイオチップの基板上に固定化した一本鎖固定化プローブとハイブリダイズさせる工程であって、この固定化プローブは、対応する核酸捕捉プローブ、または、核酸捕捉プローブの一本の鎖に対して相補的な配列を含む、工程；および、4) ハイブリダイゼーションの結果を検出する工程。

【0011】

いくつかの実施形態において、工程2)における核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を単離する工程は、以下に記載される5つのプロセスのいずれかを用いて行われ得る：a) 工程1)からの混合物サンプルをゲル電気泳動し、ゲルスライスを切り出し、そして、ゲル精製もしくは電気溶出法によって回収して、単離された核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を得る；b) 工程1)からの混合物サンプルをクロマトグラフィーに供し、単離された核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を得る；c) 工程1)からの混合物サンプルを、タンパク質を吸着し得る膜を用いて濾過して、単離された核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を得る；d) 各核酸結合タンパク質を特異的に認識する抗体を工程1)からの混合物サンプルに加え、そして、抗体精製法(例えば、抗体に結合させるために、プロテインA/Gコーティングアガロースビーズを用いる)により単離して、単離された核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を得る；ならびに、e) キャピラリー電気泳動装置によって工程1)からの混合物サンプルを分離し、そして、核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体を自動的に収集する。

【0012】

いくつかの実施形態において、本発明(「末端標識法」と呼ぶ)は、核酸結合タンパク質(例えば、dsDNA 結合タンパク質、ssDNA 結合タンパク質、RNA 結合タンパク質(例えば、HuB、HuC、ELAVなど)、試験管内進化法によって生成された天然に存在しないタンパク質結合核酸アプタマー(例えば、トロンピンアプタマー))を検出するために使用される。

【0013】

好ましくは、核酸結合タンパク質は、dsDNA 結合タンパク質であり；より好ましくは、AP1、Sp1、p53、E2Fなどのような転写因子である。

【0014】

本発明の方法を用いた検出の好ましい実施形態において、上記核酸捕捉プローブは、標

10

20

30

40

50

的核酸結合タンパク質に結合し得る核酸配列を含み；そして、各核酸捕捉プローブの一本の鎖は、突出末端を有する。

【0015】

核酸捕捉プローブと固定化プローブとの間のハイブリダイゼーション親和性を高めるために、上記固定化プローブは、対応する核酸捕捉プローブの突出末端配列に対して完全に相補的である。

【0016】

ハイブリダイゼーションシグナルを検出するために、核酸捕捉プローブの突出末端は、標識分子で標識される。好ましい標識分子は、ビオチン、ジゴキシン、蛍光色素、量子ドット、金粒子またはナノ粒子である。より高い感度に達するために、以下のような改善がなされている（「事前ハイブリダイゼーション一本鎖増幅法」）：上記核酸捕捉プローブの各々の一本の鎖は、3'突出末端を有し；工程3)のハイブリダイゼーション反応の前に、収集された核酸捕捉プローブが、1つのプライマーを用いて増幅され、このプライマーの配列は、後の核酸増幅手順のための3'突出末端配列とハイブリダイズし得る。

10

【0017】

好ましくは、各核酸捕捉プローブの3'突出末端配列は同一であり、そして、プライマー配列は、この3'突出末端配列に対して完全に相補的である。

【0018】

ハイブリダイゼーションシグナルを簡便に検出するために、標識分子が、この系に加えられ得る。プライマーは、増幅の前に末端が標識され得るか；または、標識されたヌクレオチドが、増幅材料に加えられ、そして、増幅の間に使用され得る。好ましい標識分子は、ビオチン、ジゴキシン、蛍光色素、量子ドット、金粒子またはナノ粒子である。

20

【0019】

より高い感度に達するために、以下のような改善がなされている（「事前ハイブリダイゼーション二本鎖増幅法」）：上記核酸捕捉プローブの各々の一本の鎖は、3'突出末端および5'突出末端の両方を有し；工程3)のハイブリダイゼーション反応の前に、収集された核酸捕捉プローブが、2つのプライマーを用いて増幅され、このプライマーのうちの一方のプライマーは、3'突出末端および5'突出末端の両方を有する核酸捕捉プローブの鎖の3'突出末端とハイブリダイズし得、そして、もう一方のプライマー配列は、3'突出末端および5'突出末端の両方を有する核酸捕捉プローブの鎖の5'突出末端と同じである。

30

【0020】

好ましくは、3'突出末端および5'突出末端の両方を有する核酸捕捉プローブの各々における3'突出末端配列は同一であり、かつ、3'突出末端および5'突出末端の両方を有する核酸捕捉プローブの各々における5'突出末端配列は同一であり、そして、使用されるプライマーのうちの一方の配列は、3'突出末端および5'突出末端の両方を有する核酸捕捉プローブの3'突出末端配列にハイブリダイズし得、もう一方のプライマー配列は、3'突出末端および5'突出末端の両方を有する核酸捕捉プローブの5'突出末端配列と同一の配列である。

【0021】

二本鎖増幅法の作業手順は、図7に示される。捕捉プローブ1と標的タンパク質3（図面において、丸と三角で表される）とを混合する；核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体4を単離し、そして、複合体中の捕捉プローブを収集する；2つのプライマー6を使用して、収集した捕捉プローブを増幅する；増幅生成物を、バイオチップ上に固定化した固定化プローブ2とハイブリダイズさせる；そして、ハイブリダイゼーションシグナルを検出して、結果を得る。捕捉プローブ、固定化プローブおよびプライマーのための好ましい設計は、図8に示される：捕捉プローブは、標的タンパク質結合配列を含み；2本の鎖のうちの1本の鎖が、3'突出末端および5'突出末端を有する；プライマー1の配列は、3'突出末端に対して相補的であり、かつ、プライマー2の配列は、5'突出末端と同じであり；そして、固定化プローブの配列は、結合配列と同じである。

40

50

【0022】

ハイブリダイゼーションシグナルを簡便に検出するために、標識分子が、この系に加えられ得る。プライマーは、増幅の前に末端が標識され得るか；または、標識されたヌクレオチドが、増幅材料に加えられ、そして、増幅の間に使用され得る。好ましい標識分子は、ビオチン、ジゴキシン、蛍光色素、量子ドット、金粒子またはナノ粒子である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0023】

(好ましい実施形態)

(実施例1：3つの核酸結合タンパク質AP1、NF BおよびSp1を同時に検出するためのDNAバイオチップの使用(末端標識法))

図1に示すように、末端標識した捕捉プローブ1を、標的タンパク質3と混合した(図面において、丸と三角で表す)。形成した核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体4を、次いで単離し、そして、この複合体中の捕捉プローブを収集した。この収集した捕捉プローブを、バイオチップ5の上に固定化した固定化プローブ2とハイブリダイズさせ、そして、ハイブリダイゼーションシグナルを検出して、結果を得た。

10

【0024】

図2は、捕捉プローブおよび固定化プローブのための好ましい設計を示す。二本鎖捕捉プローブは、標的核酸結合タンパク質が結合する配列を含む。捕捉プローブのうちの1本の鎖は、標識分子(図面ではビオチン)で標識された突出末端を含む。固定化プローブは、捕捉プローブの長い方の鎖に対して相補的である。

20

【0025】

(材料)

転写因子AP-1(c-Jun)(#E3061)、NF B(p50)(#E3770)およびSp1(#E6391)を、Promega(Madison, WI)から入手した。一般的な結合緩衝液は、10mM Tris-HCl(pH 7.5)、4%グリセロール、1mM MgCl₂、0.5mM EDTA、5mM DTT、50mM NaClおよび0.05mg/mL ポリ(dI-dC)・(dI-dC)を含んだ。電気泳動バッファは、0.5xTBE(0.9M Tris、0.9M ホウ酸および0.02M EDTA, pH 8.0)であった。PBST(PBS、0.1% Tween 20)を洗浄緩衝液として使用した。電気泳動のためのアガロースは、BioWest(Miami, FL)から入手した。ウシ血清アルブミン(BSA)は、Amresco(Solon, OH)から入手した。Cy3標識ストレプトアビジンは、Amersham Biosciences(Uppsala, Sweden)から入手した。

30

【0026】

(実験手順)

A. DNAプローブの調製：全てのプローブは、Bioasia Inc.(Shanghai, China)により合成され、その配列は表1に列挙する。表1において、AP-1-IPは、AP-1に対する固定化プローブを表し；AP-1-LPおよびAP-1-FPは、AP1のための捕捉プローブを形成し；そして、AP-1-CPおよびAP-1-FPは、AP-1結合のための競合プローブを形成した。他のプローブの設計は、AP-1の設計と同様であった。この実施例におけるLPプローブの突出末端の配列は、5'-CGGA-3'であった。各グループのための固定化プローブを、まず、水中に溶解し、次いで、50% DMSO水溶液で希釈して、10μMの最終プローブ濃度にした。タンパク質捕捉プローブを水中に溶解し、そして、それぞれ同じグループからの対応するプローブ(各捕捉プローブグループにおいてFPおよびLP)とアニールさせて、二本鎖DNA分子を形成させた。各二本鎖DNA分子は、60nMの最終濃度を有した。

40

【0027】

B. DNAチップの調製：PixSys 5500機械式アレイ作成装置(Cartesian Technologies, Irvine, CA)を用いて、図3Aのアレイ形式に従い、アミノ誘導体化ガラススライド上に、上記の固定化プローブをスポットした。

50

2つの隣接するスポット間の中心間距離は、350 μmであった。スポットティングの後、スライドを80℃にて1時間インキュベートした。次いで、250 mJのStratalinkerセットを用いて、スライド表面上にスポットされた核酸分子を架橋して、固定化した。図3Aにおいて、AP1のための固定化プローブをA1～A5にスポットし；NF Bのための固定化プローブをB1～B5にスポットし；Sp1のための固定化プローブをC1～C5にスポットし；TFIIDのための固定化プローブをD1～D5にスポットし；NCのための固定化プローブをE1～E5にスポットし；そして、HCのための固定化プローブをF1～F5にスポットした。A6、B6、C6、D6、E6およびF6には、コントロール（蛍光色素で標識した核酸分子）をスポットした。スポットティングの後、スライドを走査してコントロールを検出し、スポットティング手順が適切であったことを示した。

10

【0028】

C．核酸-タンパク質結合系の調製：3つの転写因子（0.1 μg AP1、300 ng NF Bおよび1.0 μg Sp1）およびタンパク質捕捉プローブ（LPおよびFPのアニールさせた生成物）を混合した。一般的な結合緩衝液を、1倍の最終濃度に達するように加えた。この反応混合物を、室温で30分間インキュベートした。図3C、3Dおよび3Eに示される実験において、反応に、競合プローブを加えた。

【0029】

D．核酸-タンパク質結合複合体の単離：2%のアガロースゲルおよびTBE電気泳動バッファーを調製し、そして、4℃にて冷却した。上記の反応混合物を、アガロースゲルのサンプルウェルにロードした。電気泳動を、120 Vにて20分間行った。プロモフェノールブルーの位置に基づいて、該当するゲルのスライスを切り出した。

20

【0030】

E．核酸の抽出：QIAEX IIゲル精製キットを、製造業者の説明書に従って用いることによって、ゲルスライスから核酸を収集した。

【0031】

F．バイオチップを用いたハイブリダイゼーション解析：これより前の工程において得られた核酸を、ハイブリダイゼーション緩衝液（HC-LPプローブを含む）と混合し、15 mlにした。ハイブリダイゼーション緩衝液は、3×SSCおよび0.1% SDSを含んだ。このハイブリダイゼーション混合物を、スライドとともに65℃にて1時間インキュベートした。このスライドを、0.2×SSCおよび0.1% SDSを含有する洗浄緩衝液を用いて、室温にて10分間洗浄した。このスライドを、1000 rpmで回転させることによって乾燥させた。次いで、このスライドを、37℃にて30分間1% BSAでブロックした。このスライドを、室温にて10分間PBSTで洗浄し、次いで、1000 rpmで回転させることによって乾燥させた。1 μg/mlのCy3標識ストレプトアビジンを含有する15 μlの溶液を、このスライドの表面に加え、そして、37℃にて1時間反応させた。このスライドを、室温にて10分間PBSTで洗浄した。このスライドを、1000 rpmで回転させることによって乾燥させた。このスライドを、スキャンレイ4000画像スキャナで走査し、そして、GenePixを用いて像を解析した。図3Aは、アレイ形式を示す。図3Bは、「末端標識法」を用いた、1枚のスライド上での3つの核酸結合タンパク質の同時検出の結果を示す。図3Cは、核酸結合タンパク質AP1に対する競合プローブを反応系に加えた場合の、「末端標識法」を用いた、1枚のスライド上での3つの核酸結合タンパク質の同時検出の結果を示す。図3Dは、核酸結合タンパク質NF Bに対する競合プローブを反応系に加えた場合の、「末端標識法」を用いた、1枚のスライド上での3つの核酸結合タンパク質の同時検出の結果を示す。図3Eは、核酸結合タンパク質Sp1に対する競合プローブを反応系に加えた場合の、「末端標識法」を用いた、1枚のスライド上での3つの核酸結合タンパク質の同時検出の結果を示す。これらの結果は、本発明の「末端標識法」が、3つの転写因子を容易に検出し得ることを示す。NC内の配列は、原核生物のファージのプロモーターに由来し、真核生物の転写因子結合配列とは有意に異なるので、そして、それゆえ、上記の転写因子のいずれ

30

40

50

にも結合し得ない。従って、NCプローブに由来するシグナルは、常にネガティブであった。HCは、ハイブリダイゼーションコントロールとして使用した。HCは、ハイブリダイゼーション前に加え、そして、異なるスポッティング形式間での規準化のために使用した。従って、HCのシグナルは、常にポジティブである。

【0032】

【表1】

表1:いくつかの転写因子(TF)のための固定化プローブおよび捕捉プローブの配列

グループ	転写因子	プローブ番号	プローブ名	プローブ配列
1	AP-1	1	AP-1-IP	5'-T ₂₀ -CGCTTGATGAGTCAGCCGGA- TCCCG -3'
		2	AP-1-LP	5'-ビオチン- CGGGA -TCCGGCTGACTCATCAAGCG-3'
		3	AP-1-FP	5'-CGCTTGATGAGTCAGCCGGA-3'
		4	AP-1-CP	5'-TCCGGCTGACTCATCAAGCG-3'
2	NFκB	5	NFκB-IP	5'-T ₂₀ -AGTTGAGGGGACTTTCCAGGA- TCCCG -3'
		6	NFκB-LP	5'-ビオチン- CGGGA -TCCTGGGAAAGTCCCCTCAACT-3'
		7	NFκB-FP	5'-AGTTGAGGGGACTTTCCAGGA-3'
		8	NFκB-CP	5'-TCCTGGGAAAGTCCCCTCAACT-3'
3	SP1	9	SP1-IP	5'-T ₂₀ -AAAGCCCCGCCCCGATATAAT- TCCCG -3'
		10	SP1-LP	5'-ビオチン- CGGGA -ATTATATCGGGGCGGGGCTTT-3'
		11	SP1-FP	5'-AAAGCCCCGCCCCGATATAAT-3'
		12	SP1-CP	5'-ATTATATCGGGGCGGGGCTTT-3'
4	TFIID	13	TFIID-IP	5'-T ₂₀ -CGCCTACCTCATTTTATATGCTCTGC- TCCCG -3'
		14	TFIID-LP	5'-ビオチン- CGGGA -GCAGAGCATATAAAATGAGGTAGGCG-3'
		15	TFIID-FP	5'-CGCCTACCTCATTTTATATGCTCTGC-3'
		16	TFIID-CP	5'-GCAGAGCATATAAAATGAGGTAGGCG-3'
5	NC	17	NC-IP	5'-T ₂₀ -CTATGTGGTGAACCTCCTCCTAAATA- TCCCG -3'
		18	NC-LP	5'-ビオチン- CGGGA -CGGGATATTTAGGAGGAGTTCACACATAG-3'
		19	NC-FP	5'-CTATGTGGTGAACCTCCTCCTAAATA-3'
6	HC	20	HC-IP	5'-T ₂₀ -AGACGGAAGACATATGGCCGCTC- TCCCG -3'
		21	HC-LP	5'-ビオチン- CGGGA -GAGCGGCCATATGTCTTCCGTCT-3'

10

20

30

40

(実施例2: 3つの核酸結合タンパク質AP1、NFκBおよびSP1を同時に検出するためのDNAバイオチップの使用(一本鎖増幅法))

図4は、一本鎖増幅法を用いた検出の作業概略を示す。捕捉プローブ1を、標的タンパク質3と混合した(図面において、丸と三角で表す)。形成した核酸捕捉プローブ-核酸結合タンパク質複合体4を単離し、そして、捕捉プローブを収集した。プライマー6を使用して、この収集した捕捉プローブを増幅し、そして、この増幅生成物を、バイオチップ5の上に固定化した固定化プローブ2とハイブリダイズさせた。ハイブリダイゼーションシグナルを検出して、結果を得た。

【0033】

図5は、捕捉プローブ、固定化プローブおよびプライマーのための好ましい設計を示す

50

。二本鎖捕捉プローブは、核酸結合タンパク質が結合する配列を含み、そして、一本の鎖が、3'突出末端を含む。プライマーの配列は、この3'突出末端に対して相補的である。固定化プローブの配列は、結合配列と一致する。

【0034】

(材料)

転写因子 AP-1 (c-Jun) (#E3061)、NF B (p50) (#E3770) および Sp1 (#E6391) を、Promega (Madison, WI) から入手した。一般的な結合緩衝液は、10 mM Tris-HCl (pH 7.5)、4% グリセロール、1 mM MgCl₂、0.5 mM EDTA、5 mM DTT、50 mM NaCl および 0.05 mg/mL ポリ(dI-dC)・(dI-dC) を含んだ。電気泳動バッファーは、0.5x TBE (0.9 M Tris、0.9 M ホウ酸 および 0.02 M EDTA, pH 8.0) であった。洗浄緩衝液は、PBST (PBS、0.1% Tween 20) であった。電気泳動のためのアガロースは、BioWest (Miami, FL) から入手した。ウシ血清アルブミン (BSA) は、Amresco (Solon, OH) から入手した。Cy3 標識ストレプトアビジンは、Amersham Biosciences (Uppsala, Sweden) から入手した。

10

【0035】

(実験手順)

A. DNA プローブの調製：全てのプローブは、Bioasia Inc. (Shanghai, China) により合成され、その配列は表2に列挙する。プローブの各グループにおいて、LFP および LP は対応する転写因子のための捕捉プローブを形成し；そして、IP プローブは、固定化プローブであった。各グループにおける固定化プローブの調製は、実施例1の「DNA プローブの調製」と同様である。タンパク質捕捉プローブを水中に溶解させ、そして、対応するプローブ (各グループにおいて LFP プローブ および LP プローブ) とアニールさせて、二本鎖 DNA を形成させた。各プローブグループの最終濃度は 60 nM であった。

20

【0036】

B. DNA チップの調製：手順は実施例1の「DNA チップの調製」と同様である。

【0037】

C. 核酸-タンパク質結合系の調製：3つの転写因子 (0.1 μg AP1、100 ng NF B および 1.0 μg Sp1) およびタンパク質捕捉プローブを混合した。一般的な結合緩衝液を、1倍の最終濃度に達するように加えた。この結合反応を、室温で30分間行った。

30

【0038】

D. 核酸-タンパク質結合複合体の単離：2%のアガロースゲルおよび TBE 電気泳動バッファーを調製し、そして、4℃に冷却した。上記の反応混合物を、アガロースゲルのサンプルウェルにロードした。電気泳動を、120 V にて20分間行った。プロモフェノールブルーの位置に基づいて、該当するゲルのスライスを取り出した。

【0039】

E. 核酸の抽出：QIAEX II ゲル精製キットを、製造業者の説明書に従って用いて、ゲルスライスから核酸を収集した。溶出には、20 μl の溶出緩衝液を用いた。

40

【0040】

F. DNA チップを用いたハイブリダイゼーション解析：抽出した DNA を真空中で乾燥させ、次いで、5 μl の水に再度溶解させた。核酸増幅のために、dNTP、PCR 緩衝液 および Cy3 標識 T7 プロプライマーを加えた。PCR のサイクルは、95℃で5分間；95℃で30秒間、53℃で30秒間、72℃で20秒間、を40回の増幅サイクル；そして、73℃で7分間であった。この増幅生成物を真空中で乾燥させ、次いで、5 μl の水に再度溶解させた。この溶解した増幅生成物を、3x SSC および 0.1% SDS を含有する、15 μl のハイブリダイゼーション溶液 (このハイブリダイゼーション溶液には HC-LP プローブを加えた) に入れた。このハイブリダイゼーション溶液を、D

50

NAチップに加え、65にて1時間ハイブリダイゼーションさせた。次いで、0.2×SSCおよび0.1% SDSを含有する洗浄緩衝液を用いて、室温にて10分間このスライドを洗浄した。このスライドを、1000rpmで回転させることによって乾燥させた。Scanarray 4000画像スキャナを用いてスライドを走査し、そして、GenePixを用いて像を解析した。

【0041】

実施例1に記載される「末端標識法」を用いて、この実施例において3つの転写タンパク質を検出し、そして、この「末端標識法」を、結果の比較のためのコントロールとして使用した。

【0042】

結果を、図6Aおよび図6Bに示す。図6Aは、一本鎖増幅法を用いた場合の検出の結果を示す。図6Bは、実施例1の「末端標識法」を用いた場合の検出の結果を示す。この図において、A1~A5は、AP1の検出結果であり；B1~B5は、NFkBの検出結果であり；C1~C5は、ハイブリダイゼーションコントロールであり（HC；HC-IPおよびHC-LPの配列については表1を参照のこと）；D1~D5は、SP1の検出結果である。これらの結果は、一本鎖増幅法を用いることで、検出感度が向上し；末端標識法を用いても検出できなかったシグナルが、単一のプライマー増幅によって検出されたことを示した。

【0043】

【表2】

表2:3'突出末端を有するプローブの配列

グループ	TF	プローブ番号	プローブ名	プローブ配列
1	AP-1	1	AP-1-IP	5'-T ₂₀ -CGCTTGATGAGTCAGCCGGA- TCCCCG -3'
		22	AP-1-LFP	5'-CGCTTGATGAGTCAGCCGGA- CCCTATAGTGAGTCGTAT TACCCC -3'
		26	AP-1-LP'	5'- CGGGA -TCCGGCTGACTCATCAAGCG-3'
2	NFkB B	5	NFkB-IP	5'-T ₂₀ -AGTTGAGGGGACTTTCCAGGA- TCCCCG -3'
		23	NFkB-LFP	5'-AGTTGAGGGGACTTTCCAGGA- CCCTATAGTGAGTCGT ATTACCCC -3'
		27	NFkB-LP'	5'- CGGGA -TCCTGGGAAAGTCCCCTCAACT-3'
3	SP1	9	SP1-IP	5'-T ₂₀ -AAAGCCCCGCCCGATATAAT- TCCCCG -3'
		24	SP1-LFP	5'-AAAGCCCCGCCCGATATAAT- CCCTATAGTGAGTCGTA TTACCCC -3'
		28	SP1-LP'	5'- CGGGA -ATTATATCGGGGCGGGGCTTT-3'
4		25	T7 Pro	5'-Cy3- GGGGTAATACGACTCACTATAGGG -3'

【産業上の利用可能性】

【0044】

本発明は、核酸結合タンパク質、特に、転写因子を検出するためのバイオチップをベースにした方法を使用する。この方法は、捕捉プローブと固定化プローブとの間のハイブリダイゼーションシグナルの検出を包含する。これは、非常に感度が高く、ハイスループットの方法である。さらに、本発明の2つの改善された方法（ハイブリダイゼーション前の一本鎖増幅、ハイブリダイゼーション前の二本鎖増幅）およびプライマーが予め標識され得る場合、各グループの捕捉プローブを標識する必要がない。実験の費用は、有意に低減され得る。本発明の方法は、疾患の診断、薬物標的のスクリーニング、および、疾患プロセスの研究に広く使用され得る。

【図面の簡単な説明】

10

20

30

40

50

【 0 0 4 5 】

【 図 1 】 図 1 は、本発明において使用される「標識方法」を用いた場合の、複数の核酸結合タンパク質の検出の概略を示す。

【 図 2 】 図 2 は、本発明において使用される「末端標識法」を用いた場合の、複数の核酸結合タンパク質の検出のためのプローブ構造の概略を示す。

【 図 3 A 】 図 3 A は、実施例 1 において使用されるアレイ形式を示す。

【 図 3 B 】 図 3 B は、実施例 1 における、3つの核酸結合タンパク質の同時検出の実験結果を示す。

【 図 3 C 】 図 3 C は、競合因子である A P 1 結合プローブが加えられた場合の、実施例 1 における、3つの核酸結合タンパク質の同時検出の実験結果を示す。

10

【 図 3 D 】 図 3 D は、競合因子である N F B 結合プローブが加えられた場合の、実施例 1 における、3つの核酸結合タンパク質の同時検出の実験結果を示す。

【 図 3 E 】 図 3 E は、競合因子である S p 1 結合プローブが加えられた場合の、実施例 1 における、3つの核酸結合タンパク質の同時検出の実験結果を示す。

【 図 4 】 図 4 は、本発明において使用される「一本鎖増幅法」を用いた場合の、複数の核酸結合タンパク質の検出の作業概略を示す。

【 図 5 】 図 5 は、本発明において使用される「一本鎖増幅法」を用いた場合の、複数の核酸結合タンパク質を検出するためのプローブおよびプライマーの設計の概略を示す。

【 図 6 A 】 図 6 A は、実施例 2 における「一本鎖増幅法」を用いた場合の、3つの核酸結合タンパク質 (A P 1、N F B および S p 1) の同時検出の実験結果を示す。


20

【 図 6 B 】 図 6 B は、実施例 1 に記載される「末端標識法」を用いた場合の、実施例 2 における実験結果を示す。


【 図 7 】 図 7 は、本発明において使用される「二本鎖増幅法」を用いた場合の、複数の核酸結合タンパク質の検出の作業概略を示す。

【 図 8 】 図 8 は、本発明において使用される「二本鎖増幅法」を用いた場合の、複数の核酸結合タンパク質を検出するためのプローブおよびプライマーの設計の概略を示す。


【 図 1 】




【 図 2 】




【 図 3 A 】




【 図 3 B 】




【 図 3 C 】




【 図 3 E 】



【 図 3 D 】




【 図 4 】




【 図 5 】

(1) 捕捉プローブ



(2) 固定化プローブ



固定化プローブの固定化配列

図 5

【 図 6 A 】




図 6A

図 6B

【 図 6 B 】




図 6A

図 6B

【 図 7 】






図 7

【 図 8 】

(1) 捕捉プローブ



(2) 固定化プローブ



固定化プローブの固定化配列

図 8

【手続補正書】

【提出日】平成20年1月22日(2008.1.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】配列表

【補正方法】追加

【補正の内容】

【配列表】

2008520212000001.app


【 国际調查報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/CN2004/001340
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC ⁷ : G01N33/68, C12Q1/68		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)		
IPC ⁷ : G01N, C12Q		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Chinese patent documents (1985-)		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
WPI, EPODOC, PAJ, CNPAT; DNA, SSB, binding protein, combined protein, chip, biochip, array, microarray, matrix		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN1435492A (UNIV SOUTHEAST) ,13.Aug.2003(13.08.2003), Whole documents	1-27
A	WO9315226A (HARVARD COLLEGE) ,05.Aug.1993(05.08.1993), Whole documents	1-27
A	US20030054378A (ISAO KARUBE ET AL) 20.Mar.2003(20.03.2003)Whole documents	1-27
A	US5449603A (KIRK B. ET AL) , 12.Sep.1995(12.09.1995), Whole documents	1-27
A	WO02083929A (CLONTECH LAB INC ET AL) 24.Oct.2004(24.10.2004) Whole documents	1-27
A	WO02086095A (CHOU M F) , 31.Oct.2004(31.10.2004), Whole documents	1-27
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 25.Jul. 2005 (25.07.2005)		Date of mailing of the international search report 18 - AUG 2005 (18 - 08 - 2005)
Name and mailing address of the ISA/CN The State Intellectual Property Office, the P.R.China 6 Xitucheng Rd., Jimen Bridge, Haidian District, Beijing, China 100088 Facsimile No. 86-10-62019451		Authorized officer LIU Ming Telephone No. (86-10)62085852

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2004/001340

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN1435492A	13.08.2003	none	
US20030054378A	20.03.2003	none	
US5449603A	12.09.1995	WO9106679A	16.05.1991
		US5605824A	25.02.1997
WO9315226A	05.08.1993	AU3595493A	01.09.1993
		EP0672177A	20.09.1995
		US5534407A	09.07.1996
WO02083929A	24.10.2004	CA2442367A	24.10.2002
		US2002177218A	28.11.2002
		EP1381383A	21.01.2004
WO02086095A	31.10.2004	US2004053227A	18.03.2004

国际检索报告		国际申请号 PCT/CN2004/001340
A. 主题的分类		
IPC ⁷ : G01N33/68, C12Q1/68		
按照国际专利分类表(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类		
B. 检索领域		
检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)		
IPC ⁷ : G01N, C12Q		
包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献		
中国专利文献 (1985-)		
在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))		
WPI, EPODOC, PAJ, CNPAT; 核酸结合蛋白, 芯片, 探针, 杂交, DNA, SSB, binding protein, combined protein, chip, biochip, array, microarray, matrix		
C. 相关文件		
类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
A	CN1435492A (东南大学), 13.8月.2003(13.08.2003), 全文	1-27
A	WO9315226A (HARVARD COLLEGE), 05.8月.1993(05.08.1993), 全文	1-27
A	US20030054378A (ISAO KARUBE ET AL), 20.3月.2003(20.03.2003), 全文	1-27
A	US5449603A (KIRK B. ET AL), 12.9月.1995(12.09.1995), 全文	1-27
A	WO02083929A (CLONTECH LAB INC ET AL), 24.10月.2004(24.10.2004), 全文	1-27
A	WO02086095A (CHOU M F), 31.10月.2004(31.10.2004), 全文	1-27
<input type="checkbox"/> 其余文件在 C 栏的续页中列出。 <input checked="" type="checkbox"/> 见同族专利附件。		
* 引用文件的具体类型: "A" 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 "E" 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 "L" 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件 "O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 "P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件		"I" 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 "X" 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 "Y" 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 "&" 同族专利的文件
国际检索实际完成的日期 25.7月 2005 (25.07.2005)		国际检索报告邮寄日期 18.8月 2005 (18.08.2005)
中华人民共和国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088 传真号: (86-10)62019451		受权官员  电话号码: (86-10)62085852

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2004/001340

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利	公布日期
CN1435492A	13.08.2003	无	
US20030054378A	20.03.2003	无	
US5449603A	12.09.1995	WO9106679A	16.05.1991
		US5605824A	25.02.1997
WO9315226A	05.08.1993	AU3595493A	01.09.1993
		EP0672177A	20.09.1995
		US5534407A	09.07.1996
WO02083929A	24.10.2004	CA2442367A	24.10.2002
		US2002177218A	28.11.2002
		EP1381383A	21.01.2004
WO02086095A	31.10.2004	US2004053227A	18.03.2004

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 邵威

中国北京市昌平区生命科学 園 路18号, 102206

(72)発明者 趙永超

中国北京市昌平区生命科学 園 路18号, 102206

(72)発明者 孫義民

中国北京市昌平区生命科学 園 路18号, 102206

(72)発明者 喬繼英

中国北京市昌平区生命科学 園 路18号, 102206

(72)発明者 魏華江

中国北京市昌平区生命科学 園 路18号, 102206

(72)発明者 楊衛平

中国北京市昌平区生命科学 園 路18号, 102206

(72)発明者 周玉祥

中国北京市昌平区生命科学 園 路18号, 102206

(72)発明者 程京

中国北京市昌平区生命科学 園 路18号, 102206

Fターム(参考) 4B024 AA11 CA04 CA09 HA04 HA14

4B063 QA01 QQ48 QQ79 QR32 QR48 QR56 QR62 QS16 QS17 QS25

QS34 QX02