

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2009-523743

(P2009-523743A)

(43) 公表日 平成21年6月25日(2009.6.25)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 K 47/48 (2006.01)	A 6 1 K 47/48	4 B 0 2 4
A 6 1 K 38/17 (2006.01)	A 6 1 K 37/12 Z N A	4 C 0 7 6
A 6 1 K 9/50 (2006.01)	A 6 1 K 9/50	4 C 0 8 4
A 6 1 K 9/14 (2006.01)	A 6 1 K 9/14	4 H 0 4 5
A 6 1 K 9/127 (2006.01)	A 6 1 K 9/127	

審査請求 有 予備審査請求 有 (全 37 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2008-550619 (P2008-550619)	(71) 出願人	506259634 清華大学 中華人民共和国北京市海淀区清華▲園▼
(86) (22) 出願日	平成19年1月19日 (2007.1.19)	(71) 出願人	507369132 北京普▲羅▼吉生物科技▲発▼展有限公司 Protgen Ltd. 中華人民共和国北京市100085海淀区 上地▲開▼拓路5号 中関村生物医▲薬▼ ▲園▼ビー-421
(85) 翻訳文提出日	平成20年9月12日 (2008.9.12)	(74) 代理人	100115255 弁理士 辻丸 光一郎
(86) 国際出願番号	PCT/CN2007/000204	(74) 代理人	100129137 弁理士 中山 ゆみ
(87) 国際公開番号	W02007/082483	(74) 代理人	100146064 弁理士 吉田 玲子
(87) 国際公開日	平成19年7月26日 (2007.7.26)		
(31) 優先権主張番号	200610011247.9		
(32) 優先日	平成18年1月20日 (2006.1.20)		
(33) 優先権主張国	中国 (CN)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 癌治療のための医薬品およびその使用

(57) 【要約】

本発明は、抗癌複合体の製造方法と同様に、抗癌複合体および医薬組成物または前記複合体を含むキットを開示する。本発明の前記抗癌複合体は、生体内で代謝的に安定であり、癌の治療および抗癌剤の製造のために最終的には利用可能なものである。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

修飾剤とエンドスタチンとにより形成される複合体であって、前記修飾剤が、前記エンドスタチンの生体内半減期を延長可能である複合体。

【請求項 2】

前記修飾剤が、前記エンドスタチンに共有結合されている、請求項 1 記載の複合体。

【請求項 3】

前記修飾剤が、巨大分子重合体、タンパク質もしくはその断片、ペプチド、小分子または他の化学物質からなる群から選択される、請求項 2 記載の複合体。

【請求項 4】

前記巨大分子重合体が、ポリエチレンアルコール、ポリエーテル化合物、ポリビニルピロリドン、ポリアミノ酸、ジビニルエーテルと無水マレイン酸との共重合体、N-(2-ヒドロキシプロピル)-メタクリルアミド、硫酸デキストラン、セルロースおよびセルロース誘導体(メチルセルロースおよびカルボキシメチルセルロースを含む)のようなデキストラングルカン誘導体、でんぷんおよびでんぷん誘導体、ポリエチレンスクロース、ポリオキシエチル化ポリオール、ヘパリンもしくはヘパリン断片、ポリ-アルキル-エチレングリコールおよびその誘導体、ポリ-アルキル-エチレングリコールとその誘導体との共重合体、ポリビニルエチルエーテル、a, P-ポリ[(2-ヒドロキシエチル)-DL-アスパルタミド]、ポリカルボン酸、ポリオキシエチレン-オキシメチレン、ポリアクリロイルモルホリン、アミノ化合物と酸化オレフィンとの共重合体、ポリヒアルロン酸、ポリオキシラン、エタン二酸とマロン酸との共重合体、ポリ(1,3-ジオキソラン)、エチレンとマレイン酸ヒドラジドとの共重合体、ポリシアル酸、シクロデキストリンまたは他の薬学上許容できる重合体からなる群から選択される、請求項 3 記載の複合体。

【請求項 5】

前記ポリエーテル化合物が、 $\text{HO}((\text{CH}_2)_x\text{O})_n\text{H}$ 、ポリプロピレングリコール、ポリエチレンオキシド($\text{HO}((\text{CH}_2)_2\text{O})_n\text{H}$)、ポリビニルアルコール($(\text{C}_2\text{H}_4\text{CHOH})_n$)またはそれらの誘導体からなる群から選択される、請求項 4 記載の複合体。

【請求項 6】

前記ポリエチレンアルコールが、ポリエチレングリコール(モノメトキシポリエチレングリコールおよびモノヒドロキシポリエチレングリコールを含む)、ポリビニルアルコール、ポリプロピレンアルコール、ポリブテノールまたはそれらの誘導体からなる群から選択される、請求項 4 記載の複合体。

【請求項 7】

前記ポリエチレンアルコールが、ポリエチレングリコールである、請求項 6 記載の複合体。

【請求項 8】

前記ポリエチレングリコールが、モノメトキシポリエチレングリコールである、請求項 7 記載の複合体。

【請求項 9】

エンドスタチン一分子が、一つ以上のポリエチレングリコール分子と結合している、請求項 7 または 8 記載の複合体。

【請求項 10】

前記エンドスタチンが、N末端アミノ酸残基の - アミノ基、リジン残基側鎖の - アミノ基、システイン残基のメルカプト基、アスパラギン酸残基側鎖のカルボキシル基、グルタミン酸残基側鎖のカルボキシル基、またはそれらの組合せからなる群から選択される前記エンドスタチンにおける部位で、ポリエチレングリコールと結合している、請求項 7 から 9 のいずれか一項記載の複合体。

【請求項 11】

エンドスタチン一分子が、前記エンドスタチン分子N末端の - アミノ基でポリエチレ

10

20

30

40

50

ングリコール分子と結合している、請求項 7 から 10 のいずれか一項記載の複合体。

【請求項 12】

前記エンドスタチン分子が、一つ以上のポリエチレングリコール分子と、前記エンドスタチン分子 N 末端の - アミノ基、または、野生型エンドスタチンの 75 番目、95 番目、106 番目、117 番目もしくは 183 番目のリジン残基に対応するリジン残基側鎖の - アミノ基、またはそれらの組合せで結合している、請求項 7 から 10 のいずれか一項記載の複合体。

【請求項 13】

前記エンドスタチン分子が、一つ以上のポリエチレングリコール分子と、前記エンドスタチン分子の付加されたシステイン残基側鎖のメルカプト基で結合し、前記付加されたシステイン残基が、前記エンドスタチン分子の N 末端、C 末端または内部領域に、システインまたはシステインを含むペプチド鎖の付加により導入されている、請求項 7 から 10 のいずれか一項記載の複合体。

【請求項 14】

前記エンドスタチン分子が、一つ以上のポリエチレングリコール分子と、前記エンドスタチン分子のアスパラギン酸残基またはグルタミン酸残基側鎖のカルボキシル基で結合している、請求項 7 から 10 のいずれか一項記載の複合体。

【請求項 15】

前記ポリエチレングリコール分子が、線状または分岐状である、請求項 7 から 14 のいずれか一項記載の複合体。

【請求項 16】

前記ポリエチレングリコール分子が、1,000 から 100,000 Da、好ましくは 5,000 から 40,000 Da の範囲の平均分子量を有する、請求項 7 から 14 のいずれか一項記載の複合体。

【請求項 17】

前記タンパク質が、アルブミン、免疫グロブリン、甲状腺ホルモン結合性タンパク質、トランスサイレチン、トランスフェリン、フィブリノゲンまたはそれらの断片からなる群から選択される、請求項 3 記載の複合体。

【請求項 18】

エンドスタチン分子が、一つ以上のアルブミン分子、好ましくはヒト血清アルブミンまたはその断片と結合している、請求項 17 記載の複合体。

【請求項 19】

前記エンドスタチン分子が、一つ以上の免疫グロブリン Fc 断片、好ましくはヒト免疫グロブリン IgG の Fc 断片と結合している、請求項 17 記載の複合体。

【請求項 20】

前記エンドスタチン分子が、小分子または小ペプチドまたは他の化合物と結合しており、前記複合体が、生体内の他の分子または成分と、反応または結合可能であり、それにより、前記複合体が、生体内の他の分子または成分と、より大きな複合体を形成可能である、請求項 3 記載の複合体。

【請求項 21】

前記複合体が、血液成分のアミノ基、水酸基またはメルカプト基と共有結合を形成可能な反応基を含む、請求項 20 記載の複合体。

【請求項 22】

前記反応基が、アルブミンのような血液成分のメルカプト基と反応可能なマレイミドである、請求項 21 記載の複合体。

【請求項 23】

前記複合体が、アルブミンまたは免疫グロブリンのようないくつかの血液成分に強い親和性を有し、それにより、より大きな複合体を形成可能である、請求項 20 記載の複合体。

【請求項 24】

10

20

30

40

50

前記複合体が、グリコシル化、リン酸化もしくはアシル化されたエンドスタチン分子のような、小分子または小ペプチドで修飾されたエンドスタチン分子であって、前記修飾部位が、野生型タンパク質に存在するアミノ酸残基、または、変異により生じたアミノ酸残基である、請求項 3 記載の複合体。

【請求項 2 5】

前記修飾剤が、非共有相互作用を介して前記エンドスタチン分子と結合し、前記修飾剤が、タンパク質、小分子または他の化学物質である、請求項 1 記載の複合体。

【請求項 2 6】

生体適合物質と、エンドスタチンまたは請求項 1 から 2 5 のいずれか一項記載の複合体とにより形成される徐放性製剤。

【請求項 2 7】

前記徐放性製剤が、マイクロカプセル、ヒドロゲル、マイクロスフェア、微小浸透圧ポンプまたはリポソームからなる群から選択される形態である、請求項 2 6 記載の徐放性製剤。

【請求項 2 8】

前記エンドスタチンが、ヒト、ネズミ科または他の哺乳類由来である、請求項 1 から 2 5 のいずれか一項記載の複合体、または、請求項 2 6 もしくは 2 7 記載の徐放性製剤。

【請求項 2 9】

前記エンドスタチンが、配列番号 1 に示す配列を有する野生型ヒトエンドスタチンである、請求項 1 から 2 5 のいずれか一項記載の複合体、または、請求項 2 6 もしくは 2 7 記載の徐放性製剤。

【請求項 3 0】

前記野生型ヒトエンドスタチンが、*E. coli*での発現時に配列番号 2 または配列番号 1 に示す配列を有する、請求項 1 から 2 5 のいずれか一項記載の複合体、または、請求項 2 6 もしくは 2 7 記載の徐放性製剤。

【請求項 3 1】

前記エンドスタチンが、エンドスタチンの活性断片、変異体、誘導体、異性体またはそれらの組合せである、請求項 1 から 2 5 のいずれか一項記載の複合体、または、請求項 2 6 もしくは 2 7 記載の徐放性製剤。

【請求項 3 2】

前記エンドスタチン断片が、配列番号 3、配列番号 4 または配列番号 5 に示す配列を有するペプチドである、請求項 3 1 の複合体または徐放性製剤。

【請求項 3 3】

前記エンドスタチン誘導体が、野生型エンドスタチンの N 末端または C 末端への長さ 1 から 1 5 アミノ酸のペプチド付加により形成される、請求項 3 1 記載の複合体または徐放性製剤。

【請求項 3 4】

前記エンドスタチン誘導体が、野生型ヒトエンドスタチン N 末端に 9 つのアミノ酸である His タグ MGGSHHHHH の付加により形成される、請求項 3 3 記載の複合体または徐放性製剤。

【請求項 3 5】

請求項 1 から 3 4 のいずれか一項記載の複合体または徐放性製剤と薬学上許容できるキャリアーを含む医薬組成物。

【請求項 3 6】

前記薬学上許容できるキャリアーが、リン酸、クエン酸または他の有機酸の緩衝液のような水溶性の pH 緩衝液；アスコルビン酸または他の抗酸化剤；低分子量のポリペプチド（10 残基以下）；血清アルブミン、グルチン、免疫グロブリンまたは他のタンパク質；ポリビニルピロリドンまたは他の親水性ポリマー；グリシン、グルタミン、アスパラギン、アルギニン、リジンまたは他のアミノ酸；単糖、二糖、グルコース、マンノース、デキストリンまたは他の炭水化物；EDTA または他のキレート剤；マンニトール、ソルビト

10

20

30

40

50

ールまたは他の糖アルコール；ナトリウムイオンまたは他の塩を形成する対イオン；T w e e n（登録商標）、P E G、P L U R O N I C S（登録商標）または他の非イオン性界面活性剤である、請求項 3 5 記載の医薬組成物。

【請求項 3 7】

請求項 1 から 3 6 のいずれか一項記載の複合体、徐放性製剤または医薬組成物、およびその使用説明書を含むキット。

【請求項 3 8】

請求項 7 から 1 6 のいずれか一項記載のポリエチレングリコールで修飾されたエンドスタチンとその使用説明書とを含むキット。

【請求項 3 9】

活性化ポリエチレングリコールとエンドスタチンとを混合して、溶液、温度、p H および反応モル比を含む適切な条件下で反応させる工程を含む、請求項 7 から 1 6 のいずれか一項記載のエンドスタチンを含む複合体の調製方法。

【請求項 4 0】

前記 p H が、p H 3 ~ 1 0 である、請求項 3 9 記載の方法。

【請求項 4 1】

陽イオン交換カラムを使用して前記複合体を精製する工程を含む、請求項 7 から 1 6 のいずれか一項記載のエンドスタチンを含む複合体の調製方法。

【請求項 4 2】

ゲルろ過を使用して前記複合体を精製する工程を含む、請求項 7 から 1 6 のいずれか一項記載のエンドスタチンを含む複合体の調製方法。

【請求項 4 3】

癌の予防、診断および治療における、請求項 1 から 3 8 のいずれか一項記載のエンドスタチンを含む複合体、医薬組成物、徐放性製剤またはキットの使用。

【請求項 4 4】

前記癌が、肺癌、神経内分泌腫瘍、大腸癌、骨肉腫、肝癌、胃癌、膵臓癌、口腔癌、乳癌、前立腺癌、リンパ腫、食道癌、口腔癌、鼻咽腔癌、子宮頸癌、肉腫、腎臓癌、胆道癌、悪性黒色腫または他の癌から選択される、請求項 4 3 記載の使用。

【請求項 4 5】

異常な血管新生により生じる組織または器官の障害によって特徴づけられる疾患の予防、診断および治療における、請求項 1 から 3 8 のいずれか一項記載のエンドスタチンを含む複合体、徐放性製剤、医薬組成物またはキットの使用。

【請求項 4 6】

前記投与経路が、静脈内注射、静脈管内投与、皮下注射、筋内注射、腹腔内注射、皮下への埋め込み、経皮吸収、肝動脈注射、経口投与、経鼻投与、口腔粘膜投与、眼内投与、直腸投与、腔内投与および他の臨床上許容できる経路からなる群から選択される、請求項 4 3 から 4 5 のいずれか一項記載の使用。

【請求項 4 7】

癌の治療のための医薬品の調製における、請求項 1 から 3 6 のいずれか一項記載のエンドスタチンを含む複合体、徐放性製剤または医薬組成物の使用。

【請求項 4 8】

異常な血管新生により生じる組織または器官の障害によって特徴づけられる疾患の治療のための医薬品の調製における、請求項 1 から 3 6 のいずれか一項記載のエンドスタチンを含む複合体、徐放性製剤または医薬組成物の使用。

【請求項 4 9】

エンドスタチンと、エンドスタチンの生体内半減期を延長可能な修飾剤との間で複合体を形成させる工程を含む、エンドスタチンの半減期の延長方法。

【請求項 5 0】

エンドスタチンまたはエンドスタチンを含む複合体、および生体適合物質を使用して徐放性製剤を形成する工程を含む、エンドスタチンの半減期の延長方法。

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、エンドスタチンを含み、生理活性があり且つ代謝的に安定な複合体、およびその徐放性製剤、ならびに、それらの調製方法に関する。本発明は、また、前述の複合体または徐放性製剤を含む医薬組成物およびキットを提供する。本発明は、また、癌を予防、診断、治療するための、エンドスタチン複合体、徐放性製剤、医薬組成物、およびキットの使用、ならびに抗癌剤調製のためのエンドスタチン複合体の使用に関する。

【背景技術】

【0002】

血管新生とは、現存する血管からの新しい毛細血管の成長を意味する。癌細胞の成長および移行は、血管新生に依存し、そのため、癌の血管内皮細胞を癌治療の標的とみなすことは、癌治療のための新しい戦略を提供する（非特許文献1）。

【0003】

エンドスタチンは、コラーゲンXVIIIのC末端の20kDaの切断断片である。1997年に、ハーバード大学のFolkman教授らは、血管内皮細胞の増殖、移行、および生体内での血管形成への阻害活性を持つ血管内皮腫細胞の培地内に、このタンパク質を発見した。さらなる実験により、前記組み換えエンドスタチンは、マウスでの種々の癌の成長および転移を阻害でき、薬剤耐性を誘導しない癌でさえ、治療可能なことが明らかになった。エンドスタチンの前記活性の基礎となる機構は、血管内皮細胞の成長阻害による癌組織内の血管新生の抑制である。その結果、癌は、成長に必要な栄養および酸素を得られず、成長の阻害または壊死が起こる（非特許文献2、3）。遺伝子操作により調製されるヒト組み換えエンドスタチンは、抗癌複合体に発展し、臨床試験で癌の成長に有効な阻害効果を示す。中国では、それは、非小細胞肺癌の臨床試験において、極めて優れた抗癌効果を示す。

【0004】

化学的薬剤と比較すると、ポリペプチドおよびタンパク質の薬剤は、低い毒性/副作用、および、薬剤耐性がほとんど無い等の利点を有する。より高い活性、生物学的な有効性、生体内での低分解性を達成するために、前記タンパク質薬剤は、通常、静脈内に投与される。しかし、この状況では、低分子量のタンパク質薬剤の半減期は非常に短い、その理由は、分解だけではなく、腎臓を介した迅速な除去にもよる。血液中では、タンパク質の水力半径がアルブミンよりも大きい場合、あるいはタンパク質の分子量が66kDaよりも大きい場合、そのタンパク質は、循環システムにおいて、安定に保たれる。しかし、より低分子量のタンパク質は、系球体を介して血液から迅速に除去されうる。このように、血液中で低分子量タンパク質の有効な治療濃度を維持するために、頻繁な注射または連続的な注入が必要となる。このような治療により治療効果を達成できたが、それによって、患者には不便さおよび痛みをもたらし、治療のコストも増大する。一方では、長期間の薬剤投与により、例えば、免疫反応等の副作用が起こる可能性がある。

【0005】

【非特許文献1】Folkman J. N Engl J Med 1971; 285:1182-1186

【非特許文献2】Folkman J.ら、Cell 1997; 88:277-285

【非特許文献3】Folkman J.ら、Nature 1997; 390:404-407

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

タンパク質薬剤として、エンドスタチンは、また、生体内での短い半減期および高い除去率という欠点を有する。現在、エンドスタチンは、静脈内への頻繁な注射または注入により投与され、一般的には連日、長期間にわたり、それは、患者の心理面および経済面の両方における重い負担を意味する。本発明の目的は、エンドスタチンの代謝的特徴の改善であり、その結果、生体内でのより高い安定性、より長い半減期、さらには、より高い治

10

20

30

40

50

癒効果を生じ、それによって治療の頻度およびコストを低減し、患者の負担を減少させる可能性がある。

【0007】

高分子重合体を使用したタンパク質の修飾は、半減期、免疫学的特質、毒物学的特質のような薬剤の動的特質を変化させて制御する一般的な方法である。タンパク質修飾に使用する高分子重合体は、他に比べて、優れた水溶性、優れた生体適合性を有すべきであり、免疫原性は、ほとんどまたは全く持つべきではない。ポリエチレングリコールは、主流のタンパク質修飾分子である。前記ポリエチレングリコールは、両親媒性の特質を有し、水だけでなく、大部分の有機溶媒に溶解可能である。一方、ポリエチレングリコールは、無毒性、無免疫原性で、水溶性が高いため、アメリカ合衆国のFDAと同様に中国のSFDAを含む多くの国の医薬品局により、薬剤調製用の高分子重合体として認可されている。例えば、前記ポリエチレングリコールのような高分子重合体とタンパク質とを結合させることにより、タンパク質の生体内での安定性を増大させ、非特異的な吸収および抗原性を減少させることができる。いったん前記複合体がある分子量に達すると、腎臓による除去率は効果的に減少する。これは、タンパク質薬剤の生体内半減期を延長させる効果的手段である (Frokjaer S.ら、*Nat. Rev. Drug Discov.* 2005 Apr 4(4): 298-306 ; Harris JM.ら、*Nat. Rev. Drug Discov.* 2003 Mar 2(3): 214-21)。ポリエチレングリコール修飾における反応部位として当初使用されたアミノ基は、主にタンパク質N末端の - アミノ基と、リジン残基側鎖の - アミノ基であった。その反応産物は、一つもしくは複数のPEG分子と結合したタンパク質分子である。リジン残基側鎖の - アミノ基修飾は、非特異的な反応部位のために、修飾された異性体を生成する可能性がある。

10

20

30

40

50

【0008】

近年、タンパク質N末端の - アミノ基と、リジン残基側鎖の - アミノ基との等電点の違いに着目して、タンパク質N末端を特異的に修飾するポリエチレングリコール修飾剤が開発されており、その結果、同一部位が修飾された均一な修飾産物を得ることが可能である。ポリエチレングリコール修飾を受ける他のタンパク質部位は、システイン残基のメルカプト基である。一般的に、メルカプト基の数は、タンパク質のアミノ基の数よりも少ないため、メルカプト基修飾は、より特異的である。遺伝子工学的手法を用いれば、特異的修飾部位として提供するために、今や、タンパク質の任意の位置にシステインの導入が可能である。しかし、修飾部位としてのシステインの導入は、また、一定の制限を有する。なぜなら、システイン残基を既に含むタンパク質にとっては、これによりジスルフィド結合の誤ったペア形成が生じる、または、そのようなタンパク質は、再生困難になる可能性があるからである。さらに、タンパク質のカルボキシル基もまた修飾部位として頻りに用いられる (Veronese FMら、*Drug Discov. Today.* 2005 Nov 1 ; 10(21):1451-8.)。ポリエチレングリコールによる修飾技術は、PEG - アスパラギナーゼ (Graham ML *Adv. Drug Deliv. Rev.* 55, 1293-1302 Avramis Vassilios I.ら、WO9939732 およびUS6689762)、PEG - アデノシンデアミナーゼ (Levy Yら、*J. Pediatr.* 113, 312-317 ; Davis Sら、*ClinExp. Immunol.* 46: 649-652 ; Hershfield MSら、*N Engl J Med* 316 : 589-596)、ならびに、PEG - インターフェロン 2 a および PEG - インターフェロン 2 b 等 (Bailon Pら、*C. Bioconjug. Chem.* 12, 195-202, Wang YSら、*Adv. Drug Deliv. Rev.* 54, 547-570, Meng Xiantaiら、WO2005077421, Van Vlasselaer Peterら、WO2004076474, Ballon Pascal Sebastlanら、US2004030101, Karasiewicz Robertら、EP0593868) のPEG - インターフェロンを含む複数のタンパク質薬剤で使用が成功している。

【0009】

他の代表的な高分子修飾剤は、グルカン、ポリスクロース、でんぷん、ポリアラニン、エタン二酸とマロン酸との共重合体、カルボキシメチルセルロース、ポリビニルピロリドン、ポリ1,3-ジオキソラン、エチレンとマレイン酸ヒドラジドとの共重合体、ポリシアル酸、シクロデキストリン等を含む。

【 0 0 1 0 】

タンパク質薬剤の半減期の他の延長方法は、タンパク質薬剤の分子量を増加させるためのキャリアーとして使用される血中タンパク質またはその断片を、前記タンパク質薬剤と結合または融合させる。例えば、免疫グロブリンのFc断片は、後者の半減期を延長するために、ターゲットタンパク質と結合させてもよい。例えば、この戦略は、Notch1受容体タンパク質 (Kitajewsky Janら、WO2005111072)、エリスロポエチン (EPO) (Gillies Stephen D.ら、WO2005063808)、ヒトソマトロピン (Kim Young Minら、WO2005047337) 等に用いられている。血漿アルブミンは、一般的に用いられる他の結合キャリアーであり、抗生物質、抗炎症剤および抗酸化剤 (Ezrin Alan Mら、WO0117568, Otagiri Masakiら、EP1571212) 等のようなタンパク質に用いられている。

10

【 0 0 1 1 】

*in vitro*で前記タンパク質薬剤を血中タンパク質キャリアーと直接結合させることに加えて、薬剤タンパク質に、生体内分子への化学的反応活性または高い親和性を与えるために、薬剤タンパク質の*in vitro*での修飾も可能である。これにより、前記薬剤タンパク質は、体内に入って血中成分との反応が可能になり、より長い半減期を有する巨大分子または化合物を形成する。一例は、血中タンパク質または細胞表面タンパク質のメルカプト基と反応できるマレイミドを持つ活性基で修飾された、抗ウイルス作用の小ペプチド抗RSVである (Bridon Dominique P.ら、WO0069902)。他の例は、生体内アルブミンへのタンパク質の親和性を増大させるために、前記タンパク質表面のアミノ酸残基へのアシル化反応による脂肪酸の導入である。血中に投与されると、前記タンパク質は、アルブミンとより大きな複合体を形成でき、それにより、前記タンパク質の半減期は延長される。前記方法は、長期間作用するインスリンの製造に用いられている (Kurtzhals P.ら、Biochem. J. (1995) 312, 725-731; Frokjaer S.ら、Nat Rev Drug Discov. 2005 Apr; 4(4):298-306)。

20

【 0 0 1 2 】

徐放性製剤は、タンパク質薬剤の生体内半減期の他の延長方法である。前記タンパク質薬剤は、タンパク質をキャリアーから緩やかに放出させ、それにより安定な生体内薬剤濃度を維持するために、医薬用キャリアー内に配置される。一般的に使用される徐放性製剤には、ヒドロゲル、マイクロカプセル、マイクロバルーン、微小浸透圧ポンプ、リポソーム等が含まれる (Peppas NAら、Eur. J. Pharm. Biopharm. 50, 27-46 (2000); Packhaeuser CBら、Eur. J. Pharm. Biopharm. 58, 445-455 (2004); Metselaar JMら、Mini Rev. Med. Chem. 4, 319-329 (2002))。リポソームは、二重膜構造を有する中空球体形の極微粒子である。前記二重膜は、両親媒性分子から構成されており、前記両親媒性分子の大部分はリン脂質であり、親水性の内室を形成する。前記親水性タンパク質薬剤は、前記リポソームの前記内室に封入されているため、生体内での緩やかな放出が可能であり、血中での前記タンパク質薬剤濃度を維持し、前記半減期を延長する。具体例は、神経成長因子 (Hou Xinpuら、CN1616087) およびヘモグロビン (Farmer Martha Cら、US4911929) 等である。

30

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 1 3 】

本発明は、修飾剤とエンドスタチンとにより形成される複合体を提供する。前記修飾剤は、エンドスタチンの半減期を延長可能である。

40

【 発明を実施するための最良の形態 】

【 0 0 1 4 】

本発明で使用される前記修飾剤は、共有結合を介してエンドスタチンに結合されてもよい。前記修飾剤は、巨大分子、タンパク質分子もしくはそれらの断片、ペプチド、小分子またはその他の化合物から選択されてもよい。本発明に使用できる巨大分子には、例えば、平均分子量が1,000から100,000 Da、好ましくは5,000から40,000 Daの範囲のポリエチレングリコールが含まれる。

【 0 0 1 5 】

50

本発明の一実施形態において、前記複合体は、一つ以上のポリエチレングリコール分子に結合したエンドスタチン分子である。

【0016】

ポリエチレングリコールとエンドスタチンとにより形成される本発明の前記複合体において、前記結合部位は、エンドスタチンにおける、N末端の - アミノ基、リジン残基側鎖の - アミノ基、システイン残基側鎖のメルカプト基、アスパラギン酸残基側鎖のカルボキシル基、グルタミン酸残基側鎖のカルボキシル基またはそれらの組合せである。前記結合部位は、好ましくは、エンドスタチンN末端の - アミノ基である。

【0017】

本発明の前記複合体の一実施形態において、エンドスタチン分子は、一つ以上のポリエチレングリコール分子と、前記エンドスタチン分子N末端の - アミノ基、または、野生型エンドスタチンの75番目、95番目、106番目、117番目もしくは183番目のリジン残基に対応するリジン残基側鎖の - アミノ基、またはそれらの組合せの部位で結合する。

【0018】

本発明の前記複合体の一実施形態において、前記エンドスタチン分子は、付加されたシステイン残基側鎖のメルカプト基で一つ以上のポリエチレングリコール分子と結合しており、前記付加されたシステイン残基は、前記エンドスタチン分子のN末端、C末端または内部領域に、システイン残基またはシステイン残基を含むペプチド鎖の付加により導入される。

【0019】

本発明の前記複合体の一実施形態において、エンドスタチン分子は、前記エンドスタチン分子のアスパラギン酸またはグルタミン酸残基側鎖のカルボキシル基で、一つ以上のポリエチレングリコール分子と結合している。

【0020】

本発明の複合体に使用できるタンパク質は、アルブミン、免疫グロブリン、サイロキシン結合性タンパク質、トランスサイレチン、トランスフェリン、フィブリノゲンおよびそれらの断片からなる群から選択される。

【0021】

本発明の一実施形態において、前記複合体は、一つ以上のアルブミンにエンドスタチン一分子が結合することにより形成される。前記複合体は、化学的修飾、融合発現または他の方法を介して得られてもよい。好ましくは、アルブミンはヒト血清アルブミンまたはその断片である。本発明の他の実施形態において、複合体は、エンドスタチン一分子が、一つ以上の免疫グロブリンFc断片に結合することにより形成される。前記複合体は、化学的修飾または融合発現または他の方法のいずれを介して得られてもよい。好ましくは、前記Fc断片は、ヒト免疫グロブリンIgGのFc領域の断片である。

【0022】

本発明の前記複合体は、また、小分子または小ペプチドまたは他の化合物で修飾されたエンドスタチンを含み、前記修飾されたエンドスタチンは、生体内で他の分子または成分と、反応または結合可能であり、それにより、修飾されたエンドスタチンは、生体内の他の分子または成分とのより大きな複合体を形成できる。前記修飾されたエンドスタチンは、血液成分のアミノ基、水酸基またはメルカプト基と共有結合を形成できる反応基を含む。前記反応基は、例えば、アルブミンのメルカプト基のような血液成分と反応可能なマレイミドであってもよい。このようにして、本発明の前記複合体は、アルブミンまたは免疫グロブリンのようないくつかの血液成分に強い親和性を有し、より大きな複合体の形成を可能にする。

【0023】

本発明の前記複合体は、また、他の分子または小ペプチドで修飾されたエンドスタチンを含む。例えば、前記エンドスタチンは、グリコシル化、リン酸化またはアシル化された産物であってもよく、その修飾部位は、本来のタンパク質配列に存在するアミノ酸残基、

10

20

30

40

50

または、変異により発生したアミノ酸残基である。

【0024】

修飾剤とエンドスタチンとにより形成される本発明の前記複合体は、また、非共有相互作用を介した修飾剤のエンドスタチンとの結合により形成される複合体であってもよい。前記修飾剤は、タンパク質、小分子または他の化合物であってもよい。

【0025】

本発明の前記複合体は、生体適合キャリアーを有する徐放性製剤を形成してもよい。前記徐放性製剤は、マイクロカプセル、ヒドロゲル、マイクロスフェア、微小浸透圧ポンプまたはリポソームからなる群から選択される形態であってもよい。

【0026】

本発明の前記複合体または徐放性製剤に含まれる前記エンドスタチンは、ヒト、ネズミ科または他の哺乳類起源のものであってもよい。

【0027】

本発明の具体的な一実施形態において、前記複合体または徐放性製剤中に含まれる前記エンドスタチンは、野生型のヒトエンドスタチンであり、配列番号1に示す配列を有する天然に存在する形態である。前記複合体または徐放性製剤中に含まれるエンドスタチンを *E. coli* に発現させる場合、前記野生型組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号2に示す配列を有する。N末端のメチオニンは、*E. coli* 発現時に時々欠損するため、対応する組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号1に示す配列を有する。

【0028】

本発明の前記複合体または徐放性製剤において、エンドスタチンは、エンドスタチンの活性断片、変異体、誘導体、異性体またはそれらの組合せであってもよい。好ましくは、本発明の複合体または徐放性製剤において、前記エンドスタチン断片は、配列番号3、配列番号4または配列番号5に示す配列を有するペプチドである。本発明の一実施形態において、前記エンドスタチン誘導体は、野生型エンドスタチンのN末端またはC末端への長さ1から15アミノ酸のペプチド付加により形成される。例えば、本発明の前記複合体または徐放性製剤において、前記エンドスタチン誘導体は、野生型ヒトエンドスタチンN末端への9つのアミノ酸 His タグ MGGSHHHHH 付加により形成されるため、前記誘導体は、配列番号6に示す配列を有する。前記誘導体を *E. coli* に発現させるとき、N末端のメチオニンは時々部分的に欠損するため、対応する誘導体は、配列番号7に示す配列を有してもよい。

【0029】

本発明は、また、本発明の複合体または徐放性製剤および薬学上許容できるキャリアーを含む医薬組成物を提供する。本発明は、本発明の前記複合体、組成物または徐放性製剤、およびそれらの使用説明書を含むキットを提供する。

【0030】

本発明は、また、前述のエンドスタチンを含む複合体の製造方法を提供する。前記方法は、活性化ポリエチレングリコールをエンドスタチンと混合し、溶液、温度、pHおよび反応モル比を含む適切な条件下で反応させる工程を含む。好ましくは、前記方法で使用されるpHは、pH3~10である。前述の方法では、前記複合体は、例えば、陽イオン交換カラムまたはゲルろ過により精製してもよい。

【0031】

本発明は、また、癌の予防、診断および治療、ならびに、異常な血管新生により生じるヒトの組織または器官の障害によって特徴づけられる他の疾患の予防、診断および治療における、前述のエンドスタチンを含む複合体、徐放性製剤、医薬組成物またはキットの使用法を提供する。

【0032】

本発明は、また、エンドスタチンの生体内半減期の延長方法を提供する。前記方法は、エンドスタチンとエンドスタチンの生体内半減期を延長できる修飾剤との間で、複合体を形成させる工程を含む、または、エンドスタチンもしくはエンドスタチンを含む複合体、

10

20

30

40

50

および生体適合物質を含む徐放性製剤を提供する工程を含む。

【 0 0 3 3 】

本発明のこれらおよび他の側面は、後述の発明の詳細な説明で明らかにされる。前述の一般的な説明および後述の詳細な説明は、実施例と同様に、説明目的のために過ぎず、本発明の範囲の限定を意図していないことは、理解されるべきである。

【 0 0 3 4 】

図 1 は、野生型ヒトエンドスタチンのアミノ酸配列を示す（配列番号 1）。

図 2 は、*E. coli* のある菌株に発現させた野生型ヒトエンドスタチン（配列番号 2）のアミノ酸配列を示す。N 末端のメチオニン残基は、時には欠損してもよい。この場合、N 末端のメチオニンを欠損したエンドスタチンの配列は、配列番号 1 の配列を有する。

図 3 は、エンドスタチンの生物学的活性断片のアミノ酸配列を示す（配列番号 3）。

図 4 は、エンドスタチンの他の生物学的活性断片のアミノ酸配列を示す（配列番号 4）。

図 5 は、エンドスタチンの他の生物学的活性断片のアミノ酸配列を示す（配列番号 5）。

図 6 は、N 末端に付加的なアミノ酸を有する生物学的に活性なエンドスタチンのアミノ酸配列を示す（配列番号 6、図 6 A）。N 末端のメチオニンは、時には発現後、部分的に欠損してもよい。この場合、N 末端のメチオニンを欠損したエンドスタチンは、配列番号 7（図 6 B）のアミノ酸配列を有する。

図 7 は、配列番号 2 の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンの N 末端への 20 k D a のポリエチレングリコールの結合を示す。反応前および反応後の溶液を SDS - PAGE 検出に供した。レーン 1、20 k D a のポリエチレングリコールで修飾されたエンドスタチン、レーン 2、未修飾のエンドスタチン、レーン 3、タンパク質マーカである。

図 8 は、配列番号 6 の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンの N 末端への 20 k D a のポリエチレングリコールの結合を示す。修飾前および修飾後の溶液を SDS - PAGE 検出に供した。レーン 1、未修飾のエンドスタチン、レーン 2、20 k D a のポリエチレングリコールで修飾されたエンドスタチン、レーン 3、タンパク質マーカである。

図 9 は、20 k D a のポリエチレングリコールで N 末端が修飾された配列番号 2 の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンの陽イオン交換カラム SP 精製を示す。タンパク質を陽イオン交換カラム SP に結合させ、塩化ナトリウム勾配溶液で溶出し、最終的には還元条件下での SDS - PAGE 検出に供した。レーン 1、精製前、レーン 2、フロースルー、レーン 3 ~ 10、回収した溶出画分。

図 10 は、配列番号 6 の配列を有し、20 k D a のポリエチレングリコールで N 末端が修飾された組み換えヒトエンドスタチンの陽イオン交換カラム SP 精製を示す。タンパク質を陽イオン交換カラム SP に結合させ、塩化ナトリウム勾配溶液で溶出し、最終的には還元条件下での SDS - PAGE での検出に供した。レーン 1、精製前、レーン 2、フロースルー、レーン 3 ~ 8、回収した溶出画分。

図 11 は、40 k D a のポリエチレングリコールで N 末端が修飾された配列番号 2 の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンの陽イオン交換カラム SP 精製を示す。タンパク質を陽イオン交換カラム SP に結合させ、塩化ナトリウム勾配溶液で溶出し、最終的には還元条件下での SDS - PAGE での検出に供した。レーン 1、精製前、レーン 2、フロースルー、レーン 3 ~ 10、回収した溶出画分。

図 12 は、20 k D a のポリエチレングリコールが N 末端に結合した組み換えヒトエンドスタチンの血管内皮細胞の移行阻害活性を示す。配列 2 : 配列番号 2 のエンドスタチン ; PEG - 配列 2 : 20 k D a のポリエチレングリコールで修飾された配列番号 2 のエンドスタチン ; 配列 6 : 配列番号 6 のエンドスタチン ; PEG - 配列 6 : 20 k D a のポリエチレングリコールで修飾された配列番号 6 のエンドスタチン。

図 13 は、20 k D a のポリエチレングリコールが N 末端に結合した組み換えヒトエンドスタチンのマウス内の肉腫 S 1 8 0 阻害活性を示す。配列 2 : 配列番号 2 のエンドスタチンの連日投与 ; PEG - 配列 2 : 1 : 20 k D a のポリエチレングリコールで修飾され

10

20

30

40

50

た配列番号2のエンドスタチンの連日投与；PEG-配列2 2：20kDaのポリエチレングリコールで修飾された配列番号2のエンドスタチンの1日おきの投与；PEG-配列2 3：20kDaのポリエチレングリコールで修飾された配列番号2のエンドスタチンの3日ごとの投与；配列6：配列番号6のエンドスタチンの連日投与；PEG-配列6 1：20kDaのポリエチレングリコールで修飾された配列番号6のエンドスタチンの連日投与；PEG-配列6 2：20kDaのポリエチレングリコールで修飾された配列番号6のエンドスタチンの1日おきの投与；PEG-配列6 3：20kDaのポリエチレングリコールで修飾された配列番号6のエンドスタチンの3日ごとの投与。

図14は、20kDaのポリエチレングリコールでチロシン残基側鎖の - アミノ基が修飾された配列番号6の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンのゲルろ過精製を示す。レーン1、充填したサンプル；レーン2～10、回収した溶出画分。

図15は、20kDaのポリエチレングリコールでチロシン残基側鎖の - アミノ基が修飾された配列番号6の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンの陽イオン交換カラムCM精製を示す。レーン1、充填したサンプル；レーン2、フロースルー；レーン3～8、回収した溶出画分。

【0035】

発明の詳細な説明

本発明は、より長い半減期を有するエンドスタチン製品を提供する。それは、未修飾のエンドスタチンよりも、生体内での代謝の安定性、長い半減期を示す一方、新しい血管形成の阻害活性を維持する。好ましくは、本発明で使用されるエンドスタチンは、ヒトエンドスタチンである。

【0036】

本発明の一実施形態は、修飾剤とエンドスタチンとにより形成される複合体に関する。本発明における「複合体」という言葉は、安定した複合体を形成するために、前記エンドスタチンと修飾剤とが、共有結合または非共有結合のいずれかで結合されている、修飾されたエンドスタチンをいう。したがって、「修飾」は、共有または非共有結合のいずれを介しても達成できる。前記修飾剤は、エンドスタチンに化学的に結合可能であり、または、エンドスタチンとの融合物の一部として発現可能である。好ましい実施形態において、前記修飾は、部位特異的で、例えば、受容体への結合等のエンドスタチンの生物学的活性に影響しない。この修飾された製品は、抗血管新生活性を維持し、未修飾のエンドスタチンよりも、血中での高い代謝安定性、長い半減期を示し、したがって、抗血管形成または抗癌複合体として使用可能である。前記修飾剤は、生体適合性を有し、エンドスタチンの半減期を増加できる、一つ以上の巨大分子重合体、タンパク質もしくはその断片、ペプチドまたは他の化学的化合物であってもよい。

【0037】

前述の巨大分子重合体は、それ自身の生物学的活性を有していても有していなくてもよい。適切な巨大分子重合体は、ポリエチレナルコール、ポリエーテル化合物、ポリビニルピロリドン、ポリアミノ酸、ジビニルエーテルと無水マレイン酸との共重合体、N-(2-ヒドロキシプロピル)-メタクリルアミド、多糖、ポリオキシエチル化ポリオール、ヘパリンまたはその断片、ポリ-アルキル-エチレングリコールおよびその誘導体、ポリ-アルキル-エチレングリコールとその誘導体との共重合体、ポリビニルエチルエーテル、a, P-ポリ((2-ヒドロキシエチル)-DL-アスパルタミド、ポリカルボン酸、ポリオキシエチレン-オキシメチレン、ポリアクリロイルモルホリン、アミノ化合物と酸化オレフィンとの共重合体、ポリヒアルロン酸、ポリオキシラン、エタン二酸とマロン酸との共重合体、ポリ(1,3-ジオキソラン)、エチレンとマレイン酸ヒドラジドとの共重合体、ポリシアル酸、シクロデキストリン等を含むが、それらには限定されない。

【0038】

前述のポリエチレナルコールは、ポリエチレングリコール(モノメトキシポリエチレングリコール、モノヒドロキシポリエチレングリコール)、ポリビニルアルコール、ポリアリルアルコール、ポリブテンアルコールおよびそれらの誘導体を含むが、それらには限

10

20

30

40

50

定されない。好ましい実施形態において、前記修飾剤は、ポリエチレングリコールである。より好ましい実施形態において、ポリエチレングリコールは、モノメトキシポリエチレングリコールである。

【0039】

前述のポリエーテル化合物は、ポリアルキレングリコール ($\text{HO}((\text{CH}_2)_x\text{O})_n\text{H}$)、ポリプロピレングリコール、ポリオキシエチレン ($\text{HO}((\text{CH}_2)_2\text{O})_n\text{H}$)、ポリビニルアルコール ($(\text{CH}_2\text{CHOH})_n$) およびそれらの誘導体を含むが、それらには制限されない。

【0040】

前述のポリアミノ酸は、例えば、ポリアラニン等の一種類のアミノ酸の重合体および二種以上のアミノ酸の共重合体を含むが、それらには制限されない。

10

【0041】

前述の多糖は、例えば、硫酸デキストラン、セルロースおよびその誘導体（メチルセルロースおよびカルボキシメチルセルロースを含む）、でんぷんおよびその誘導体、ポリスクロース等のグルコサンおよびその誘導体を含むが、それらには制限されない。

【0042】

本発明の修飾のキャリアーとして使用される好ましいタンパク質分子は、天然に存在するタンパク質またはその断片で、サイロキシン結合性タンパク質、トランスサイレチン、トランスフェリン、フィブリノゲン、免疫グロブリン、アルブミンおよびそれらの断片を含むが、それらには制限されない。好ましいキャリアータンパク質は、ヒトのタンパク質である。前述のタンパク質断片とは、キャリアータンパク質として機能する活性を依然有するタンパク質の部分を用いる。

20

【0043】

エンドスタチンは、共有結合を介して直接的または間接的に前記修飾剤に結合される。直接的な結合とは、エンドスタチンの一つのアミノ酸が、ペプチド結合またはジスルフィド架橋を介してキャリアータンパク質の一つのアミノ酸に直接結合されることを意味する。間接的な結合とは、エンドスタチンが、一つ以上の化学基を介してキャリアータンパク質に結合されることを意味する。

【0044】

ポリエチレングリコールでのエンドスタチンの修飾に関していくつかの報告がある。Guoying Mou(2005)およびShenglin Yang(2005)の報告では、平均分子量 6 kDa または 10 kDa を有する PEG 分子でエンドスタチンを修飾すると、前記修飾剤は、リジン残基側鎖の ϵ -アミノ基に結合されるため、その産物は、複数部位が修飾された産物の混合物であった。ある一定範囲の分子量の産物を得るために、前記産物は、分子ふるいまたはイオン交換クロマトグラフィーにより精製できるが、そのような修飾剤の反応性に富む性質のために、修飾部位およびタンパク質の構造の非均一性のようないくつかの欠点が依然存在する。さらに、タンパク質の前記複数部位での修飾により、内部のアミノ酸の構造が変化する結果、前記タンパク質の活性が低下する。生物学的な製品では、製品の均一性は、免疫原性と同様に毒性を減少させるために非常に重要である。加えて、混合物の場合、異なるバッチ間での同一の品質および効力の安定性を保証することもまた困難である。したがって、成分の一貫性、構造の均一性および活性の安定性を保証する方法は、薬品のデザインおよび調製において、重要な点であり、解決すべき問題である。

30

40

【0045】

本発明の一実施形態において、ポリエチレングリコール (PEG) で修飾されたエンドスタチンは、エンドスタチン一分子が、共有結合により一つ以上の PEG 分子に結合するという点で特徴づけられる。エンドスタチンの前記結合部位は、N末端 ϵ -アミノ基、リジン残基側鎖の ϵ -アミノ基、システイン残基のメルカプト基、アスパラギン酸残基側鎖のカルボキシル基、グルタミン酸残基側鎖のカルボキシル基のうち一つまたはそれらの組合せであってもよい。結合に使用するポリエチレングリコールは、1,000~100,000 Da、好ましくは 5,000~40,000 Da の平均分子量を有し、線状または

50

分岐状のいずれでもよい。本明細書では、ポリエチレングリコールの分子量とは、平均分子量のことをいう。

【0046】

PEG修飾により、前記薬剤の薬物動態的性質が、改良される可能性があるが、そのような修飾は、巨大分子薬剤の前記生物的活性も減少させる可能性がある。この主な理由は、異なる修飾部位が、異なる構造変化という結果をもたらす可能性があり、前記薬剤の活性部位を遮蔽する可能性があるからである (Veronese F.ら、Drug Discovery Today, 10, 21, 2005)。例えば、異なるPEGで修飾した後、異なって修飾されたインターフェロン 1bの前記活性は低下し、前記修飾分子の最大活性は、未修飾分子の活性の71%に相当するレベルに達するに過ぎず、いくつかの修飾タンパク質は、ほとんど全く活性を示さない。そのため、PEG修飾は、薬剤の薬物動態的性質を変化させるが、結果としてそれは薬剤の前記活性をも損なう可能性がある。したがって、生体内で全般的に最適な結果を達成するためには、選択時に修飾の過程および修飾剤の両面を考慮に入れる。本発明の一実施形態において、N末端特異的PEG化剤 (mPEG-ButyrALD、Nektar社) が、組み換えヒトエンドスタチン修飾に使用される。これにより、前記タンパク質N末端のアミノ基で一つの組み換えエンドスタチンにPEG一分子が結合することによって形成される製品が生じる。同一のN末端PEG化剤を使用して修飾されたインターフェロン 1bが、in vitro試験で未修飾タンパク質の70%の活性しか示さなかったという報告がされた (Filpula D.ら、Bioconjugate Chem. 2006, 17, 618-630)。しかし、本発明において、我々は、N末端が修飾されたエンドスタチンの有効性は、驚くべきことに内皮細胞の移行を阻害するに際して、未修飾タンパク質の2倍以上に達することを見いだした。修飾後のエンドスタチンの前記生物学的活性の顕著な増加が示されたが、まだ報告されていない。しかし、G Mouら (2005)により、エンドスタチンの複数部位の修飾は、in vitroの試験での活性の低下を結果的に生じることが報告された。これは、関連文献における修飾エンドスタチンと比較して、本発明の製品のin vitroでの活性が、はるかに優れていることを示す。一方、構造解析で示されたように、ヒト野生型エンドスタチンN末端に、1番目、3番目、11番目、76番目のアミノ酸からなる亜鉛結合部位が見いだされた。これらの部位が、ヒトエンドスタチンの安定性および活性に重要であり、エンドスタチンが受容体と結合して活性を発揮するための、ヒトエンドスタチンの結合部位を形成することが報告されている (Ding, Y. H., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 95, 10443-10448; Hohenester, E., EMBO J. 17, 1656-1664; Boehm, T., Biochem. Biophys. Res. Commun. 252, 190-194; Ricard-Blum, S., J. Biol. Chem. 279, 2927-2936; Tjin Tham Sjin, R. M., Cancer Res. 65(9): 3656-63)。PEGは大きい分子量および大きい空間的障害を有するので、タンパク質の修飾は活性部位で起こるべきではないと提案されている。さもなければ、これはタンパク質の構造を大きく破壊する可能性があり、続いてタンパク質の活性を損なう可能性がある。しかし、本発明の製品は、活性の低下を回避するだけでなく、予想外のより高い活性をも示す。

【0047】

本発明の一実施形態において、エンドスタチンは、タンパク質またはペプチドに結合し、それは、エンドスタチン一分子が、一つ以上のタンパク質またはペプチドに、直接的または間接的に結合することで特徴づけられる。エンドスタチンが、より多くのキャリアータンパク質と結合する場合、選択されたキャリアータンパク質は、同一でも異なってもよい。好ましくは、前記キャリアータンパク質は、天然に存在するタンパク質またはその断片である。好ましい実施形態において、修飾のために選択された前記キャリアータンパク質は、ヒト血清アルブミンまたはその断片である。他の好ましい実施形態において、前記キャリアータンパク質は、ヒト免疫グロブリンIgGのFc断片である。

【0048】

本発明の他の実施形態において、前記修飾剤は、エンドスタチンを含む前記複合体が、特定の血中成分と反応する、または、高い親和性を有することを可能にするような、小分

10

20

30

40

50

子または小ペプチドまたは他の化合物である。具体的な実施形態において、前記製品は、反応活性基を有し、共有結合を形成するためにアミノ基、カルボキシル基またはメルカプト基と反応可能である。他の具体的な実施形態において、前記製品の活性基が、アルブミンのような血液成分のメルカプト基と反応可能なマレイミドである。他の具体的な実施形態において、前記製品は、アルブミンまたは免疫グロブリンのようないくつかの血液成分に強い親和性を有し、より大きな複合体を形成可能とする。

【0049】

本発明の他の実施形態において、小分子または小ペプチドで修飾されたエンドスタチンは、グリコシル化、リン酸化またはアシル化されていてもよい。前記修飾部位は、タンパク質に元々存在していたアミノ酸残基、または、変異により生じたアミノ酸残基であってもよい。前記複合体の分子量はそれほど大きくはないが、前記修飾がエンドスタチンの特徴を変化させるために、前記複合体の半減期は長くなる。

10

【0050】

本発明の他の実施形態において、エンドスタチンを含む前記複合体は、エンドスタチンと、タンパク質や小分子のような修飾剤との間の非共有相互作用を介して形成される複合体である。この複合体は、血管新生を阻害する活性を有し、エンドスタチンよりも長い生体内半減期を有する。

【0051】

本発明の他の実施形態は、エンドスタチンを含む徐放性製剤に関する。前記徐放性製剤は、エンドスタチンまたは任意の前述の複合体および生体適合物質からなる。この組成中のエンドスタチンは、依然生物学的活性を有し、同時に、前記薬剤の薬物動態学上の性質を変化させる前記キャリアーのために、その生体内半減期は延長される。前記徐放性製剤は、マイクロカプセル、ヒドロゲル、マイクロビーズ、微小浸透圧ポンプおよびリポソーム等であってもよいが、それらには制限されない。

20

【0052】

本発明は、また、前述のエンドスタチンを含む複合体または徐放性製剤、および薬学上許容できるキャリアーを含む医薬組成物を提供する。さらに、本発明は、また、前述のエンドスタチンを含む複合体または徐放性製剤と使用説明書とを含むキットを提供する。

【0053】

この発明で使用される前記薬学上許容できるキャリアーは、選択された服用量および濃度で接触しても細胞または哺乳類に無毒なキャリアー、賦形剤または安定化剤を含む。一般的に使用される生理学的に許容できるキャリアーは、水溶性のpH緩衝液である。生理学的に許容できるキャリアーの例は、リン酸緩衝液、クエン酸緩衝液および他の有機酸緩衝液のような溶液；アスコルビン酸を含む抗酸化剤；低分子量のポリペプチド（10残基以下）；血清アルブミン、グルチンもしくは免疫グロブリンのようなタンパク質；ポリビニルピロリドンのような親水性ポリマー；グリシン、グルタミン、アスパラギン、アルギニンもしくはリジンのようなアミノ酸；単糖、二糖およびグルコース、マンノースもしくはデキストリンを含む他の炭水化物；EDTAのようなキレート剤；マンニトールもしくはソルビトールのような糖アルコール；ナトリウムイオンのような塩を形成する対イオン；ならびに/またはTween（登録商標）、PEG、PLURONICS（登録商標）のような非イオン性界面活性剤を含む。好ましくは、前記賦形剤は、殺菌されており、通常は望ましくない物質は含まれていない。これらの組成は、通常の殺菌技術により、殺菌できる。

30

40

【0054】

本発明は、また、前述のエンドスタチン製品の調製方法に関する。具体的には、本発明は、活性化PEGをエンドスタチンと混合し、溶液、温度、pHおよび反応モル比を含む適切な条件下で反応させ、陽イオン交換カラムまたは分子ふるいを使用して、結合した製品を精製する工程を含む、PEG化エンドスタチンの調製方法を提供する。好ましくは、この反応のpHは、pH3~10である。

【0055】

50

本発明は、また、癌の予防、診断および治療における、前述のエンドスタチンを含む複合体、徐放性製剤、医薬組成物またはキットの使用法をも提供する。本発明の前記方法で治療するに適した癌は、肺癌、神経内分泌腫瘍、大腸癌、骨肉腫、肝癌、胃癌、膵臓癌、口腔癌、乳癌、前立腺癌、リンパ腫、食道癌、口腔癌、鼻咽腔癌、子宮頸癌、肉腫、腎臓癌、胆道癌、悪性黒色腫等を含むが、それらには制限されない。

【0056】

本発明は、また、抗癌剤の調製における、前述のエンドスタチンを含む複合体、医薬組成物または徐放性製剤の使用法を提供する。

【0057】

本発明は、また、制限されないが、異常な血管新生により生じる組織もしくは器官の障害によって特徴づけられる疾患の予防、診断、治療のための前述のエンドスタチンを含む複合体、徐放性製剤、医薬組成物またはキットの使用、または、そのような疾患の治療のための医薬品調製における使用を提供する。

10

【0058】

本発明によると、前記投与経路は、静脈内注射、静脈内注入、皮下注射、筋内注射、腹腔内注射、経皮吸収、皮下への埋め込み、肝動脈注射、経口投与、経鼻投与、口腔粘膜投与、眼内投与、直腸投与、腔内投与および他の臨床上許容できる経路からなる群から選択される。

【0059】

本発明は、また、エンドスタチンとエンドスタチンの生体内半減期を延長可能な修飾剤との間で複合体を形成する工程、および、エンドスタチンを含む徐放性製剤を調製する工程を含む、エンドスタチンの半減期の延長方法を提供する。

20

【0060】

我々の実験データは、本発明の製品、すなわち、エンドスタチンN末端へのPEGの結合により形成される複合体は、内皮細胞の移行および癌成長を阻害する活性を有することを示す。この複合体は、未修飾のエンドスタチンと比較すると、有意に高い活性を示した。さらに、薬物動態研究により、この修飾された産物の生体内での代謝が効果的に減速され、その半減期が延長されたことが明らかになった。

【0061】

他に指定されない限り、本明細書で使用されるエンドスタチンは、ヒト、ネズミ科または他の哺乳類由来のものであってもよい。好ましい実施形態において、前記エンドスタチンは、ヒトエンドスタチンである。他に指定されない限り、本明細書で使用されるエンドスタチンは、野生型エンドスタチン、すなわち天然に存在する形態；または生物的に活性のある変異体、断片、異性体もしくはそれらの誘導体、またはそれらの組合せであってもよい。エンドスタチンは、動物細胞での発現で得られ、または、酵母もしくはE. Coliから発酵およびさらなる精製により得られる。動物細胞に発現させた野生型ヒトエンドスタチンのアミノ酸配列を、配列番号1に示す。酵母に発現させた組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号1に示すアミノ酸配列を有してもよいし、または、N末端に10アミノ酸以下の追加もしくは欠損を有する配列番号1の配列を有してもよい。E. Coliに発現させた組み換えヒトエンドスタチンのアミノ酸配列を配列番号2に示すが、発現後にN末端のメチオニンが、時には欠失することがあり、これが起こったときは、結果生じた組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号1に示す配列を有する。

30

40

【0062】

エンドスタチンの変異体とは、アミノ酸の置換、欠失または挿入の導入により得られるエンドスタチン分子をいう。エンドスタチンの断片とは、配列番号1または配列番号2の配列の部分を用いる。前記断片は、例えば、酵素による切断、遺伝子操作での発現、またはポリペプチド合成により得られてもよい。例えば、配列番号3、配列番号4または配列番号5の配列を有する前記断片は、固形癌を阻害する活性を有すると報告された(Cattaneo MGら、Experimental Cell Research 283 (2003) 230-236; Tjin Tham Sjin RMら、Cancer Research (2005) 65(9) 3656-3663)。エンドスタチンの異性体とは、

50

野生型エンドスタチンと同一のアミノ酸配列を有するが、2次もしくは3次のタンパク質構造の違い、または局所アミノ酸の光学活性の変化を含めた、異なる構造を持つ分子をいう。前記異性体は、天然に生じる変異体であってもよいし、または、人工的なデザインにより得られてもよい。エンドスタチン誘導体とは、野生型エンドスタチンの修飾により生じる産物をいう。修飾とは、リン酸分子または炭水化物分子のような一つ以上の小分子または20アミノ酸未満のオリゴペプチドを、タンパク質の任意のアミノ酸において、前記タンパク質に共有結合することをいう。好ましい実施形態において、Hisタグ(MGGSHHHH)を含む9アミノ酸のペプチド鎖をヒトエンドスタチンN末端に付加し、この派生したエンドスタチンは、配列番号6の配列を有する(Luo Yongzhangら、US2004110671)。E. Coliに発現させるとき、そのN末端のメチオニンが、時には欠失することがあり、これが起こったときは、結果として生じるN末端のメチオニンを欠いた組み換えヒトエンドスタチンの誘導体は、配列番号7の配列を有する。活性変異体、断片、異性体または誘導体の組合せとは、前記製品が、前述の修飾を2つ以上同時に有することを意味し、制限されないが、例えば、断片の変異体または修飾された変異体等である。

10

20

30

40

50

【実施例】

【0063】

実施例1：組み換えヒトエンドスタチンN末端への20kDaのPEGの結合

本実施例で使用した組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号2および配列番号6の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンを含む。具体的には、組み換えヒトエンドスタチン(Protgen社)を30mM酢酸ナトリウム溶液、pH5.5に透析した。タンパク質濃度は、UV分光光度計(Agilent Technologies社)を用いて280nmの吸光度測定により決定し、2mg/mlに調整した。タンパク質N末端を特異的に修飾する20kDaのPEG(mPEG-ButyrALD 20kDa、Nektar社)を、共有結合に使用した。具体的には、この20kDaPEG(固体)80mgを、20mlのタンパク質溶液(40mgのタンパク質を含む)に加え、PEG固体が完全に溶けるまで混合液を室温で攪拌した。PEGとエンドスタチンとのモル比は2:1とした。還元剤として CH_3BNNa (Sigma社)を最終濃度20mMになるように加え、最終的に前記溶液のpH値を5に調整した。室温で10時間静置した後、80%以上のエンドスタチンが、モノPEG化により修飾された。これは、PEG一分子が、エンドスタチン一分子に、エンドスタチンのN末端 - アミノ基で共有結合されていることを意味する。少量のエンドスタチンだけが、複数部位で非特異的に修飾された。前記反応液は、カラムクロマトグラフィーにより直接的に精製できる。反応前後の溶液の電気泳動による解析を、図7および8に示す。

【0064】

実施例2：20kDaのPEGでN末端が修飾された組み換えヒトエンドスタチンの陽イオン交換SPカラムによる精製

本実施例で使用した組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号2および配列番号6の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンを含む。具体的には、20kDaのPEGで修飾されたヒトエンドスタチンは、SPクロマトグラフィーカラム(Amersham社)で精製した。混合溶液のpH値を、反応後に6に調整した。前記サンプルは、10mMリン酸塩を含むpH6.0の緩衝液であらかじめ平衡化したカラムに充填した。前記サンプルを充填した後、10mMリン酸塩および1M塩化ナトリウムを含むpH6.0の緩衝液で勾配的溶出を行った。最小限の充填に起因して、浸透および洗浄の間に、前記反応に関与しなかったPEGのピークが出現した。溶出ピークは、複数部位が修飾されたエンドスタチン、一部位が修飾されたエンドスタチン、および未修飾のエンドスタチンの順番で出現した。異なる画分は、280nmでの吸光度にしたがって回収できる。精製の結果を、図9および10に示す。

【0065】

実施例3：組み換えヒトエンドスタチンN末端への40kDaのPEGの結合

本実施例で使用した組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号2および配列番号6の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンを含む。具体的には、前記組み換えヒトエンドス

タチンは、30 mM 酢酸ナトリウム溶液、pH 5.5 に透析した。タンパク質濃度は、UV 分光光度計を用いて波長 280 nm で測定し、2.5 mg/ml に調整した。タンパク質 N 末端を特異的に修飾する 40 kDa の PEG (mPEG-ButyrALD 40kDa、Nektar 社) を共有結合に使用した。具体的には、この 40 kDa の PEG (固体) 160 mg を 20 ml のタンパク質溶液 (40 mg のタンパク質を含む) に加え、PEG が完全に溶けるまで前記溶液を室温で攪拌した。PEG とエンドスタチンとのモル比は、2 : 1 とした。その後、還元剤として CH_3BNNa (Sigma 社) を濃度 20 mM になるように加え、最終的に、溶液の pH 値を 5 に調整した。室温で 10 時間静置した後、80% 以上のエンドスタチンが、モノ PEG 化により修飾された。すなわち、PEG 一分子が、エンドスタチン一分子にタンパク質の N 末端 - アミノ基で共有結合した。少量のエンドスタチンだけが、複数部位で非特異的に修飾された。前記反応液は、カラムクロマトグラフィーにより直接的に精製できる。

10

【0066】

実施例 4 : 40 kDa の PEG で N 末端が修飾された組み換えヒトエンドスタチンの陽イオン交換 SP カラムによる精製

本実施例で使用した組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号 2 および配列番号 6 の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンを含む。具体的には、40 kDa の PEG で修飾されたヒトエンドスタチンを、SP クロマトグラフィーカラム (Amersham 社) で精製した。反応後、混合溶液の pH 値を 6 に調整した。10 mM リン酸塩を含む pH 6.0 の緩衝液であらかじめ平衡化したカラムに、前記サンプルを充填した。前記サンプルの充填後、10 mM リン酸塩および 1 M 塩化ナトリウムを含む pH 6.0 の緩衝液で勾配的溶出を行った。最小限の充填により、浸透および洗浄の間に、反応に関与しなかった PEG のピークが、複数部位が修飾されたエンドスタチン、一部位が修飾されたエンドスタチン、および未修飾のエンドスタチンの順番で出現した。280 nm での吸光度にしたがって、異なる画分を回収できる。配列番号 2 の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンの精製の結果を、図 11 に示す。配列番号 6 の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンの精製の結果は、配列番号 2 のそれと類似する (データは示さない)。

20

【0067】

実施例 5 : 20 kDa の PEG が N 末端に共有結合した組み換えヒトエンドスタチンの血中での延長された有効性

30

本実施例で使用した組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号 2 および配列番号 6 の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンを含む。PEG 修飾および未修飾の組み換えヒトエンドスタチンタンパク質の生体内半減期をそれぞれ測定することにより、PEG 修飾された組み換えヒトエンドスタチンの延長された有効性を評価した。6 匹の健康な昆明マウス (約 25 g) (Vitalriver 実験動物センター) を 3 つの群に分け、群あたり 3 匹のマウスとした。そして、前記マウスに、それぞれ未修飾または 20 kDa の PEG で N 末端が修飾された組み換えヒトエンドスタチン (Protgen 社) を、投薬量 15 mg / 体重 kg で、尾部静脈を介して注射した。そして、2、10、30 分、1、2、4、8、16、24、36、48 および 72 時間で、血液サンプルを尾部静脈から採取した。それから、血漿を回収し、PEG 修飾または未修飾のエンドスタチンの濃度を、それぞれサンドウィッチ ELISA により測定した。20 kDa の PEG で修飾を受けると、配列番号 2 の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンの半減期は、マウス中で平均 4.8 時間から平均 16 時間へと増加し、配列番号 6 の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンの半減期は、マウス中で平均 7.5 時間から平均 16 時間へと増加したことが、薬物動態解析により明らかになった。これらの結果により、高分子量の PEG を組み換えヒトエンドスタチンに結合させることによって、前記エンドスタチンの生体内半減期が効果的に増加し、有効性を延長できることが示された。

40

【0068】

実施例 6 : 20 kDa の PEG が N 末端に結合した組み換えヒトエンドスタチンの血管内皮細胞移行阻害活性

50

本実施例で使用した組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号2および配列番号6の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンを含む。具体的には、10%血清含有DMEEM培地(Hyclone社)で、ヒト微小血管内皮細胞(HMEC)を対数期まで培養した。そして、前記細胞を12時間血清飢餓状態に置いた。トリプシン(Sigma社)消化後、細胞移行の測定のために、wellごとに10000細胞をプレートに加えた。移行アッセイの条件は、DMEEM培地、1%血清および10ng/mlのbFGF(Sigma社)および抗生物質(ストレプトマイシンおよびアンピシリン、いずれも10μg/ml、Sigma社)を含む。治療群には、修飾または未修飾のエンドスタチン30μg/mlを細胞に加えた。37で8時間培養後、プレートの前記細胞を1%グルタルアルデヒドで固定した。そして、メンブレン上層の移行しなかった細胞を除去し、下層の細胞をヘマトキシレンで染色した。顕微鏡(Olympus社)下で細胞数を数えた。一つのプレート上の三つの異なる視野の細胞を数え、阻害率を算出した。その結果、配列番号2の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンでは、前記細胞移行阻害率は42%であるが、修飾されたエンドスタチンでは、前記細胞移行阻害率は90%であることが示された。配列番号6の配列の組み換えヒトエンドスタチンでは、前記細胞移行阻害率は45%であるが、修飾されたエンドスタチンでは、前記阻害率は90%であった。上記の結果により、PEGでのエンドスタチン修飾は、その生物学的活性を維持するだけでなく、大きく促進することが示された。前記実験結果を、図12に示す。

10

【0069】

実施例7：20kDaのPEGがN末端に結合した組み換えヒトエンドスタチンのマウス癌モデルの治療における活性

20

本実施例で使用した組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号2および配列番号6の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンを含む。20kDaのPEGで修飾されたエンドスタチンのマウスS180癌の生体内阻害活性を観察するために、実験を行った。約20gの昆明マウスを本実験に使用した。マウスの腋窩に、マウスあたり 2×10^6 細胞のS180肉腫細胞(中国細胞バンクQK10952)を植え付けた。そして、翌日前記マウスをランダムに群に分け、群あたり8匹のマウスとした。前記群は、ネガティブコントロール群(通常の生理食塩水)、ポジティブコントロール群(エンドスタチン、1.5mg/体重kg、連日)、3つの治療群(PEGで修飾されたエンドスタチン、1.5mg/体重kg、それぞれ連日、1日おき、3日ごと)を含む。治療は、尾部静脈注射により行った。投与は、10日間続けた。11日目に前記マウスを殺し、癌の重量を測定し、次のように算出する癌阻害率により有効性を評価した。

30

癌阻害率 = $[(\text{ネガティブコントロール群の癌重量} - \text{治療群の癌重量}) / \text{ネガティブコントロール群の癌重量}] \times 100\%$

配列番号2の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンは、連日、1日おき、および3日ごとに治療した群では、前記癌阻害率が、それぞれ47%、53%および40%であるのに、ポジティブコントロール群の前記癌阻害率は、34%であることが、前記実験結果により明らかになった。配列番号6の配列を有し、N末端に付加的なアミノ酸がある組み換えヒトエンドスタチンは、連日、1日おき、および3日ごとに治療した群では、前記癌阻害率が、それぞれ45%、57%および50%であるのに対し、ポジティブコントロール群の前記癌阻害率は、40%であることが、前記実験結果により明らかになった。修飾された組み換えヒトエンドスタチンは、実際に生体内で抗癌活性を有し、また、生体内代謝率が低いため、前記修飾組み換えヒトエンドスタチンの活性は、前記未修飾組み換えヒトエンドスタチンの活性よりも高いことが、前記結果により示された。さらに、延長された間隔で投与された場合でさえ、それは、前記未修飾組み換えヒトエンドスタチンより高い有効性を依然維持できる。前記実験結果を、図13に示す。

40

【0070】

実施例8：組み換えヒトエンドスタチンのリジン残基側鎖における - アミノ基の20kDaのPEGによる修飾

本実施例で使用した組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号2および配列番号6の配

50

列を有する組み換えヒトエンドスタチンを含む。具体的には、前記組み換えヒトエンドスタチンは、30 mMリン酸緩衝液、pH 7.8で透析した。タンパク質濃度は、UV分光光度計により波長280 nmで測定し、そして2 mg/mlに調整した。リジン残基側鎖の - アミノ基を修飾する20 kDaのPEG (mPEG-SPA 20kDa、Nektar社)を加え、PEGとタンパク質とのモル比を8:1とした。前記組み換えヒトエンドスタチンは、迅速に修飾でき、30分間室温に置いた後、80%のエンドスタチンが修飾されていた。修飾された産物の量は、反応時間に応じて増加したが、反応速度は、1時間後に低下した。前記産物は、主にモノPEG化およびマルチPEG化されたエンドスタチンである。前記反応液は、カラムクロマトグラフィーにより直接的に精製できる。

【0071】

実施例9：20 kDaのPEGによりリジン残基側鎖の - アミノ基が修飾された組み換えヒトエンドスタチンの分子ふるい精製

本実施例で使用した組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号2および配列番号6の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンを含む。20 kDaのPEGで修飾されたエンドスタチンを分子ふるいで精製した。反応後、混合液のpH値を7.4に調整した。20 mMリン酸塩および100 mM塩化ナトリウムを含むpH 7.4の緩衝液であらかじめ平衡化したカラムに、前記サンプルを充填した。UV分光光度計を使用して280 nmでの吸光度にしたがって、異なる画分を回収できる。配列番号6の配列を有する修飾されたエンドスタチンの精製の結果を、図14に示す。

【0072】

実施例10：20 kDaのPEGによりリジン残基側鎖の - アミノ基が修飾された組み換えヒトエンドスタチンのイオン交換クロマトグラフィー精製

本実施例で使用した組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号2および配列番号6の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンを含む。20 kDaのPEGとエンドスタチンとの複合体をCMクロマトグラフィーカラムで精製した。反応後、混合液のpH値を6.5に調整した。10 mMリン酸塩を含むpH 6.5の緩衝液であらかじめ平衡化したカラムに、前記サンプルを充填した。前記サンプルの充填後、10 mMリン酸塩および1 M塩化ナトリウムを含むpH 6.5の緩衝液で勾配的溶出を行った。最小限の充填により、浸透および洗浄の間に、反応に関与しなかったPEGのピークが出現した。溶出のピークは、複数部位が修飾されたエンドスタチン、一部位が修飾されたエンドスタチン、および未修飾のエンドスタチンの順番で出現した。280 nmの吸光度にしたがって、異なる画分を回収できる。配列番号6の配列を有するエンドスタチンの修飾産物の精製結果を、図15に示す。

【0073】

実施例11：マウス癌モデルの治療における、20 kDaのPEGでN末端が修飾された組み換えヒトエンドスタチンの活性

本実施例で使用した組み換えヒトエンドスタチンは、配列番号6の配列を有する。実験では、20 kDaのPEG (mPEG-ButyrALD 20kDa、Nektar社)で修飾されたエンドスタチンを、間隔を増加させて投与し、マウスにおけるS180癌の成長に対する、生体内での阻害活性を観察した。昆明マウス(20 g)を本実験に使用した。前記マウスの腋窩に、マウスあたり 2×10^6 細胞のS180肉腫細胞(中国細胞バンクQK10952)を植え付けた。そして、翌日前記マウスをランダムに群に分け、群あたり8匹のマウスとした。前記群は、ネガティブコントロール群(通常の生理食塩水)、ポジティブコントロール群(エンドスタチン、1.5 mg/体重kg、5日ごとに投与)、4つの治療群(PEGで修飾したエンドスタチン、1.5 mg/体重kg、それぞれ5日ごと、7日ごと、10日ごとまたは14日ごとに投与)を含む。治療は、尾部静脈注射により行った。投与は、14日間続けた。15日目に前記マウスを殺し、癌の重量を測定し、次のように算出する癌阻害率により治療の有効性を評価した。

癌阻害率 = [(ネガティブコントロール群の癌重量 - 治療群の癌重量) / ネガティブコントロール群の癌重量] × 100%

10

20

30

40

50

配列番号6の配列を有し、N末端に付加的なアミノ酸のある組み換えヒトエンドスタチンは、5日ごと、7日ごと、10日ごとまたは14日ごとに治療した群では、前記癌阻害率が、それぞれ56.4%、37.1%および31.8%および0%であるのに対し、ポジティブコントロール群の前記癌阻害率は34%であることが、前記実験結果により明らかになった。これにより、修飾組み換えヒトエンドスタチンは、10日間もの間隔で投与した場合でさえ、生体内での癌成長阻害活性を依然発揮できることが示された。

【図面の簡単な説明】

【0074】

【図1】図1は、野生型ヒトエンドスタチンのアミノ酸配列を示す（配列番号1）。

【図2】図2は、*E. coli*のある菌株に発現させた野生型ヒトエンドスタチン（配列番号2）のアミノ酸配列を示す。N末端のメチオニン残基は、時には欠損してもよい。この場合、N末端のメチオニンを欠損したエンドスタチンの配列は、配列番号1の配列を有する。

10

【図3】図3は、エンドスタチンの生物学的活性断片のアミノ酸配列を示す（配列番号3）。

【図4】図4は、エンドスタチンの他の生物学的活性断片のアミノ酸配列を示す（配列番号4）。

【図5】図5は、エンドスタチンの他の生物学的活性断片のアミノ酸配列を示す（配列番号5）。

【図6】図6は、N末端に付加的なアミノ酸を有する生物学的に活性なエンドスタチンのアミノ酸配列を示す（配列番号6、図6A）。N末端のメチオニンは、時には発現後、部分的に欠損してもよい。この場合、N末端のメチオニンを欠損したエンドスタチンは、配列番号7（図6B）のアミノ酸配列を有する。

20

【図7】図7は、配列番号2の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンのN末端への20kDaのポリエチレングリコールの結合を示す。反応前および反応後の溶液をSDS-PAGE検出に供した。レーン1、20kDaのポリエチレングリコールで修飾されたエンドスタチン、レーン2、未修飾のエンドスタチン、レーン3、タンパク質マーカである。

【図8】図8は、配列番号6の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンのN末端への20kDaのポリエチレングリコールの結合を示す。修飾前および修飾後の溶液をSDS-PAGE検出に供した。レーン1、未修飾のエンドスタチン、レーン2、20kDaのポリエチレングリコールで修飾されたエンドスタチン、レーン3、タンパク質マーカである。

30

【図9】図9は、20kDaのポリエチレングリコールでN末端が修飾された配列番号2の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンの陽イオン交換カラムSP精製を示す。タンパク質を陽イオン交換カラムSPに結合させ、塩化ナトリウム勾配溶液で溶出し、最終的には還元条件下でのSDS-PAGE検出に供した。レーン1、精製前、レーン2、フロースルー、レーン3~10、回収した溶出画分。

【図10】図10は、配列番号6の配列を有し、20kDaのポリエチレングリコールでN末端が修飾された組み換えヒトエンドスタチンの陽イオン交換カラムSP精製を示す。タンパク質を陽イオン交換カラムSPに結合させ、塩化ナトリウム勾配溶液で溶出し、最終的には還元条件下でのSDS-PAGEでの検出に供した。レーン1、精製前、レーン2、フロースルー、レーン3~8、回収した溶出画分。

40

【図11】図11は、40kDaのポリエチレングリコールでN末端が修飾された配列番号2の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンの陽イオン交換カラムSP精製を示す。タンパク質を陽イオン交換カラムSPに結合させ、塩化ナトリウム勾配溶液で溶出し、最終的には還元条件下でのSDS-PAGEでの検出に供した。レーン1、精製前、レーン2、フロースルー、レーン3~10、回収した溶出画分。

【図12】図12は、20kDaのポリエチレングリコールがN末端に結合した組み換えヒトエンドスタチンの血管内皮細胞の移行阻害活性を示す。配列2：配列番号2のエンド

50

スタチン；PEG - 配列 2：20 kDa のポリエチレングリコールで修飾された配列番号 2 のエンドスタチン；配列 6：配列番号 6 のエンドスタチン；PEG - 配列 6：20 kDa のポリエチレングリコールで修飾された配列番号 6 のエンドスタチン。

【図 1 3】図 1 3 は、20 kDa のポリエチレングリコールが N 末端に結合した組み換えヒトエンドスタチンのマウス内の肉腫 S 1 8 0 阻害活性を示す。配列 2：配列番号 2 のエンドスタチンの連日投与；PEG - 配列 2 1：20 kDa のポリエチレングリコールで修飾された配列番号 2 のエンドスタチンの連日投与；PEG - 配列 2 2：20 kDa のポリエチレングリコールで修飾された配列番号 2 のエンドスタチンの 1 日おきの投与；PEG - 配列 2 3：20 kDa のポリエチレングリコールで修飾された配列番号 2 のエンドスタチンの 3 日ごとの投与；配列 6：配列番号 6 のエンドスタチンの連日投与；PEG - 配列 6 1：20 kDa のポリエチレングリコールで修飾された配列番号 6 のエンドスタチンの連日投与；PEG - 配列 6 2：20 kDa のポリエチレングリコールで修飾された配列番号 6 のエンドスタチンの 1 日おきの投与；PEG - 配列 6 3：20 kDa のポリエチレングリコールで修飾された配列番号 6 のエンドスタチンの 3 日ごとの投与。

10

【図 1 4】図 1 4 は、20 kDa のポリエチレングリコールでチロシン残基側鎖の - アミノ基が修飾された配列番号 6 の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンのゲルろ過精製を示す。レーン 1、充填したサンプル；レーン 2 ~ 1 0、回収した溶出画分。

【図 1 5】図 1 5 は、20 kDa のポリエチレングリコールでチロシン残基側鎖の - アミノ基が修飾された配列番号 6 の配列を有する組み換えヒトエンドスタチンの陽イオン交換カラム C M 精製を示す。レーン 1、充填したサンプル；レーン 2、フロースルー；レーン 3 ~ 8、回収した溶出画分。

20

【図 1】

HSHRDFQPVLHLVALNSPLSGGMRGIRGADFQCFQARAVGLAGTFRAFLLSSRLQDLY
SIVRRADRAAVPIVNLKDELLFPSWEALFSGSEGLKPGARIFSFQDGLVLRHPTWPQK
SVWHGSDPNRRRLTESYCETWRTEAPSATGQASSLLGGRLGQSAASCHHAYIVLCIE
NSFMTASK

図 1

【図 6 A】

MGGSHHHHHSHRDFQPVLHLVALNSPLSGGMRGIRGADFQCFQARAVGLAGTFRA
FLSSRLQDLYSIVRRADRAAVPIVNLKDELLFPSWEALFSGSEGLKPGARIFSFQDGLV
LRHPTWPQKSVWHGSDPNRRRLTESYCETWRTEAPSATGQASSLLGGRLGQSAASCH
HHAYIVLCIENSFMTASK

図 6A

【図 2】

MHSRDFQPVLHLVALNSPLSGGMRGIRGADFQCFQARAVGLAGTFRAFLLSSRLQDL
YSIVRRADRAAVPIVNLKDELLFPSWEALFSGSEGLKPGARIFSFQDGLVLRHPTWPQ
KSVWHGSDPNRRRLTESYCETWRTEAPSATGQASSLLGGRLGQSAASCHHAYIVLCI
ENSFMTASK

図 2

【図 6 B】

GGSHHHHHSHRDFQPVLHLVALNSPLSGGMRGIRGADFQCFQARAVGLAGTFRAF
LSSRLQDLYSIVRRADRAAVPIVNLKDELLFPSWEALFSGSEGLKPGARIFSFQDGLV
RHPTWPQKSVWHGSDPNRRRLTESYCETWRTEAPSATGQASSLLGGRLGQSAASCH
HAYIVLCIENSFMTASK

図 6B

【図 3】

FQPVLHLVALNSPLSGGMRGIRGADFQCFQARAVGLAGTFRAF

図 3

【図 4】

YCETWRTEAPSATGQASSLLGGRLGQSAASCHHAYIVLCIENSF

図 4

【図 5】

HSHRDFQPVLHLVALNSPLSGGMRGIR

図 5

【 図 7 】




图 7

【 図 8 】




图 8

【 図 9 】




图 9

【 図 1 1 】




图 11

【 図 1 0 】






图 10

【 図 1 2 】



【 図 1 3 】



【 図 1 5 】





图 15

【 図 1 4 】



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

图.14

【 手続補正書 】

【 提出日 】平成20年10月1日(2008.10.1)

【 手続補正 1 】

【 補正対象書類名 】特許請求の範囲

【 補正対象項目名 】全文

【 補正方法 】変更

【 補正の内容 】

【 特許請求の範囲 】

【 請求項 1 】

エンドスタチン 1 分子へのポリエチレングリコール 1 分子の結合により形成される複合体であって、

前記ポリエチレングリコール分子が、エンドスタチンの N 末端 - アミノ基、または、エンドスタチンの付加システイン残基のメルカプト基で、エンドスタチンに結合しており

前記ポリエチレングリコールの平均分子量が、1 kDa から 100 kDa である複合体

【 請求項 2 】

前記ポリエチレングリコール分子が、線状または分岐状である、請求項 1 記載の複合体

【 請求項 3 】

前記ポリエチレングリコールの平均分子量が、5 kDa から 40 kDa である、請求項 1 または 2 記載の複合体。

【 請求項 4 】

前記ポリエチレングリコールの平均分子量が、20 kDa または 40 kDa である、請求項 3 記載の複合体。

【請求項 5】

前記ポリエチレングリコールが、モノメトキシポリエチレングリコール、モノヒドロキシルポリエチレングリコール、または、それらの誘導体である、請求項 1 から 4 のいずれか一項記載の複合体。

【請求項 6】

前記モノメトキシポリエチレングリコール誘導体が、モノメトキシポリエチレングリコールブチラルド (mPEG-ButyrALD) またはモノメトキシポリエチレングリコールスクシンイミジルプロピオン酸 (mPEG-SPA) である、請求項 5 記載の複合体。

【請求項 7】

前記付加システイン残基が、エンドスタチン分子の N 末端、C 末端もしくは内部領域に結合したシステイン残基、または、エンドスタチン分子の N 末端、C 末端もしくは内部領域に結合したペプチド鎖のシステイン残基である、請求項 1 から 6 のいずれか一項記載の複合体。

【請求項 8】

前記エンドスタチンが、哺乳類由来である、請求項 1 から 7 のいずれか一項に記載の複合体。

【請求項 9】

前記エンドスタチンが、ヒト由来またはネズミ科由来である、請求項 8 記載の複合体。

【請求項 10】

前記エンドスタチンが、配列番号 1 または配列番号 2 に示す配列を有する、請求項 8 または 9 記載の複合体。

【請求項 11】

前記エンドスタチンが、エンドスタチンの活性断片、変異体、誘導体、異性体またはそれらの組合せである、請求項 8 または 9 記載の複合体。

【請求項 12】

前記エンドスタチン断片が、配列番号 3、配列番号 4 または配列番号 5 に示す配列を有する、請求項 11 記載の複合体。

【請求項 13】

前記エンドスタチン誘導体が、配列番号 1 の N 末端または C 末端に、長さ 1 ~ 15 アミノ酸残基のペプチドが付加することにより形成された誘導体である、請求項 11 記載の複合体。

【請求項 14】

前記エンドスタチン誘導体が、配列番号 6 または配列番号 7 に示す配列を有する、請求項 13 記載の複合体。

【請求項 15】

請求項 1 から 14 のいずれか一項記載の複合体と生体適合物質とにより形成される徐放性製剤であって、

前記徐放性製剤が、マイクロカプセル、ヒドロゲル、マイクロスフェア、微小浸透圧ポンプおよびリポソームからなる群から選択された少なくとも一つの形態である徐放性製剤。

【請求項 16】

請求項 1 から 14 のいずれか一項記載の複合体および請求項 15 記載の徐放性製剤の少なくとも一方と、薬学上許容できるキャリアーとを含む医薬組成物。

【請求項 17】

前記薬学上許容できるキャリアーが、リン酸、クエン酸または他の有機酸の緩衝液を含む水溶性 pH 緩衝液；アスコルビン酸または他の抗酸化剤；低分子量のポリペプチド（10 残基以下）；血清アルブミン、グルチン、免疫グロブリンまたは他のタンパク質；ポリビニルピロリドンまたは他の親水性ポリマー；グリシン、グルタミン、アスパラギン、アルギニン、リジンまたは他のアミノ酸；単糖、二糖、グルコース、マンノース、デキストリンまたは他の炭水化物；EDTA または他のキレート剤；マンニトール、ソルビトール

または他の糖アルコール；ナトリウムイオンまたは他の塩を形成する対イオン；Twee n（登録商標）、PEG、PLURONICS（登録商標）または他の非イオン性界面活性剤である、請求項 1 6 記載の医薬組成物。

【請求項 1 8】

癌を予防または治療するための医薬品であって、

請求項 1 から 1 4 のいずれか一項記載の複合体、請求項 1 5 記載の徐放性製剤、および、請求項 1 6 または 1 7 記載の医薬組成物からなる群から選択された少なくとも一つを含む医薬品。

【請求項 1 9】

前記癌が、肺癌、神経内分泌腫瘍、大腸癌、骨肉腫、肝癌、胃癌、膵臓癌、口腔癌、乳癌、前立腺癌、リンパ腫、食道癌、鼻咽腔癌、子宮頸癌、肉腫、腎臓癌、胆道癌、悪性黒色腫および他の癌からなる群から選択された少なくとも一つである、請求項 1 8 記載の医薬品。

【請求項 2 0】

異常な血管新生により生じる組織または器官の障害によって特徴づけられる疾患を予防または治療するための医薬品であって、

請求項 1 から 1 4 のいずれか一項記載の複合体、請求項 1 5 記載の徐放性製剤、および、請求項 1 6 または 1 7 記載の医薬組成物からなる群から選択された少なくとも一つを含む医薬品。

【請求項 2 1】

投与経路が、静脈内注射、静脈内注入、皮下注射、筋内注射、腹腔内注射、皮下への埋め込み、経皮吸収、肝動脈注射、経口投与、経鼻投与、口腔粘膜投与、眼内投与、直腸投与および腔内投与からなる群から選択された少なくとも一つである、請求項 1 8 から 2 0 のいずれか一項に記載の医薬品。

【請求項 2 2】

癌を予防または治療するための医薬品の製造方法であって、

請求項 1 から 1 4 のいずれか一項記載の複合体、請求項 1 5 記載の徐放性製剤、および、請求項 1 6 または 1 7 記載の医薬組成物からなる群から選択された少なくとも一つを使用する医薬品の製造方法。

【請求項 2 3】

異常な血管新生により生じる組織または器官の障害によって特徴づけられる疾患を予防または治療するための医薬品の製造方法であって、

請求項 1 から 1 4 のいずれか一項記載の複合体、請求項 1 5 記載の徐放性製剤、および、請求項 1 6 または 1 7 記載の医薬組成物からなる群から選択された少なくとも一つを使用する医薬品の製造方法。

【請求項 2 4】

エンドスタチンの生体内半減期および抗癌効果を延長する方法であって、

ポリエチレングリコール 1 分子をエンドスタチン 1 分子に結合させることにより、複合体を形成する工程であって、前記エンドスタチンにおける結合部位が、エンドスタチンの N 末端 - アミノ基またはエンドスタチンの付加システイン残基のメルカプト基である前記工程、

または、請求項 1 5 記載の徐放性製剤を形成する工程を含む生体内半減期および抗癌効果を延長する方法。

【 國際調查報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/CN2007/000204
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
See extra sheet		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)		
IPC: A61K; C07K; A61P		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
WPI; EPODOC; PAJ; CNPAT; CNKI; EMBASE; MEDLINE; NCBI		
Endostatin, polyethylene glycol, PEG, polyvinyl alcohol, PVA, polypropylene glycol, PPG, mPEG		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	CN1708513A (NOVS) 14.12 月 2005 (14.12.2005), see page 8.	1-4,6-7,9,15 5,8,10-14,16
Y	WO9015628 (CETU) 27 Dec. 1990 (27.12.1990), see claims 1-6, page 3.	5
Y	MU, Jingyu et al "Modification of HCG with Activated mPEG5000 and Study on Its Activity." Chinese Journal of Biologicals, 1995, Vol. 8, No. 2, pages 53-55.	8
Y	CN1518595A (PHOE-N) 04 Aug. 2004 (04.08.2004), see claim 1, pages 7-8.	10-14,16
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
<p>* Special categories of cited documents:</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>		
Date of the actual completion of the international search 30 Apr. 2007 (30.04.2007)		Date of mailing of the international search report 24 May 2007 (24.05.2007)
Name and mailing address of the ISA/CN The State Intellectual Property Office, the P.R.China 6 Xitucheng Rd., Jimen Bridge, Haidian District, Beijing, China 100088 Facsimile No. 86-10-62019451		Authorized officer LU, Chun Telephone No. (86-10)62085058

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2007/000204

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61K 38/17 (2006.01) i
C07K 14/435 (2006.01) i
A61P 35/00 (2006.01) i

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2007/000204

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.: 43-46
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

 methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy, as well as diagnostic methods.
2. Claims Nos.: 48
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

 The term "other diseases" used in claim 48 is vague and unclear, thereby rendering the definition of the subject-matter of said claim unclear, Article 6 PCT.
3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

See extra sheet

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
 2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fees, this Authority did not invite payment of any additional fee.
 3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
 4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1-3 (in part), 4-16
- Remark on protest**
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
 - The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
 - No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2007/000204

Continuation of : Box No. III

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

CN1708513A (NOVS) 14.12 月 2005 (14.12.2005).

The described document discloses a compound comprising endostatin covalently coupled with PEG. The PEG may be branched or linear. One or more PEG chains are coupled to endostatin (see page 8 paragraph 4). From above, each and every element of claims 1-4,6-7,9,15 is explicitly disclosed by the document, and the subject-matters of claims 1-4,6-7,9,15 are not novel in the sense of Article 33(2) PCT.

Because claims 1-4,6-7,9,15 are not novel, there is no technical correlation among claims 26, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 49 and 50 which do not involve any same or corresponding special technical features. Thereby, the requirement of unity of invention referred to in Rule 13.1 shall not be fulfilled.

Because claims 1-3 are not novel, there is no technical correlation among claims 4, 17, 20, 24 and 25 which do not involve any same or corresponding special technical features. Thereby, the requirement of unity of invention referred to in Rule 13.1 shall not be fulfilled.

Therefore, multiple inventions in this international application are found, as follows:

Group I: claims 1-3 (in part), 4-16;

Group II: claims 1-3 (in part), 17-19;

Group III: claims 1-3 (in part), 20-23;

Group IV: claims 1-3 (in part), 24;

Group V: claims 1-3 (in part), 25;

Group VI: claims 26-34;

Group VII: claims 35-36;

Group VIII: claim 37;

Group IX: claims 38;

Group X: claim 39;

Group XI: claim 41;

Group XII: claim 42;

Group XIII: claim 47;

Group XIV: claim 49;

Group XV: claim 50.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2007/000204

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN1708513A	2005-12-14	WO2004020469A2	2004-03-11
		AU2003258675A1	2004-03-19
		EP1534751A2	2005-06-01
		JP2006516112T	2006-06-22
		NZ538958A	2006-09-29
WO9015628A1	1990-12-27	CA2018833A	1990-12-14
		AU5858690A	1991-01-08
CN1518595A	2004-08-04	WO0244360A2	2002-06-06
		AU8913201A	2002-06-11
		EP1337630A2	2003-08-27
		US6737259B1	2004-05-18
		KR20040004449A	2004-01-13
		JP2004515232T	2004-05-27

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2007/000204

A. 主题的分类		
见附加页		
按照国际专利分类表(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类		
B. 检索领域		
检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)		
IPC: A61K; C07K; A61P		
包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献		
在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))		
WPI; EPODOC; PAJ; CNPAT; CNKI; EMBASE; MEDLINE; NCBI		
内皮抑制素, 内皮抑制因子, 内皮抑素, 聚乙二醇, 聚乙烯醇, 聚丙二醇, 甲基聚乙二醇, Endostatin, polyethylene glycol, PEG, polyvinyl alcohol, PVA, polypropylene glycol, PPG, mPEG		
C. 相关文件		
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
X Y	CN1708513A (诺瓦提斯公司) 14.12 月 2005 (14.12.2005), 见说明书第 8 页。	1-4,6-7,9,15 5,8,10-14,16
Y	WO9015628A1 (CETUS 公司) 27.12 月 1990 (27.12.1990), 见权利要求 1-6, 说明书第 3 页。	5
Y	母敬郁等“应用活化 mPEG5000 修饰 HCG 及其活性研究”, 中国生物制品学杂志, 1995, 第 8 卷第 2 期, 53-55 页。	8
Y	CN1518595A (凤凰药理学公司) 04.8 月 2004 (04.08.2004), 见权利要求 1, 说明书第 7-8 页。	10-14,16
<input type="checkbox"/> 其余文件在 C 栏的续页中列出。 <input checked="" type="checkbox"/> 见同族专利附件。		
* 引用文件的具体类型:		
“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件		“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件
“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利		“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性
“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件		“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性
“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件		“&” 同族专利的文件
“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件		
国际检索实际完成的日期 30.4 月 2007 (30.04.2007)		国际检索报告邮寄日期 24.5 月 2007 (24.05.2007)
中华人民共和国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088 传真号: (86-10)62019451		受权官员 陆纯 电话号码: (86-10) 62085058

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2007/000204

主题的分类

A61K 38/17 (2006.01) i

C07K 14/435 (2006.01) i

A61P 35/00 (2006.01) i

国际检索报告

国际申请号 PCT/CN2007/000204

第II栏 关于某些权利要求不能作为检索主题的意见(接第1页第2项)

按条约 17(2)(a)对某些权利要求未作国际检索报告的理由如下:

1. 权利要求: 43-46

因为它们涉及到不要求本国际检索单位进行检索的主题, 即:

治疗人体或者动物体的外科手术或者疗法以及诊断方法

2. 权利要求: 48

因为它们涉及到国际申请中不符合规定的要求的部分, 以致不能进行任何有意义的国际检索,

具体地说:

权利要求 48 中使用的术语“其他疾病”是含糊和不确切的, 所以不符合 PCT 条约第 6 条的规定。

3. 权利要求:

因为它们是从属权利要求, 并且没有按照细则 6.4(a)第 2 句和第 3 句的要求撰写。

第III栏 关于缺乏发明单一性时的意见(接第1页第3项)

本国际检索单位在该国际申请中发现多项发明, 即:

见附加页

1. 由于申请人按时缴纳了被要求缴纳的全部附加检索费, 本国际检索报告针对全部可作检索的权利要求。

2. 由于无需付出有理由要求附加费的劳动即能对全部可检索的权利要求进行检索, 本国际检索单位未通知缴纳任何附加费。

3. 由于申请人仅按时缴纳了部分被要求缴纳的附加检索费, 本国际检索报告仅涉及已缴费的那些权利要求。具体地说, 是权利要求:

4. 申请人未按时缴纳被要求的附加检索费。因此, 本国际检索报告仅涉及权利要求中首次提及的发明: 包含该发明的权利要求是: 1-3 (部分), 4-16

关于异议的说明: 申请人缴纳了附加检索费, 同时提交了异议书, 缴纳了异议费。

申请人缴纳了附加检索费, 同时提交了异议书, 但未缴纳异议费。

缴纳附加检索费时未提交异议书。

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2007/000204

续栏：第III栏

本国际检索单位在该国际申请中发现多项发明，即：

对比文件：CN1708513A（诺瓦提斯公司）14.12月2005（14.12.2005）。

上述对比文件中披露了聚乙二醇（PEG）与血管内皮抑制素形成的复合物，聚乙二醇与血管内皮抑制素共价连接，该聚乙二醇可以是线性或支链，一个或多个PEG链与血管内皮抑制素结合（见说明书第8页第4段）。可见，该对比文件披露了与权利要求1-4、6-7、9、15相同的技术方案，因而权利要求1-4、6-7、9、15不具备专利合作条约A33(2)规定的新颖性。

由于权利要求1-4、6-7、9、15不具备新颖性，独立权利要求26、35、37、38、39、41、42、47、49、50所构成的10项发明之间不存在技术关联，不含有任何相同或相应的特定技术特征，因此不满足本细则13.1所述的发明单一性的要求。

由于权利要求1-3不具备新颖性，其从属权利要求4、17、20、24、25所构成的5项发明之间不存在技术关联，不含有任何相同或相应的特定技术特征，因此不满足本细则13.1所述的发明单一性的要求。

因此，在该国际申请中发现以下多项发明：

第I组：权利要求1-3（部分），4-16；

第II组：权利要求1-3（部分），17-19；

第III组：权利要求1-3（部分），20-23；

第IV组：权利要求1-3（部分），24；

第V组：权利要求1-3（部分），25；

第VI组：权利要求26-34；

第VII组：权利要求35-36；

第VIII组：权利要求37；

第IX组：权利要求38；

第X组：权利要求39；

第XI组：权利要求41；

第XII组：权利要求42；

第XIII组：权利要求47；

第XIV组：权利要求49；

第XV组：权利要求50。

国际检索报告 关于同族专利的信息		国际申请号 PCT/CN2007/000204	
检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利	公布日期
CN1708513A	2005-12-14	WO2004020469A2	2004-03-11
		AU2003258675A1	2004-03-19
		EP1534751A2	2005-06-01
		JP2006516112T	2006-06-22
		NZ538958A	2006-09-29
WO9015628A1	1990-12-27	CA2018833A	1990-12-14
		AU5858690A	1991-01-08
CN1518595A	2004-08-04	WO0244360A2	2002-06-06
		AU8913201A	2002-06-11
		EP1337630A2	2003-08-27
		US6737259B1	2004-05-18
		KR20040004449A	2004-01-13
		JP2004515232T	2004-05-27

フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I	テーマコード(参考)
A 6 1 K	9/06 (2006.01)	A 6 1 K	9/06
A 6 1 K	47/02 (2006.01)	A 6 1 K	47/02
A 6 1 K	47/12 (2006.01)	A 6 1 K	47/12
A 6 1 K	47/22 (2006.01)	A 6 1 K	47/22
A 6 1 K	47/42 (2006.01)	A 6 1 K	47/42
A 6 1 K	47/32 (2006.01)	A 6 1 K	47/32
A 6 1 K	47/18 (2006.01)	A 6 1 K	47/18
A 6 1 K	47/26 (2006.01)	A 6 1 K	47/26
A 6 1 K	47/10 (2006.01)	A 6 1 K	47/10
A 6 1 K	47/34 (2006.01)	A 6 1 K	47/34
A 6 1 P	35/00 (2006.01)	A 6 1 P	35/00
A 6 1 P	9/00 (2006.01)	A 6 1 P	9/00
C 0 7 K	14/78 (2006.01)	C 0 7 K	14/78
C 1 2 N	15/09 (2006.01)	C 1 2 N	15/00 A
C 0 7 K	1/13 (2006.01)	C 0 7 K	1/13

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(74)代理人 100154081

弁理士 伊佐治 創

(72)発明者 羅 永章

中華人民共和国北京市 海 淀区清 華園

(72)発明者 韓 慶

中華人民共和国北京市 海 淀区清 華園

(72)発明者 雷 清新

中華人民共和国北京市 海 淀区上地 開 拓路5号中 関 村生物医 薬園 B - 4 2 1

(72)発明者 常 国 棟

中華人民共和国北京市 海 淀区上地 開 拓路5号中 関 村生物医 薬園 B - 4 2 1

(72)発明者 付 彦

中華人民共和国北京市 海 淀区清 華園

Fターム(参考) 4B024 AA01 BA80 CA04 DA05 EA04 FA02 GA11 HA03
 4C076 AA09 AA19 AA30 AA61 AA95 BB01 BB13 BB15 BB16 BB21
 BB22 BB24 BB25 BB29 BB30 BB31 BB32 CC11 CC27 CC41
 DD09 DD22Z DD38 DD41Z DD43Z DD49 DD51 DD59S DD67 EE16
 EE23 EE38 EE41 EE49 EE59
 4C084 AA02 AA03 AA07 BA01 BA20 BA21 BA22 BA23 BA37 BA42
 CA53 CA59 DA40 MA05 MA24 MA28 MA38 MA43 MA52 MA55
 MA56 MA57 MA58 MA59 MA60 MA63 MA65 MA66 MA67 NA13
 ZA362 ZB262
 4H045 AA20 AA30 BA10 BA40 BA56 CA40 EA28 FA50 FA74