

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-349660

(P2006-349660A)

(43) 公開日 平成18年12月28日(2006.12.28)

| (51) Int. Cl. | F I | テーマコード (参考) |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| GO 1 N 33/92 (2006.01) | GO 1 N 33/92 A | 2GO45 |
| GO 1 N 33/48 (2006.01) | GO 1 N 33/48 P | |
| GO 1 N 33/483 (2006.01) | GO 1 N 33/483 C | |

審査請求 有 請求項の数 5 O L (全 7 頁)

| | | | |
|--------------|------------------------------|----------|--|
| (21) 出願番号 | 特願2006-62470 (P2006-62470) | (71) 出願人 | 504145364 国立大学法人群馬大学 群馬県前橋市荒牧町四丁目2番地 |
| (22) 出願日 | 平成18年3月8日(2006.3.8) | (74) 代理人 | 100100549 弁理士 川口 嘉之 |
| (31) 優先権主張番号 | 特願2005-148119 (P2005-148119) | (74) 代理人 | 100090516 弁理士 松倉 秀実 |
| (32) 優先日 | 平成17年5月20日(2005.5.20) | (74) 代理人 | 100089244 弁理士 遠山 勉 |
| (33) 優先権主張国 | 日本国(JP) | (74) 代理人 | 100126505 弁理士 佐貫 伸一 |
| | | (72) 発明者 | 竹内 利行 群馬県前橋市上小出町一丁目23-9-5 03 |

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 コレステロール含有膜のコレステロール含量の測定方法

(57) 【要約】

【課題】 新規な生体膜コレステロール含量の測定方法を提供する。

【解決手段】 アクリジンオレンジ又はDAMPの膜透過性を利用して生体膜のコレステロール含量を測定する。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

アクリジンオレンジ及び / 又は D A M P (N-(3-((2,4-dinitrophenyl)amino)propyl)-N-(3-aminopropyl)-methylamine) を用いることを特徴とする、コレステロール含有膜のコレステロール含量の測定方法。

【請求項 2】

コレステロール含有膜が細胞内小器官の膜である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

さらに、プロトンポンプ阻害剤をネガティブコントロールとして用いる、請求項 1 または 2 に記載の測定方法。

10

【請求項 4】

アクリジンオレンジ及び / 又は D A M P を含むコレステロール含有膜のコレステロール含量の測定用キット。

【請求項 5】

さらに、プロトンポンプ阻害剤を含む、請求項 4 に記載のキット。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、コレステロール含有膜のコレステロール含量の測定方法に関する。本発明はまた、コレステロール含有膜のコレステロール含量を測定するためのキットに関する。

20

【背景技術】**【0002】**

コレステロールは主に肝臓からリポ蛋白質LDLが血流を通過して末梢組織の細胞に運ぶ。末梢組織からはHDLによって過剰なコレステロールが肝臓に運ばれる。さらにコレステロールは末梢組織の細胞でも合成され、スタチンはこの合成経路の律速酵素HMG-CoA reductaseを阻害する。細胞内症器官膜のコレステロール分布が異なるのは、単にその生体膜の強度や流動性の違いを生ずるためだけではなく、特定のコレステロール組成膜に特異的に蛋白が集積し、小器官の機能発現を制御するためでもある。しかし、末梢の細胞内でコレステロールがどのように分布しているのかはよくわかっていない。言い換えれば、細胞内コレステロール分布を測定する簡便な方法が必要である。

30

アクリジンオレンジやDAMPは、内分泌顆粒、リソゾームなどの細胞内小器官内に酸性pH依存的に取り込まれ、発色するので、その強度から細胞内小器官内のpH測定に用いられていた。しかしながら、この場合、小器官生体膜のコレステロール組成は問題視されていなかった。

【発明の開示】**【発明が解決しようとする課題】****【0003】**

本発明は、コレステロール含有膜のコレステロール含量の測定方法を提供することを課題とする。本発明はまた、コレステロール含有膜のコレステロール含量の測定キットを提供することを課題とする。

40

【課題を解決するための手段】**【0004】**

本発明者は上記課題を解決すべく鋭意検討を行った。その結果、細胞内小器官内のpHに加えてその生体膜のコレステロール組成によってpH測定プローブの取込が左右されることを発見した。すなわち、アクリジンオレンジ及び / 又は D A M P が、コレステロール含有膜のコレステロール含量に応じてコレステロール含有膜を透過するという性質を有すること、それにより、アクリジンオレンジ及び / 又は D A M P をコレステロール含有膜のコレステロール含量の測定に用いることができることを見出して本発明を完成するに至った。

【0005】

すなわち、本発明は以下の通りである。

50

(1) アクリジンオレンジ及び/又はDAMP (N-(3-((2,4-dinitrophenyl)amino)propyl)-N-(3-aminopropyl)-methylamine) を用いることを特徴とする、コレステロール含有膜のコレステロール含量の測定方法。

(2) コレステロール含有膜が細胞内小器官の膜である、(1)の方法。

(3) さらに、プロトンポンプ阻害剤をネガティブコントロールとして用いる、(1)または(2)の測定方法。

(4) アクリジンオレンジ及び/又はDAMPを含むコレステロール含有膜のコレステロール含量の測定用キット。

(5) さらに、プロトンポンプ阻害剤を含む、(4)のキット。

【発明の効果】

10

【0006】

本発明によれば、細胞内小器官の生体膜などのコレステロール含有膜のコレステロール含量を簡便に測定することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0007】

以下に本発明を詳しく説明する。


本発明の方法は、アクリジンオレンジ及び/又はDAMPを用いることを特徴とする、コレステロール含有膜のコレステロール含量の測定方法である。

【0008】

アクリジンオレンジは式(1)の構造を有する化合物である。アクリジンオレンジは化学合成してもよいし、市販のものを用いてもよい。本発明の方法では、細胞培養液などに、アクリジンオレンジを、通常の細胞染色に用いられる濃度、例えば、1~50 µg/mlの濃度になるように添加することにより、細胞内小器官の膜コレステロール含量を測定することができる。なお、アクリジンオレンジは蛍光強度などに基づいてその量を測定することができる。

20

【化1】




30

【0009】

DAMPは、N-(3-((2,4-dinitrophenyl)amino)propyl)-N-(3-aminopropyl)-methylamineの略語であり、式(II)の構造を有する化合物である。DAMPは化学合成してもよいし、市販のものを用いてもよい。本発明の方法では、細胞培養液などに、DAMPを、通常の細胞染色に用いられる濃度、例えば、10~100 µMの濃度になるように添加することにより、細胞内小器官の膜コレステロール含量を測定することができる。なお、DAMPは抗DAMP抗体などを用いてその量を測定することができる。

40

【化2】



【0010】

50

本発明の方法では、アクリジンオレンジ又はDAMPがコレステロール含量に応じて膜を透過するという性質を利用する。すなわち、アクリジンオレンジ又はDAMPの膜透過性を指標にして、膜のコレステロール含量を測定する。

アクリジンオレンジはコレステロール含量が約20~30 mol%の細胞膜を、DAMPは約60~70 mol%の細胞膜を選択的に通過する。したがって、例えば、アクリジンオレンジが透過し膜内部がアクリジンオレンジによって染色された場合は、その膜のコレステロール含量は約20~30 mol%であると判定することができる。なお、アクリジンオレンジは一般的に酸性条件下で蛍光を発するため、アクリジンオレンジによるコレステロール含量の測定対象は、好ましくは内部が酸性の細胞内小器官やリポソームなどの小胞である。ただし、蛍光以外の検出法を用いることもできるため、酸性条件に限定はされない。

10

また、DAMPが透過し膜内部がDAMPに染色された場合は、その膜のコレステロール含量は約60~70 mol%であると判定することができる。

本発明の方法によれば、ミトコンドリア、核、分泌顆粒、神経様小胞、リソゾームなどの細胞内小器官の膜に含まれるコレステロール含量を測定できる。また、人工リポソームの膜のコレステロール含量を測定又はモニターすることもできる。

細胞内コレステロール組成は粗面小胞体からゴルジ装置を経て細胞膜に向かって増加し、細胞膜では20~30 mol%の組成を示す。このコレステロール組成が低下すると内分泌顆粒の形成が減少し、その結果ホルモン分泌低下が起こる。したがって、本発明の方法によって細胞内小器官膜のコレステロール含量を測定することにより、ホルモン分泌低下などを検出することもできる。

20

また、アクリジンオレンジ又はDAMPを用いて膜のコレステロール含量を測定する場合、これらはプロトンポンプ阻害剤が存在すると膜に取り込まれなくなるため、プロトンポンプ阻害剤をネガティブコントロールとして使用することができる。プロトンポンプ阻害剤としては、例えば、パフィロマイシンA1などの液胞型H⁺-ATPase阻害剤などが挙げられる。

【0011】

本発明は、また、アクリジンオレンジ及び/又はDAMPを含むコレステロール含有膜のコレステロール含量測定キットを提供する。該キットは、それがアクリジンオレンジ及び/又はDAMPが膜のコレステロール含量を測定するためのものである旨、及びその測定方法に関するプロトコルを記載した使用説明書を含むキットであることが好ましい。また、本発明のキットは抗DAMP抗体などの構成成分を含むものであってもよい。なお、本発明のキットには上記のプロトンポンプ阻害剤が含まれてもよい。

30

【実施例】

【0012】

以下に実施例を示し、本発明をさらに具体的に説明する。もっとも、本発明は下記実施例に限定されるものではない。

【0013】

1. pH測定プローブを用いた細胞内コレステロール分布の測定法
分泌顆粒膜の脂質組成をもつリポソームの作り方

クロロホルムに溶けている各種リン脂質とコレステロールを、モル比でホスファチジルコリン：ホスファチジルエタノールアミン：ホスファチジルセリン：ホスファチジルイノシトール：スフィンゴミエリン：コレステロール=6.2：17.7：3.6：1.0：7.5：64になるように混和し、窒素ガスで乾燥後、緩衝液50 mM HEPES (pH 7.4), 0.1 M NaCl, もしくは50 mM MES (pH 5.5), 0.1 M NaClを加えた(コレステロールを473 µg加えた時トータル2 mlの上記緩衝液で混和する)。これを超音波処理した後、10000 x gで遠心し、上清を分泌顆粒膜組成をもつリポソームとして用いた。コレステロール組成の異なるリポソームを作成する場合、コレステロール量を変え、そのモル比に応じて他の脂質のモル比を増減させて、作製した。

40

【0014】

2. アクリジンオレンジによるリポソームの染色

50

上記で作製した各コレステロール含量のリポソーム10 μ lと、10 μ lの50 mM HEPES (pH 7.4), 0.1 M NaClもしくは50 mM MES (pH5.5), 0.1 M NaClに溶かした10 μ g/mlのアクリジンオレンジを混和し、蛍光顕微鏡で観察した。結果を図1に示した。それによると、リポソーム内部がpH5.5のときにアクリジンオレンジによる蛍光が観察され、アクリジンオレンジの蛍光強度はリポソーム膜のコレステロール含量が20~30mol%のときに最も強かった。

分泌顆粒は約45 mol%のコレステロール含量を示す。これに対し、この分泌顆粒をコレステロール除去剤であるmethyl- β -cyclodextrin (M β CD)で処理し、コレステロール含量を22 mol%に減らすと、アクリジンオレンジの取り込みが、約22 mol%のコレステロール含量を示す神経小胞と同様の取り込み量を示す(図4)。このことから、アクリジンオレンジが、膜のコレステロール含量依存的に取り込まれ、膜内部が染色されることがわかった。

10

【0015】

3. DAMPのリポソームへの取り込み

上記で作製した各コレステロール含量のリポソーム150 μ lと、150 μ lの50 mM HEPES (pH 7.4), 0.1 M NaClに溶かした120 μ MのDAMPを混和し、37°C 60分間暗所でインキュベーションした。その後300 μ lのoptiprep (GIBCO社)と混ぜて遠心チューブに入れ、更に上層50 mM HEPES (pH 7.4), 0.1 M NaClで希釈した30%のoptiprepをのせた。これを500,000 x g、4分間で1時間遠心し、上層100 μ lを回収した。このうち5 μ lをPVDF (polyvinylidene difluoride)膜に滴下し、膜上のDAMPを抗DAMP抗体と結合させた後、結合した抗体量をECL法(Enhanced Chemi-Luminescence method)で検出した。結果を図2に示した。それによると、膜透過したDAMPの量はリポソーム膜のコレステロール含量が65%のときに最も高かった。

20

【0016】

4. 生細胞を用いたアクリジンオレンジによる染色

MIN6細胞(マウス膵細胞由来)を2日間培養後、5 μ g/mlのアクリジンオレンジをグルコース濃度が2.2mMまたは22mMの培養液に混ぜ、10分間培養した。細胞をカルシウム、マグネシウムを含まないHBSS buffer (5mM KCl, 0.4 mM KH₂PO₄, 137 mM NaCl, 4 mM NaHCO₃, 0.3 mM Na₂HPO₄, pH 7.4)で三回洗い、顕微鏡で観察した。結果を図3に示した。それによると、細胞のグルコース濃度が2.2mMと低いときに、アクリジンオレンジによる染色が顕著であった。なお、この染色パターンはGABA(γ -アミノ酪酸)の染色パターンと類似しており、アクリジンオレンジによりGABAを含むシナプス様小胞が染色されていることが考えられた。

30

また、5 μ g/mlのアクリジンオレンジと同時に1 μ MのパフィロマイシンA1を添加したときはアクリジンオレンジによる染色は見られなかった。このことから、パフィロマイシンA1がネガティブコントロールとして使用できることがわかった。

【0017】

5. 生細胞を用いたDAMPによる染色

MIN6細胞を2日間培養後、60 μ M DAMPをグルコース濃度が2.2mMまたは22mMの培養液に混ぜ、更に1時間培養した。細胞を4% paraformaldehydeで固定した後、抗DAMP抗体でDAMPが取り込まれたオルガネラを染色、蛍光顕微鏡で観察した。結果を図3に示した。これにより、DAMPによりインスリンなどのホルモンを含む分泌顆粒が染色されていることが考えられた。

40

【図面の簡単な説明】

【0018】


【図1】各コレステロール濃度の膜に対するアクリジンオレンジの透過性を示す図。

【図2】各コレステロール濃度の膜に対するDAMPの透過性を示す図。


【図3】アクリジンオレンジ又はDAMPによるMIN6細胞の染色結果を示す図(写真)。

【図4】コレステロール除去剤添加時、非添加時におけるDAMPの膜透過性を示す図。


【 図 1 】




【 図 2 】



【 図 3 】



【 図 4 】



フロントページの続き

(72)発明者 穂坂 正博

群馬県前橋市平和町 1 - 1 0 - 1 向町住宅 1 - 3 0 2

Fターム(参考) 2G045 AA24 BB25 CB01 DA69 FA16 GB01