

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02009/113303

発行日 平成23年7月21日 (2011. 7. 21)

(43) 国際公開日 平成21年9月17日 (2009. 9. 17)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C12Q 1/68 (2006.01)	C12Q 1/68 ZNAA	2G045
GO1N 33/58 (2006.01)	GO1N 33/58 A	2G054
GO1N 21/78 (2006.01)	GO1N 21/78 C	4B024
C12N 15/09 (2006.01)	C12N 15/00 A	4B063
GO1N 33/53 (2006.01)	GO1N 33/53 M	4C057
審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 48 頁) 最終頁に続く		


出願番号 特願2010-502724 (P2010-502724)	(71) 出願人 304024430 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 石川県能美市旭台一丁目1番地
(21) 国際出願番号 PCT/JP2009/001090	
(22) 国際出願日 平成21年3月11日 (2009. 3. 11)	
(31) 優先権主張番号 特願2008-63290 (P2008-63290)	(71) 出願人 503360115 独立行政法人科学技術振興機構 埼玉県川口市本町四丁目1番8号
(32) 優先日 平成20年3月12日 (2008. 3. 12)	
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)	(74) 代理人 110000523 アクシス国際特許業務法人
	(74) 代理人 100102668 弁理士 佐伯 憲生
	(74) 代理人 100127133 弁理士 小板橋 浩之
	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光応答性プローブを用いたメチルシトシンの検出法

(57) 【要約】

本発明はDNA中のメチルシトシンを、迅速、簡便に、高感度で検出する方法を提供する。

本発明は塩基部分として式I、式II、式III、又は式IVで表される基を有する核酸類からなるメチルシトシン光連結剤（光応答性プローブ）を用いたメチルシトシンの検出方法に関する。




【特許請求の範囲】

【請求項 1】

塩基部分として、次の式 I、式 II、式 III、又は式 IV：

【化 2 1】




10

(ただし、式 I 中、Xは、O、SまたはNHを示し、

R1及びR3は、それぞれ独立に、水素、C 1 ~ C 6 のアルキル基、C 1 ~ C 6 のアルコキシ基、シアノ基、又はC 1 ~ C 6 のアシル基を示し、

R2は、C 1 ~ C 12 の炭素数を有する疎水性基を示す。)

【化 2 2】




20

(ただし、式 II 中、R4及びR6は、それぞれ独立に、水素、C 1 ~ C 6 のアルキル基、C 1 ~ C 6 のアルコキシ基、シアノ基、又はC 1 ~ C 6 のアシル基を示し、

R5は、C 1 ~ C 12 の炭素数を有する疎水性基を示す。)

30

【化 2 3】



40


(ただし、式 III 中、Yは、O、SまたはNHを示し、

Zは、YがOまたはSであるときNH₂を示し、YがNHであるときは水素原子を示し、

R7及びR9は、それぞれ独立に、水素、C 1 ~ C 6 のアルキル基、C 1 ~ C 6 のアルコキシ基、シアノ基、又はC 1 ~ C 6 のアシル基を示し、

R8は、C 1 ~ C 12 の炭素数を有する疎水性基を示す。)

【化 2 4】



(IV)

10

(ただし、式 I V 中、R10及びR12は、それぞれ独立に、水素、C 1 ~ C 6 のアルキル基、C 1 ~ C 6 のアルコキシ基、シアノ基、又はC 1 ~ C 6 のアシル基を示し、R11は、C 1 ~ C 1 2 の炭素数を有する疎水性基を示す。)

で表される基を有する核酸類(ただし、核酸類には、核酸、モノヌクレオチド及びペプチド核酸が含まれる)。

【請求項 2】

R 2 , R 5 , R 8 及び R 1 1 が、C 1 ~ C 1 2 の炭素数を有する炭化水素基である、請求項 1 に記載の核酸類(ただし、核酸類には、核酸、モノヌクレオチド及びペプチド核酸が含まれる)。

20

【請求項 3】

請求項 1 ~ 2 の何れかに記載の核酸類からなる、メチルシトシン光連結剤。

【請求項 4】

請求項 1 ~ 2 の何れかに記載の核酸類からなる、光応答性メチルシトシン検出剤。

【請求項 5】

請求項 1 ~ 2 の何れかに記載の核酸類を使用して、メチルシトシンを光連結する方法。

【請求項 6】

請求項 1 ~ 2 の何れかに記載の核酸類を使用して、メチルシトシンを検出する方法。

【請求項 7】

請求項 1 又は請求項 2 に記載の式 I、式 I I、式 I I I、又は式 I V で表される基を塩基部分として末端に有する核酸又はペプチド核酸であって、担体に固定化された核酸又はペプチド核酸、及び、

30

メチルシトシンを有する被験核酸を、

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸と、ハイブリダイズする工程、

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸とハイブリダイズすることによって、近接して配置された被験核酸と、固定化された核酸又はペプチド核酸とに対して、光照射を行って、被験核酸を、固定化された核酸又はペプチド核酸に光連結する工程、

ハイブリダイズしていた鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸を、解離して除去する工程、

固定化された核酸又はペプチド核酸に連結した被験核酸と、

被験核酸にハイブリダイズ可能な核酸又はペプチド核酸であって、標識部位を有する標識核酸又は標識ペプチド核酸とを、ハイブリダイズする工程、

40

標識核酸又は標識ペプチド核酸が有する標識部位を、検出する工程、

を含む、被験核酸中のメチルシトシンを検出する方法。

【請求項 8】

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸が、固定化された核酸又はペプチド核酸の一部又は全部の配列とハイブリダイズ可能な配列、及び被験核酸の一部又は全部の配列とハイブリダイズ可能な配列を有し、

これらのハイブリダイズ可能な配列が、固定化された核酸又はペプチド核酸、及び被験核酸を、ハイブリダイズした場合に、被験核酸のメチルシトシンと、固定化された核酸又はペプチド核酸の式 I、式 I I、式 I I I、又は式 I V で表される基とが、隣接して配置

50

される配列である、請求項 7 に記載の方法。

【請求項 9】

標識部位が、蛍光色素、ビオチン、ハプテン、酵素、フェロセン、スピン活性化化合物、及び放射性物質からなる群より選択された標識によって標識されている、請求項 7 ~ 8 の何れかに記載の方法。

【請求項 10】

請求項 1 又は請求項 2 に記載の式 I、式 II、式 III、又は式 IV で表される基を塩基部分として末端に有する核酸又はペプチド核酸であって、担体に固定化された核酸又はペプチド核酸、

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸、及び、

標識部位を有する標識核酸又は標識ペプチド核酸、

を含んでなる、メチルシトシン検出用キット。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、光応答性プローブ（メチルシトシン光連結剤）を用いたメチルシトシンの検出法に関する。

【背景技術】

【0002】

DNA のメチル化は、DNA を構成する塩基のひとつ「シトシン」に対して生じる反応で、いつ・どの遺伝子からタンパク質を作るのかを制御し、タンパク質合成に必要な RNA への転写ステップを正しく調節している。このシトシンのメチル化（5 - メチルシトシンの生成）は、遺伝子の塩基配列によらずに、例えば遺伝子の働きを不活性化する役割を果たすが、異常を起こすと発がんへ至ることも知られている。塩基配列ではなく後天的な作用によって形質発現の調節機構に影響を与えるという観点、すなわち、エピジェネティクスの観点から、シトシンのメチル化はにおいて極めて重要な現象である。

【0003】

そのために、メチル化が発生する DNA の位置や、その量は正常なのかを即時に計測することが必要である。特に、例えば、医療の現場において DNA メチル化を測定する場合には、迅速かつ正確に判定結果が得られることが求められる。

【0004】

従来のメチルシトシン（5 - メチルシトシン）の検出の方法としては、亜硫酸水素塩処理による方法が知られている。この亜硫酸水素塩処理による方法では、被験試料である DNA に対して亜硫酸水素塩処理の後に、PCR、シーケンシング操作を行い、これによってメチル化されたシトシンはシトシンとして検出され、メチル化されていないシトシンは、チミンとして検出される。このような亜硫酸水素塩処理による検出は、例えば特許文献 1（特表 2004 - 511235 号公報）に開示されている。しかし、このような亜硫酸水素塩処理は、長時間の加熱反応が必要で、大半のゲノムサンプルで非特異的損傷が生じ、これによるエラー（誤検出）も発生するという欠点があった。

【0005】

従来のメチルシトシンの検出の方法としては、亜硫酸水素塩処理による方法の他に、メチルシトシン感受性の制限酵素と非感受性の制限酵素を使用する方法（MIAMI 法）が知られている。この方法では、メチルシトシン感受性の制限酵素と非感受性の制限酵素を使い分け、さらに PCR 等を用いて検出を行う。しかし、酵素反応を使用するために、検出操作は煩雑であり、検出までに数日の時間を要するという欠点があった。

【特許文献 1】特表 2004 - 511235 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

このように、DNA 中のメチル化されたシトシン（メチルシトシン）を、メチル化され

10

20

30

40

50

ていないシトシンから区別して、検出する方法として知られる従来の方法は、迅速、簡便、高感度の点で十分ではなく、DNA中のメチルシトシンを、迅速、簡便に、高感度で検出する方法が求められていた。

【0007】

従って、本発明の目的は、DNA中のメチルシトシンを、迅速、簡便に、高感度で検出する方法を提供することにある。

【0008】

さらに、本発明の目的は、迅速、簡便、高感度なメチルシトシン検出法に使用可能な化合物（検出用プローブ、検出剤）を提供することにもある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明者等は、DNA中のメチル化されたシトシン（メチルシトシン）を、メチル化されていないシトシンから区別して検出する方法を、鋭意研究してきたところ、塩基部分として後述する式I、式II、式III、又は式IVで表される基を有する核酸類が、疎水性基に結合したビニル基によって、DNA中のメチル化されたシトシン（メチルシトシン）に対して、高い選択性をもって光連結すること、この性質を利用することによって、メチル化されたシトシン（メチルシトシン）を、メチル化されていないシトシンから区別して検出することができることを見出して、本発明に到達した。


【0010】

従って、本発明は、次の[1]～[10]にある。

[1]

塩基部分として、次の式I、式II、式III、又は式IV：

【化1】




(ただし、式I中、Xは、O、SまたはNHを示し、

R1及びR3は、それぞれ独立に、水素、C1～C6のアルキル基、C1～C6のアルコキシ基、シアノ基、又はC1～C6のアシル基を示し、

R2は、C1～C12の炭素数を有する疎水性基を示す。)


【化2】



(ただし、式II中、R4及びR6は、それぞれ独立に、水素、C1～C6のアルキル基、C1～C6のアルコキシ基、シアノ基、又はC1～C6のアシル基を示し、

R5は、C1～C12の炭素数を有する疎水性基を示す。)

【化 3】



(III)

10


(ただし、式 III 中、Yは、O、SまたはNHを示し、

Zは、YがOまたはSであるときNH₂を示し、YがNHであるときは水素原子を示し、

R7及びR9は、それぞれ独立に、水素、C1～C6のアルキル基、C1～C6のアルコキシ基、シアノ基、又はC1～C6のアシル基を示し、

R8は、C1～C12の炭素数を有する疎水性基を示す。)

【化 4】



(IV)

20

(ただし、式 IV 中、R10及びR12は、それぞれ独立に、水素、C1～C6のアルキル基、C1～C6のアルコキシ基、シアノ基、又はC1～C6のアシル基を示し、

R11は、C1～C12の炭素数を有する疎水性基を示す。)

で表される基を有する核酸類(ただし、核酸類には、核酸、モノヌクレオチド及びペプチド核酸が含まれる)。

30

[2]

R2, R5, R8及びR11が、C1～C12の炭素数を有する炭化水素基である、[1]に記載の核酸類(ただし、核酸類には、核酸、モノヌクレオチド及びペプチド核酸が含まれる)。

[3]

[1]～[2]の何れかに記載の核酸類からなる、メチルシトシン光連結剤。

[4]

[1]～[2]の何れかに記載の核酸類からなる、光応答性メチルシトシン検出剤。

[5]

[1]～[2]の何れかに記載の核酸類を使用して、メチルシトシンを光連結する方法。

40

[6]

[1]～[2]の何れかに記載の核酸類を使用して、メチルシトシンを検出する方法。

[7]

[1]又は[2]に記載の式 I、式 II、式 III、又は式 IVで表される基を塩基部分として末端に有する核酸又はペプチド核酸であって、担体に固定化された核酸又はペプチド核酸、及び、

メチルシトシンを有する被験核酸を、

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸と、ハイブリダイズする工程、

50

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸とハイブリダイズすることによって、近接して配置された被験核酸と、固定化された核酸又はペプチド核酸とに対して、光照射を行って、被験核酸を、固定化された核酸又はペプチド核酸に光連結する工程、

ハイブリダイズしていた鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸を、解離して除去する工程、
固定化された核酸又はペプチド核酸に連結した被験核酸と、

被験核酸にハイブリダイズ可能な核酸又はペプチド核酸であって、標識部位を有する標識核酸又は標識ペプチド核酸とを、ハイブリダイズする工程、

標識核酸又は標識ペプチド核酸が有する標識部位を、検出する工程、
を含む、被験核酸中のメチルシトシンを検出する方法。

[8]

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸が、固定化された核酸又はペプチド核酸の一部又は全部の配列とハイブリダイズ可能な配列、及び被験核酸の一部又は全部の配列とハイブリダイズ可能な配列を有し、

これらのハイブリダイズ可能な配列が、固定化された核酸又はペプチド核酸、及び被験核酸を、ハイブリダイズした場合に、被験核酸のメチルシトシンと、固定化された核酸又はペプチド核酸の式 I、式 I I、式 I I I、又は式 I V で表される基とが、隣接して配置される配列である、[7] に記載の方法。

[9]

標識部位が、蛍光色素、ビオチン、ハプテン、酵素、フェロセン、スピン活性化化合物、及び放射性物質からなる群より選択された標識によって標識されている、[7] ~ [8] の何れかに記載の方法。

[10]

[1] 又は [2] に記載の式 I、式 I I、式 I I I、又は式 I V で表される基を塩基部分として末端に有する核酸又はペプチド核酸であって、担体に固定化された核酸又はペプチド核酸、

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸、及び、

標識部位を有する標識核酸又は標識ペプチド核酸、
を含んでなる、メチルシトシン検出用キット。

【発明の効果】

【 0 0 1 1 】

本発明によれば、DNA 中のメチル化されたシトシン（メチルシトシン）を、メチル化されていないシトシンから区別して、迅速、簡便に、高感度で検出することができる。本発明においては、メチルシトシンの検出は、選択的な光連結によって行われるために、連結に必要な操作は光の照射という簡便な操作で行うことができ、従来の亜硫酸水素塩処理や制限酵素処理のような複雑な操作は必要ない。また、本発明においては、メチルシトシンの検出は、選択的な光連結によって行われるために、連結は極めて迅速な光化学反応によって行われ、従来の亜硫酸水素塩処理や制限酵素処理による方法よりも、極めて短時間で検出を行うことができる。本発明によれば、ゲノムサンプルには非特異的損傷が生じることはなく、これによるエラー（誤検出）も発生することがない。

【 0 0 1 2 】

本発明による光連結は、可逆的な光連結である。本発明による光連結によって生じた共有結合は、光連結に使用した波長とは異なる波長の光照射を行うことによって、光開裂をすることができる。このために、メチルシトシンの検出のために光連結された DNA は、所定の部位のシトシンについて、メチル化の有無の検出を行った後に、光開裂をさせることによって、再び遊離させることができる。すなわち、本発明によれば、検出の前後で、被験試料の DNA に全く損傷を与えることなく、メチルシトシンの検出を行うことが可能である。本発明は、このような非破壊的なメチルシトシン検出を初めて可能にするものである。

【 0 0 1 3 】

本発明によれば、被験試料の DNA に全く損傷を与えることなく、所定の部位のシトシ

10

20

30

40

50

ンについて、メチル化の有無を検出することができるために、同じ分子を反復して使用して、さらに別な部位のシトシンについても、メチル化の有無を検出することが可能である。すなわち、本発明によれば、わずか1分子のDNAがあれば、それを破壊することなく反復して使用して、分子全体にわたってシトシンのメチル化の有無を検出することが可能であるために、極めて高感度の検出が可能である。また、従来のメチルシトシン検出法では、複数の部位のシトシンについてのメチル化の有無の情報を、同種のDNA分子の集合体についての情報として得ることができるだけである。しかし、本発明によれば、複数の部位のシトシンについてのメチル化の有無の情報を、ある1分子のDNAについての情報として得ることができる。すなわち、本発明は、ある1分子のDNAにおいて、複数の部位のシトシンについてのメチル化の有無の情報を得ることを、初めて可能にするものである。

10

【0014】

本発明によるメチルシトシンの検出は、迅速、簡便、高感度なものであるために、医療の現場において使用される場合も、その利用の価値は極めて高い。本発明によるメチルシトシンの検出は、迅速な点から日帰りの検診にも適し、簡便な点は広範な医療施設での実施を可能とし、高感度な点は被験試料を提供する患者の身体的な負担を極めて低減する。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】図1は本発明に係る光連結性核酸類のシトシン(C)及びメチルシトシン(mC)との光連結の選択性を蛍光強度の測定によって示した図である。

20

【発明を実施するための最良の形態】

【0016】


以下に実施の形態を挙げて、本発明を詳細に説明する。本発明は、以下に例示される実施の形態に限定されるものではない。

【0017】

本発明によれば、

塩基部分として、次の式I、式II、式III、又は式IV：

【化5】



30


(ただし、式I中、Xは、O、SまたはNHを示し、

R1及びR3は、それぞれ独立に、水素、C1～C6のアルキル基、C1～C6のアルコキシ基、シアノ基、又はC1～C6のアシル基を示し、

40

R2は、C1～C12の炭素数を有する疎水性基を示す。)


【化6】



10

(ただし、式 I I 中、R4 及び R6 は、それぞれ独立に、水素、C 1 ~ C 6 のアルキル基、C 1 ~ C 6 のアルコキシ基、シアノ基、又は C 1 ~ C 6 のアシル基を示し、R5 は、C 1 ~ C 1 2 の炭素数を有する疎水性基を示す。)


【化7】



20

(ただし、式 I I I 中、Y は、O、S または NH を示し、Z は、Y が O または S であるとき NH₂ を示し、Y が NH であるときは水素原子を示し、R7 及び R9 は、それぞれ独立に、水素、C 1 ~ C 6 のアルキル基、C 1 ~ C 6 のアルコキシ基、シアノ基、又は C 1 ~ C 6 のアシル基を示し、R8 は、C 1 ~ C 1 2 の炭素数を有する疎水性基を示す。)

【化8】



30

(ただし、式 I V 中、R10 及び R12 は、それぞれ独立に、水素、C 1 ~ C 6 のアルキル基、C 1 ~ C 6 のアルコキシ基、シアノ基、又は C 1 ~ C 6 のアシル基を示し、R11 は、C 1 ~ C 1 2 の炭素数を有する疎水性基を示す。)

40

で表される基を有する核酸類(ただし、核酸類には、核酸、モノヌクレオチド及びペプチド核酸が含まれる)を、メチルシトシン光連結剤として使用して、メチルシトシンを光連結することにより、メチルシトシンを検出することができる。すなわち、上記塩基部分として、次の式 I、式 I I、式 I I I、又は式 I V で表される基を有する核酸類(ただし、核酸類には、核酸、モノヌクレオチド及びペプチド核酸が含まれる)を、光応答性メチルシトシン検出剤として使用することができる。

【0018】

R 2 , R 5 , R 8 及び R 1 1 は、水素原子、又は C 1 ~ C 1 2 の炭素数を有する疎水性

50

基である。このように、疎水性基をビニル基に結合することによって、シトシンがメチル化された場合に、高い選択性をもって光連結することを可能にしたものである。従って、疎水性基は、C 1 ~ C 1 2 の炭素数を有する疎水性基であればよく、疎水性基は炭化水素基に限られず、例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子を含む基であってもよく、環構造を形成していてもよく、飽和又は不飽和の基とすることができる。

【 0 0 1 9 】

本発明の好適な実施の態様において、R 2 , R 5 , R 8 及び R 1 1 は、C 1 ~ C 1 2 、好ましくは C 1 ~ C 1 0 、さらに好ましくは C 1 ~ C 8 、さらに好ましくは C 1 ~ C 6 、さらに好ましくは C 2 ~ C 6 、さらに好ましくは C 3 ~ C 6 、さらに好ましくは C 4 ~ C 6 の炭素数を有する炭化水素基とすることができる。炭化水素基は、直鎖であってもよく、分岐を有していてもよく、環構造を形成していてもよい。炭化水素基は、飽和又は不飽和の炭化水素基とすることができる。好適に使用可能な不飽和の炭化水素基としては、例えば、メチル基 (メタン - 1 - イル)、エチル基 (エタン - 1 - イル)、プロパン - 1 - イル、プロパン - 2 - イル、ブタン - 1 - イル、ブタン - 2 - イル、ペンタン - 1 - イル、ペンタン - 2 - イル、ペンタン - 3 - イル、メチルプロパン - 1 - イル、メチルプロパン - 2 - イル、2 - メチルブタン - 1 - イル、2 - メチルブタン - 2 - イル、2 - メチルブタン - 3 - イル、2 - メチルブタン - 4 - イル、ヘキサン - 1 - イル、ヘキサン - 2 - イル、ヘキサン - 3 - イル、2 - メチルペンタン - 1 - イル、2 - メチルペンタン - 2 - イル、2 - メチルペンタン - 3 - イル、2 - メチルペンタン - 4 - イル、2 - メチルペンタン - 5 - イル、3 - メチルペンタン - 1 - イル、3 - メチルペンタン - 2 - イル、3 - 10
20
メチルペンタン - 3 - イル、2, 2 - ジメチルブタン - 1 - イル、2, 2 - ジメチルブタン - 3 - イル、2, 2 - ジメチルブタン - 4 - イル、2, 3 - ジメチルブタン - 1 - イル、2, 3 - ジメチルブタン - 2 - イル等を挙げることができる。好適に使用可能な環状の飽和又は不飽和の炭化水素基としては、例えば、シクロヘキサン - 1 - イル、シクロヘキセン - 1 - イル、シクロヘキセン - 3 - イル、シクロヘキセン - 4 - イル、フェニル等を挙げることができる。

【 0 0 2 0 】

R 1、R 3、R 4、R 6、R 7、R 9、R 1 0、及び R 1 2 は、それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、シアノ基、又は C 1 ~ C 6 のアシル基である。好適なアルキル基としては、一般に C 1 ~ C 8、好ましくは C 1 ~ C 6、さらに好ましくは C 1 ~ C 5、さらに好ましくは C 1 ~ C 4、さらに好ましくは C 1 ~ C 3、さらに好ましくは C 1 ~ C 2、さらに好ましくは C 1 の炭素数を有するアルキル基を挙げることができる。好適なアルコキシ基としては、一般に C 1 ~ C 8、好ましくは C 1 ~ C 6、さらに好ましくは C 1 ~ C 5、さらに好ましくは C 1 ~ C 4、さらに好ましくは C 1 ~ C 3、さらに好ましくは C 1 ~ C 2、さらに好ましくは C 1 の炭素数を有するアルコキシ基を挙げることができる。好適なアシル基としては、一般に C 1 ~ C 8、好ましくは C 1 ~ C 6、さらに好ましくは C 1 ~ C 5、さらに好ましくは C 1 ~ C 4、さらに好ましくは C 1 ~ C 3、さらに好ましくは C 1 ~ C 2、さらに好ましくは C 1 の炭素数を有するアシル基を挙げることができる。

【 0 0 2 1 】

特に好適な実施の態様において、R 1、R 3、R 4、R 6、R 7、R 9、R 1 0、及び R 1 2 は、それぞれ独立に、水素、メチル基、エチル基、メトキシ基、エトキシ基、シアノ基、アセチル基であり、好ましくは、水素、メチル基、メトキシ基、又はシアノ基である。

【 0 0 2 2 】

本発明における核酸類とは、核酸及びペプチド核酸 (PNA) を含み、さらにモノヌクレオチドを含む。モノヌクレオチドには、リボヌクレオチドのモノヌクレオチド及びデオキシリボヌクレオチドのモノヌクレオチドが含まれる。核酸としては、天然の核酸である DNA 及び RNA が含まれ、さらに、非天然 (人工) の核酸である LNA (BNA) 等の修飾核酸が含まれる。

10

20

30

40

50

【 0 0 2 3 】

本発明によるメチルシトシンの検出は、次の工程：

の式 I、式 II、式 III、又は式 IV で表される基を塩基部分として末端に有する核酸又はペプチド核酸であって、担体に固定化された核酸又はペプチド核酸、及び、
メチルシトシンを有する被験核酸を、

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸と、ハイブリダイズする工程、

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸とハイブリダイズすることによって、近接して配置された被験核酸と、固定化された核酸又はペプチド核酸とに対して、光照射を行って、被験核酸を、固定化された核酸又はペプチド核酸に光連結する工程、

ハイブリダイズしていた鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸を、解離して除去する工程、

固定化された核酸又はペプチド核酸に連結した被験核酸と、

被験核酸にハイブリダイズ可能な核酸又はペプチド核酸であって、標識部位を有する標識核酸又は標識ペプチド核酸とを、ハイブリダイズする工程、

標識核酸又は標識ペプチド核酸が有する標識部位を、検出する工程、

を含む、被験核酸中のメチルシトシンを検出する方法によって、行うことができる。

10

【 0 0 2 4 】

このような方法を行うことによって、DNA 中のメチル化されたシトシン（メチルシトシン）を、メチル化されていないシトシンから区別して、迅速、簡便に、高感度で検出することができる。

【 0 0 2 5 】

本発明の好適な実施の態様において、

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸が、固定化された核酸又はペプチド核酸の一部又は全部の配列とハイブリダイズ可能な配列、及び被験核酸の一部又は全部の配列とハイブリダイズ可能な配列を有し、

これらのハイブリダイズ可能な配列が、固定化された核酸又はペプチド核酸、及び被験核酸を、ハイブリダイズした場合に、被験核酸のメチルシトシンと、固定化された核酸又はペプチド核酸の式 I、式 II、式 III、又は式 IV で表される基とが、隣接して配置される配列であることが好ましい。

20

【 0 0 2 6 】

このような好適な実施の 1 態様が、後述する式 (2) の流れに図示されている。式 (2) の左図では、

式 I、式 II、式 III、又は式 IV で表される基を塩基部分として末端に有する核酸又はペプチド核酸であって、担体に固定化された核酸又はペプチド核酸、

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸、及び、

メチルシトシンを有する被験核酸、が用意されて、これらがハイブリッド形成（ハイブリダイズ）可能な条件下におかれることによって、ハイブリッド形成（ハイブリダイズ）している。

30

【 0 0 2 7 】

式 (2) の左図において、式 I、式 II、式 III、又は式 IV で表される基を有する塩基は、X と図示されている。X を 5' 末端に有する核酸は、そのもう一方の末端を、担体に固定されている。固定は、必ずしも図示された末端で行う必要はなく、配列の途中を介して、行うこともできる。担体との結合は、ハイブリダイズの効率の向上のために、適切な長さのリンカーを介して行ってもよい。リンカーは、核酸類であってもよいが、その他の高分子であってもよい。リンカーと担体との結合には、公知の手段を使用することができる。担体は、好ましくはガラス基板やプラスチック基板である。蛍光測定装置での測定に適した光透過性のプレートに適切な間隔で多数の核酸をスポットして固定して使用することができる、あるいは蛍光測定装置での測定に適した光透過性の多数のウェルを備えたプレートを使用することもできる。

40

【 0 0 2 8 】

式 (2) の左図において、メチル化の有無を検出したい標的 (t a r g e t) となる部

50

位のシトシンは、メチルシトシン (mC) 又はシトシン (C) の何れかであり、Y と図示されている。本発明によってメチルシトシンが検出される場合には、Y がメチルシトシンである。Y をその配列の中に有している核酸が、被験核酸である。

【0029】

式(2)の左図において、鋳型核酸 (template) は、X を末端に有する核酸の一部と、Y を配列中に有する被験核酸の一部と、ハイブリッド形成 (ハイブリダイズ) 可能な相補的な配列を有している。この配列の詳細は、表1に示されている。式(2)においては、鋳型核酸とハイブリッド形成することによって、X を末端に有する核酸のXと、被験核酸のYとは、隣接して配置されている。鋳型核酸の役割は、このようにXとYとを隣接して配置することにあるので、鋳型核酸の配列は、そのような配置を可能とする配列であればどのようなものであってもよい。そのような隣接配置を可能とする限りにおいて、鋳型核酸の配列は、X を末端に有する核酸の一部と相補的であってもよく、全部と相補的であってもよい。また、そのような隣接配置を可能とする限りにおいて、鋳型核酸の配列は、被験核酸のどの一部と相補的であってもよく、全部と相補的であってもよい。

10

【0030】

式(2)の左図にあるように、XとYと隣接して配置された後に、光照射を行って、被験核酸のYを、固定化された核酸又はペプチド核酸のXと、光連結する。この光連結は、光反応によって行われるために、迅速であると同時に、意図しない副反応や非特異的な反応の心配もなく、クリーンであり、さらに、酵素反応を行う場合のような反応条件の精妙な維持は必要ない。

20

【0031】

光連結のために照射される光は、一般に330~380nmの範囲、好ましくは350~380nmの範囲、さらに好ましくは350~370nmの範囲、さらに好ましくは360~370nmの範囲、さらに好ましくは366nmの波長を含む光が好ましく、特に好ましくは、366nmの単波長のレーザー光である。

【0032】

式(2)の左図から中央図への流れにおいて、366nmでの光照射に続けて、ハイブリダイズしていた鋳型核酸を、洗浄によって解離して除去する工程が示されている。解離と除去のための洗浄の条件は、このようなハイブリッド解離に通常使用可能な条件で行うことができる。ただし、被験核酸は、XとYとの光連結によって、Xを末端に有する核酸を介して担体に共有結合的に固定されているので、鋳型核酸の解離と除去のための洗浄の条件は、通常使用される条件よりも、極めて強い条件で行うことができる。このような条件として、例えば、70~100、好ましくは80~100、さらに好ましくは85~100以上、さらに好ましくは90~100、さらに好ましくは95~100、さらに好ましくは98~100の範囲の温度の水又は水溶液での洗浄を挙げることができ、あるいは例えば大気圧での煮沸による洗浄を挙げることができ、このような温度の水又は水溶液で、例えば、10秒~15分、好ましくは30秒~10分の時間の洗浄を挙げることができる。このように強い条件の洗浄によって、鋳型核酸の解離と除去を行うことにより、検出のノイズを極めて低減することができる。

30

【0033】

XとYとの光連結によって、被験核酸は、Xを末端に有する核酸を介して担体に共有結合的に固定されている。そのため、ハイブリッド形成が解かれて、鋳型核酸が解離して除去された後も、被験核酸は、担体に固定されたままとなっている。この様子が、式(2)の中央図に示されている。

40

【0034】

式(2)の中央図から右図への流れにおいて、固定化された核酸に連結した被験核酸と、被験核酸にハイブリダイズ可能な核酸であって標識部位を有する標識核酸 (ODN (Cy3)) とを、ハイブリダイズする工程が、示されている。ハイブリッド形成 (ハイブリダイズ) は、通常使用される条件を使用することができる。ODN (Cy3) は、被験核酸にハイブリダイズ可能な配列を有しており、その配列の一例が表1に示されている。

50

【0035】

式(2)の右図は、被験核酸が、XとYとの光連結によってXを末端に有する核酸を介して担体に共有結合的に固定され、さらに標識核酸(ODN(Cy3))とハイブリッド形成している様子を示している。

【0036】

式(2)の右図に示されているODN(Cy3)は、その標識部位として蛍光標識であるCy3を有している。標識核酸の標識部位に使用可能な標識は、公知の標識を使用することができ、例えば、蛍光色素、ビオチン、ハプテン、酵素、フェロセン、スピン活性化化合物、及び放射性物質からなる群より選択された標識を使用することができ、これらの標識の検出は、それぞれ公知の手段によって行うことができる。

10

【0037】

式(2)の右図において、最終的に標識核酸の標識が検出されることによって、式(2)の左図において隣接して配置されていたYとXとが、光連結していたことが検出される。このようなXとの光連結は、Yがメチルシトシン(mC)である場合に、高い選択性をもって生じるために、標識核酸の標識の検出される強度によって、被験核酸の中のYがメチル化されたシトシンであることを、検出することができる。

【0038】

式(2)の右図のような状態で、Yのメチルシトシンが検出された被験核酸は、YがXと光連結している他は、式(2)の左図の状態と比べて、特段の化学修飾等を受けてはいない。そして、本発明における光連結は、光照射によって光連結した後に、光連結時とは異なる波長の光を照射することによって、光開裂をすることができる。

20

【0039】

光開裂のために照射される光は、一般に300~320nmの範囲、好ましくは305~315nmの範囲、さらに好ましくは312nmの波長を含む光が好ましく、特に好ましくは、312nmの単波長のレーザー光である。

【0040】

光連結及び光開裂は、光反応を利用しているために、pH、温度、塩濃度などに特段の制約がなく、核酸類等の生体高分子が安定に存在可能なpH、温度、塩濃度とした溶液中で、光照射によって行うことができる。

【0041】

メチルシトシンの検出に使用された被験核酸は、光連結した部分を光開裂することによって、何ら修飾や損傷を受けることなく回収することができる。これによって回収された被験核酸は、別な部位のメチルシトシンの検出のために、本発明に係る検出方法の被験試料として再び使用することができ、あるいはメチル化部位が特定された核酸として、別な用途の出発材料として使用することもできる。

30

【0042】

光連結した部分を光開裂することによって被験核酸を回収した場合には、固定化された核酸(Xを5'末端に有する核酸)もまた、何ら修飾や損傷を受けることなく、担体に固定された状態で回収することができ、このように回収した、固定化された核酸は、本発明に係る検出方法のために、再び使用することができる。

40

【0043】

このように、本発明に係る核酸類は、可逆的な光連結を可能とし、可逆的な光連結剤、可逆的な光応答性メチルシトシン検出剤として使用することができるものである。本発明に係る検出方法は、検出のための試薬や被験試料を、その原理において、いずれも再利用して使用できるという極めて有利な特徴を持っている。このために、本発明は、環境負荷が少なく、省資源、省エネルギーであり、また、被験試料を再利用できることから、極めて高感度の方法となっている。

【0044】

また、本発明は、式I、式II、式III、又は式IVで表される基を塩基部分として末端に有する核酸又はペプチド核酸であって、担体に固定化された核酸又はペプチド核酸

50

、
 鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸、及び、
 標識部位を有する標識核酸又は標識ペプチド核酸、
 を含んでなる、メチルシトシン検出用キットにもある。

【0045】

本発明に係るキットは、本発明に係る検出方法の実施に好適に使用できるものである。

【実施例】

【0046】

以下に実施例を挙げて、本発明を詳細に説明する。本発明は、以下に例示される実施例に限定されるものではない。

【0047】


[メチルシトシン検出の為に光応答性核酸合成]

次の式(1)の流れに従いメチルシトシン検出に用いる光応答性核酸の合成を行った。

【0048】

式(1)


【化9】



【0049】

化合物 2 a

【化10】



10

20

30

40

50

【 0 0 5 0 】

[5 - ヘプテン - 2 ' - デオキシウリジン (^HU) (2 a) 合成]

5 - ヨード - 2 ' - デオキシウリジン (1) (500 mg、1.41 mmol) を D M F (2.5 ml) とジオキサソラン (2.5 ml) に溶かし込み、そこへパラジウムアセテート (31 mg、0.14 mmol) を加え懸濁させた。更にトリブチルアミン (340 μl、1.41 mmol)、1 - ヘプテン (5 ml、3.53 mmol) を加えマイクロウェーブによる加熱で 1 0 0 °C、2 0 分間の反応を行った。反応後のサンプルは T L C (C H C l ₃ : M e O H = 9 : 1) で原料が 9 割以上減少を確認し、シリカゲルカラムを用いて、展開溶媒を C H C l ₃ : M e O H = 9 : 1 にして精製した。¹H NMRにて目的化合物を測定し同定した。またMALDI-TOF MSにて質量分析を行い目的化合物であることを同定した。(calcd. for C₁₆H₂₅N₂O₅ [M+H]⁺ 325.179, found 325.801)


10

¹H NMR (CDCl₃): 7.59 (s, 1H, H-C(6)); 6.29-6.13 (m, 2H, vinylic H, H-C(1')); 6.00 (d, 1H, J=16.5 vinylic H); 4.58 (m, 1H, H-C(3')); 4.03 (m, 1H, H-C(4')); 3.90-3.80 (m, 2H, H-C(5')); 2.38 (m, 2H, H-C(2')); 1.95-0.84 (m, 11H, CH₃(CH₂)₂).

【 0 0 5 1 】

化合物 3 a

【 化 1 1 】



20

【 0 0 5 2 】

[5 - ヘプテン - 2 ' - デオキシ - 5 ' - O - (4 , 4 ' - ジメトキシトリチル) ウリジン (3 a) 合成]

化合物 (2 a) (340 mg、1.05 mmol) を脱水ピリジンで 3 回共沸した。そこへ脱水ピリジン (2.0 ml) を加え 1 時間脱気した 4 , 4 ' - ジメトキシトリチルクロライド (427 mg、1.26 mmol) を加え、続けて D M A P (38 mg、0.31 mmol) を添加した。最後に、トリエチルアミン (170 μl、1.26 mmol) を加えて室温で 1 3 時間撹拌した。T L C (C H C l ₃ : M e O H = 9 5 : 5) で生成物を確認した後シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて展開溶媒を C H C l ₃ : M e O H = 9 8 : 2 から 9 5 : 5 に変化させて精製し薄黄色い固体の目的化合物 (3 a) (304 mg、0.49 mmol、収率 4 6 %) を得た。¹H NMRにて目的化合物を測定し同定した。また、MALDI-TOF MSにて質量分析を行い目的化合物であることを同定した。(calcd. for C₃₇H₄₃N₂O₇ [M+H]⁺ 627.306, found 627.455)

30


¹H NMR (CDCl₃): 8.46 (br.s, 1H, NH); 7.63 (s, 1H, H-C(6)); 7.49-7.23 (m, 8H, arom. H); 6.87-6.82 (m, 5H, arom. H); 6.45-6.16 (m, 3H, H-C(1'), vinylic H); 4.56 (m, 1H, H-C(3')); 4.09-4.04 (m, 1H, H-C(4')); 3.76 (s, 6H, OMe); 3.53-3.33 (m, 2H, H-C(5')); 2.44-2.20 (m, 2H, H-C(2')); 1.79-1.63 (m, 11H, CH₃(CH₂)₂).

40

【 0 0 5 3 】

化合物 4 a

【化 1 2】



10

【 0 0 5 4】

[5 - ヘプテン - 2' - デオキシ - 5' - O - (4 , 4' - ジメトキシトリチル) ウリジンホスホアミダイト (4 a) 合成]


アセトニトリル (0.5 mL) で共沸した化合物 (3 a) (233 mg、0.37 mmol) にアセトニトリル (1.5 ml) を加えた。反応溶液に 2 - シアノエチル - N , N , N' , N' - テトライソプロピルホスホアミダイト (120 μ L、0.38 mmol) と 0 . 4 5 M テトラゾールのアセトニトリル溶液 (910 μ L、0.41 mmol) を加えて、反応溶液を室温で 1 . 5 時間撹拌した。反応溶液を脱酢酸処理した酢酸エチルで 3 回抽出し、飽和 N a H C O ₃ 水溶液で洗浄した。有機層を M g S O ₄ で乾燥し、溶媒を除去した。ゴムシールドボトルにアセトニトリルで移し 3 回共沸し、目的化合物 (4 a) (収量 320 mg、0.39 mmol、quant) を得た。MALDI-TOF MSにて質量分析を行い目的化合物である事を同定した (calcd. for C₄₆H₆₀N₄O₈ P [M+H]⁺ 827.414, found 827.731)。

20

【 0 0 5 5】

化合物 2 b

【化 1 3】



30

【 0 0 5 6】

[5 - シクロヘキシルビニル - 2' - デオキシウリジン (^H V U) (2 b) 合成]

5 - ヨード - 2' - デオキシウリジン (1) (505 mg、1.42 mmol) を D M F (2.5 mL) とジオキサン (2.5 mL) に溶かし込み、そこへパラジウムアセテート (33 mg、0.14 mmol) を加え懸濁させた。更にトリブチルアミン (340 μ l、1.41 mmol)、ビニルシクロヘキサン (2.0 mL、14.1 mmol) を加えマイクロウェーブによる加熱で 1 0 0 、 2 0 分間の反応を行った。原料の消失を T L C (C H C l ₃ : M e O H = 9 : 1) にて確認した。その後、シリカゲルカラムを用いて、展開溶媒を C H C l ₃ : M e O H = 9 : 1 にして精製した。(2 b) は 400 mg、1.19 mmol で収率は 8 4 % であった。¹H NMRにて目的化合物を測定し同定した。またMALDI-TOF MSにて質量分析を行い目的化合物である事を同定した (calcd. for C₁₇H₂₅N₂O₅ [M+H]⁺ 337.176, found 337.156)。

40

¹H NMR (C D C l ₃) : 7.62 (s, 1H, H-C(6)); 6.36-6.28 (m, 1H, vinylic H); 6.21-6.13 (m, 2H, vinylic H, H-C(1')); 6.03 (d, 1H, J=16.2, vinylic H); 4.61 (m, 1H, H-C(3')); 4.04 (m, 1H, H-C(4')); 3.97-3.81 (m, 2H, H-C(5')); 2.51-2.33 (m, 2H, H-C(2'))


50

; 2.14-1.06 (m, 11H, C₆H₁₁).

【 0 0 5 7 】

化合物 3 b

【 化 1 4 】



10

【 0 0 5 8 】

[5 - シクロヘキシルビニル - 2' - デオキシ - 5' - O - (4 , 4' - ジメトキシトリチル) ウリジン (3 b) 合成]

化合物 (2 b) (320 mg、0.95 mmol) を脱水ピリジンで 3 回共沸した。そこへ脱水ピリジン (1.5 mL) を加え、4 , 4' - ジメトキシトリチルクロライド (380 mg、1.12 mmol) を加え、続けて DMA P (41 mg、0.34 mmol) を添加した。最後に、トリエチルアミン (160 μ l、1.14 mmol) を加えて室温で 2 1 時間撹拌した。T L C (C H C l ₃ : M e O H = 9 : 1) で生成物を確認した後、シリカゲルカラムにて、展開溶媒を C H C l ₃ : M e O H = 9 8 : 2 から 9 5 : 5 に変化させて精製し薄黄色い固体の目的化合物 (3 b) (329 mg、0.52 mmol、収率 5 4 %) を得た。¹H NMRにて目的化合物を測定し同定した。また、MALDI-TOF MSにて質量分析を行い目的化合物である事を同定した(calcd. for C₃₈H₄₃N₂O₇ [M+H]⁺ 639.306, found 639.496)。

20


¹H NMR (CDCl₃): 8.17 (br. s, 1h, NH); 7.68 (s, 1H, H-C(6)); 7.44-7.22 (m, 8H, arom. H); 6.82 (m, 6H, arom. H, vinylic H); 6.42-6.19 (m, 2H, vinylic H, H-C(1')); 4.54(m, 1H, H-C(3')); 4.04(m, 1H, H-C(4')); 3.79 (s, 6H, OMe) 3.50 (dd, 1H, J=10.5, 3.0, H-C(5')); 2.99 (dd, 1H, J=10.5, 3.0, H-C(5')); 2.42-2.26 (m, 2H, H-C(2'))); 1.99-1.22 (m, 11H, C₆H₁₁).

30

【 0 0 5 9 】

化合物 4 b

【 化 1 5 】



40

【 0 0 6 0 】

[5 - シクロヘキシルビニル - 2' - 5' - O - (4 , 4' - ジメトキシトリチル) ウリジンホスホアミダイト (4 b) 合成]

アセトニトリル (0.5 mL) で共沸した化合物 (3 b) (320 mg、0.50 mmol) にアセトニトリル (2.5 ml) を加えた。反応溶液に 2 - シアノエチル - N , N' , N' - テト


50

ライソプロピルホスホアミダイト (160 μ L、0.50 mmol) と 0.45 M テトラゾールのアセトニトリル溶液 (1.2 mL、0.55 mmol) を加えて、反応溶液を室温で 1.5 時間攪拌した。反応溶液を脱酢酸処理した酢酸エチルで 3 回抽出し、飽和 NaHCO₃ 水溶液で洗浄した。有機層を MgSO₄ で乾燥し、溶媒を除去した。ゴムシールドボトルにアセトニトリルで移し 3 回共沸し、目的化合物 (4b) (収量 432 mg、0.51 mmol、quant.) を得た。MALDI-TOF MS にて質量分析を行い目的化合物である事を同定した (calcd. for C₄₇H₆₀N₄O₈P [M+H]⁺ 839.414, found 839.330)。

【0061】

化合物 2c

【化16】



10

【0062】

20

[5-tert-ブチルビニル-2'-デオキシウリジン (B^uVU) (2C) 合成]

5-ヨードデオキシウリジン (1) (0.5 g、1.41 mmol) を DMF (2.5 mL) とジオキササン (2.5 mL) に溶かし込み、そこへパラジウムアセテート (32.0 mg、0.14 mmol) を加え懸濁させた。更にトリブチルアミン (340 μ l、1.41 mmol)、3,3-ジメチル-1-ブテン (5.5 mL、42.3 mmol) を加えマイクロウェーブによる加熱で 100 °C で 15 分間、反応を行った。TLC (CHCl₃ : MeOH = 9 : 1) にて原料 6 割以上の消失を確認し、反応を終了した。その後、さらに、この操作をもう一度行い、合成した後に、シリカゲルカラムを用いて、展開溶媒を CHCl₃ : MeOH = 9 : 1 にして精製した。目的化合物 (2c) (271 mg、0.87 mmol、収率 31%) を得た。¹H NMR にて目的化合物を固定した。また、MALDI-TOF MS にて質量分析を行い目的化合物である事を同定した (calcd. for C₁₅H₂₃N₂O₅ [M+H]⁺ 311.160, found 311.355)。


30

¹H NMR (DMSO): 8.03 (s, 1H, H-C(6)); 6.44 (d, 1H, J=16.5, vinylic H); 6.17 (t, 1H, J=6.6, H-C(1')); 5.96 (d, 1H, J=16.5, vinylic H); 5.24 (m, 1H, 3'-OH); 5.13 (t, 1H, J=5.0, 5'-OH); 4.25 (m, 1H, H-C(3')); 3.78 (m, 1H, H-C(4')); 3.65-3.54 (m, 2H, H-C(5')); 2.12 (m, 2H, H-C(2')); 1.59-1.49 (m, 2H, (CH₃)₃C); 1.40-1.24 (m, 2H, (CH₃)₃C); 1.04 (m, 5H, (CH₃)₃C).

【0063】

化合物 3c

【化17】



40

【0064】

50

[5 - tert - ブチルピニル - 2' - デオキシ - 5' - O - (4 , 4' - ジメトキシトリチル)ウリジン (3 c) 合成]

化合物 (2 c) (497 mg、1.60 mmol) を脱水ピリジンで 3 回共沸した。そこへ脱水ピリジン (2.0 ml) を加え 4 , 4' - ジメトキシトリチルクロライド (666 mg、1.97 mmol) を加え、続けて D M A P (67 mg、0.55 mmol) を添加した。最後に、トリエチルアミン (270 μ l、1.92 mmol) を加えて室温で 19 時間攪拌した。T L C (C H C l ₃ : M e O H = 9 : 1) で生成物を確認した後シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて展開溶媒を C H C l ₃ : M e O H = 97 : 3 から 95 : 5 に変化させて精製し薄黄色い固体の目的化合物 (3 c) (601 mg、0.98 mmol、収率 61 %) を得た。¹H NMRにて目的化合物を同定した。MALDI-TOF MSにて質量分析を行い目的化合物である事を同定した(calcd. for C₃₆H₄₁N₂O₇ [M+H]⁺ 613.291, found 613.699)。

10


¹H NMR (DMSO): 11.5(br. s, 1H, NH); 8.32 (s, 1H, H-C(6)); 7.43-7.22 (m, 8H, arom. H); 6.89-6.85 (m, 5H, arom. H); 6.41 (d, 1H, J=16.2, vinylic H); 6.23 (t, 1H, J=6.3, H-C(1')); 5.72 (d, 1H, J=16.2, vinylic H); 5.32 (t, 1H, J=4.5, 3'-OH); 4.26 (m, 1H, H-C(3')); 3.91(m, 1H, H-C(4')); 3.73 (s, 6H, OMe); 3.27-3.11 (m, 2H, H-C(5')); 2.35-2.25 (m, 1H, H-C(2')); 2.21-2.13 (m, 1H, H-C(2')); 0.90-0.76 (m, 9H, (CH₃)₃C).

【 0 0 6 5 】

化合物 4 c

20

【 化 1 8 】



30

【 0 0 6 6 】

[5 - tert - ブチルピニル - 2' - デオキシ - 5' - O - (4 , 4' - ジメトキシトリチル)ウリジンホスホアミダイト (4 c) 合成]

アセトニトリル (0.5 mL) で共沸した化合物 (3 b) (186 mg、0.25 mmol) にアセトニトリル (1.5 ml) を加えた。反応溶液に 2 - シアノエチル - N , N' , N' - テトライソプロピルホスホアミダイト (80 μ L、0.25 mmol) と 0 . 4 5 M テトラゾールのアセトニトリル溶液 (600 μ L、0.27 mmol) を加えて、反応溶液を室温で 1 . 5 時間攪拌した。反応溶液を脱酢酸処理した酢酸エチルで 3 回抽出し、飽和 N a H C O ₃ 水溶液で洗浄した。有機層を M g S O ₄ で乾燥し、溶媒を除去した。ゴムシールドボトルにアセトニトリルで移し 3 回共沸し、目的化合物 (4 b) (収量 197 mg、0.24 mmol、収率 99 %) を得た。MALDI-TOF MSにて質量分析を行い目的化合物である事を同定した(calcd. for C₄₅H₅₈N₄O₈P [M+H]⁺ 813.399, found 814.770)。

40

【 0 0 6 7 】

[D N A 合成]

式 (1) の流れによる合成で得られた光応答性核酸を ABI 3400 DNA 合成機を用いて 1 μ mol スケールで合成した。28%アンモニア水溶液による C P G の切り出し後、55 で 8 時間インキュベートして脱保護を行い、speed vacにてアンモニアを除去した。凍結乾燥後、H P L C により精製を行い O D N (^H U)、O D N (^H V U)、O D N (^B U V U) を得た。その後、質量分析を MALDI-TOF-MS にて行った。

50

【 0 0 6 8 】


ODN(^HU) : 5' -^HUGACGTGTATCGCATTGGSSSS-NH₂-3'ODN(^{HV}U) : 5' -^{HV}UGACGTGTATCGCATTGGSSSS-NH₂-3'ODN(^{BuV}U) : 5' -^{BuV}UGACGTGTATCGCATTGGSSSS-NH₂-3'

【 0 0 6 9 】

ただし、上記配列中のSSSSは、次の構造の単量体Sがリン酸基側を5'末端側に向けてリン酸エステル結合してなる鎖状構造（リンカー）を示す。

【 0 0 7 0 】

【 化 1 9 】



10

【 0 0 7 1 】

calcd. for ODN(^HU) : [(M+H)⁺] 7185.08, found 7184.36.calcd. for ODN(^{HV}U) : [(M+H)⁺] 7197.09, found 7197.59.calcd. for ODN(^{BuV}U) : [(M+H)⁺] 7171.05, found 7171.20.

【 0 0 7 2 】

[メチルシトシン検出]

次の表1に示した配列を用いて、ガラス基板上でのメチルシトシン検出を、以下の式（ 2 ）の流れに従って行った。

20

【 0 0 7 3 】

【 表 1 】

Sequences (5'-3')	
ODN(^H U)	^H UGACGTGTATCGCATTGGSSSSNH ₂
ODN(^{HV} U)	^{HV} UGACGTGTATCGCATTGGSSSSNH ₂
ODN(^{BuV} U)	^{BuV} UGACGTGTATCGCATTGGSSSSNH ₂
target(C)	GCTATCTGAGCAGCGCTCATGGTGGGGGCA GCGCCTCACAACCTCCGTCATGTGCTGTGA
target(^m C)	GCTATCTGAGCAGCGCTCATGGTGGGGGCA G ^m CGCCTCACAACCTCCGTCATGTGCTGTGA
template	CGATACACGTCAGCTGCCCCCACCA
ODN(Cy3)	Cy3-CGCTGCTCAGATAGC


30

【 0 0 7 4 】

式（ 2 ）

40

【化20】



10

【0075】

(1) 光応答性プローブの固定化

2 μ M ODN(^HU)、50 mM カコジル酸ナトリウム、100 mM NaCl になる水溶液を調整した。ODN(^{HV}U)、ODN(^{BuV}U) に関して、それぞれ同様の水溶液を調整した。これらをガラス基板上に2.0 μ L ずつスポットし、基板上に固定化する為に16時間開静置した。固定終了後に、室温で、0.1% (w/v) SDS 水溶液で2回洗浄し、その後さらに超純水で2回洗浄した。室温で乾燥させたガラス基板上にNaBH₄ (3.75 mg) をPBS (リン酸緩衝サリン溶液: pH 7.2) (1.5 mL)、エタノール (375 μ L) に溶かした溶液を全面に滴下して5分開静置した。その後超純水で洗浄し、98 °C の熱水で3分間煮沸し、煮沸後、室温で乾燥させた。

20

【0076】

(2) ガラス基板上での光連結反応

10 μ M target(C)、10 μ M template、50 mM カコジル酸ナトリウム、100 mM NaCl になる水溶液を調整し、(1) で作製したガラス基板上の光応答性プローブを固定化した位置に4.0 μ L ずつスポットした。target(^mC) に関して同様の水溶液を調整して4.0 μ L ずつスポットした。このガラス基板を0 °C の条件下でトランスイルミネーターを用いて366 nm の光照射を1時間行った。光照射後に98 °C の熱水で5分間煮沸して、未反応のtarget(C)、target(^mC) とtemplateを洗い流した。

30

【0077】

(3) ODN(Cy3) による蛍光検出

5 μ M ODN(Cy3)、10 μ M template、50 mM カコジル酸ナトリウム、100 mM NaCl になる水溶液を調整した。この水溶液を(2) のガラス基板上に50 μ L 滴下して、カバーガラスを上から載せて全面に広げ、4 °C で24時間開静置してハイブリダイゼーションさせた。ハイブリダイゼーション後、カバーガラスをつけたまま、洗浄液1 (1x SSC、0.2% SDS) を満たした容器に入れてカバーガラスが外れるまで軽く震盪した。別の容器に洗浄液1を満たしてカバーガラスの外れたプレートを入れて室温で適度に震盪しながら5分開静置した。さらに別の容器に洗浄液2 (0.1x SSC、0.2% SDS) を満たしてプレートを入れて、室温で適度に震盪しながら5分開静置し、更に同じ操作を別の容器でもう一度繰り返した。別の容器に洗浄液3 (0.1x SSC) を満たしてプレートを入れて、室温で適度に震盪しながら1分開静置し、更に同じ操作を別の容器でもう一度繰り返した。最後にMilli Q を満たしたビーカーにプレートを軽く浸して洗浄した。プレート用のスピナーで水分を取り除いた後にプレートリーダーにて蛍光の検出を行った。

40

50

【 0 0 7 8 】

[結果]

プレートリーダーで蛍光強度を読み取った結果を図 1 (a) に示す。その強度を target (C) と target (^mC) とで比較したグラフが図 1 (b) に示す。ODN (^H U)、ODN (^H ^V U)、ODN (^B ^u ^V U) のいずれの構造も、メチルシトシンとの連結効率が検出可能な程度に高いものであった。target (C) と target (^mC) の蛍光強度の比をとると、ODN (^H U) を用いた場合に、メチルシトシン (m C) の蛍光強度はシトシン (C) の蛍光強度と比較して 4 . 2 倍という高い値であった。ODN (^H ^V U) では、メチルシトシン (m C) の蛍光強度はシトシン (C) の蛍光強度と比較して 4 . 1 倍、ODN (^B ^u ^V U) ではメチルシトシン (m C) の蛍光強度はシトシン (C) の蛍光強度と比較して 2 . 6 倍という高い値であった。

10

【 0 0 7 9 】

以上のように、ODN (^H U)、ODN (^H ^V U)、ODN (^B ^u ^V U) のいずれの構造でも、メチルシトシン (m C) の蛍光強度は、シトシン (C) の蛍光強度と比較して極めて大きいことがわかった。このことから、本発明に係る光連結性核酸類を使用した場合に、メチルシトシン (m C) に対する光連結は、シトシン (C) に対する光連結と比較して、非常に高い効率で起こること、すなわち、メチル化されたシトシンに対して選択的に光連結が生じることがわかった。


【 産業上の利用可能性 】

【 0 0 8 0 】

本発明によれば、DNA 中のメチル化されたシトシン (メチルシトシン) を、メチル化されていないシトシンから区別して、迅速、簡便に、高感度で検出することができるために、産業において非常に有用である。本発明は、非破壊的なメチルシトシン検出を初めて可能にするものであり、ある 1 分子の DNA において複数の部位のシトシンについてのメチル化の有無の情報を得ることを初めて可能にするものである。本発明によるメチルシトシンの検出は、医療の現場において使用される場合も、その利用の価値は極めて高く、迅速な点から日帰りの検診にも適し、簡便な点から広範な医療施設での実施を可能とし、高感度な点から被験試料を提供する患者の身体的な負担を極めて低減するものである。

20

【図 1】



【配列表】

2009113303000001.app

【手続補正書】

【提出日】平成22年1月8日(2010.1.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更


【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

塩基部分として、次の式 I、式 II、式 III、又は式 IV：

【化 2 1】




(ただし、式 I 中、X は、O、S または NH を示し、

R 1 及び R 3 は、それぞれ独立に、水素、C 1 ~ C 6 のアルキル基、C 1 ~ C 6 のアルコキシ基、シアノ基、又は C 1 ~ C 6 のアシル基を示し、


R 2 は、C 1 ~ C 12 の炭素数を有する疎水性基を示す。)

【化 2 2】



(ただし、式 I I 中、R 4 及び R 6 は、それぞれ独立に、水素、C 1 ~ C 6 のアルキル基、C 1 ~ C 6 のアルコキシ基、シアノ基、又は C 1 ~ C 6 のアシル基を示し、R 5 は、C 1 ~ C 1 2 の炭素数を有する疎水性基を示す。)

【化 2 3】




(ただし、式 I I I 中、Y は、O、S または NH を示し、Z は、Y が O または S であるとき NH₂ を示し、Y が NH であるときは水素原子を示し、

R 7 及び R 9 は、それぞれ独立に、水素、C 1 ~ C 6 のアルキル基、C 1 ~ C 6 のアルコキシ基、シアノ基、又は C 1 ~ C 6 のアシル基を示し、

R 8 は、C 1 ~ C 1 2 の炭素数を有する疎水性基を示す。)

【化 2 4】



(ただし、式 I V 中、R 1 0 及び R 1 2 は、それぞれ独立に、水素、C 1 ~ C 6 のアルキル基、C 1 ~ C 6 のアルコキシ基、シアノ基、又は C 1 ~ C 6 のアシル基を示し、

R 1 1 は、C 1 ~ C 1 2 の炭素数を有する疎水性基を示す。)

で表される基を有する核酸類(ただし、核酸類には、核酸、モノヌクレオチド及びペプチド核酸が含まれる)からなる、メチルシトシン光連結剤。

【請求項 2】

R 2 , R 5 , R 8 及び R 1 1 が、C 1 ~ C 1 2 の炭素数を有する炭化水素基である、請求項 1 に記載の核酸類(ただし、核酸類には、核酸、モノヌクレオチド及びペプチド核酸が含まれる)からなる、メチルシトシン光連結剤。

【請求項 3】

(削除)

【請求項 4】

請求項 1 ~ 2 の何れかに記載の核酸類からなる、光応答性メチルシトシン検出剤。

【請求項 5】

請求項 1 ~ 2 の何れかに記載の核酸類を使用して、メチルシトシンを光連結する方法。

【請求項 6】

請求項 1 ~ 2 の何れかに記載の核酸類を使用して、メチルシトシンを検出する方法。

【請求項 7】

請求項 1 又は請求項 2 に記載の式 I、式 II、式 III、又は式 IV で表される基を塩基部分として末端に有する核酸又はペプチド核酸であって、担体に固定化された核酸又はペプチド核酸、及び、

メチルシトシンを有する被験核酸を、

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸と、ハイブリダイズする工程、

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸とハイブリダイズすることによって、近接して配置された被験核酸と、固定化された核酸又はペプチド核酸とに対して、光照射を行って、被験核酸を、固定化された核酸又はペプチド核酸に光連結する工程、

ハイブリダイズしていた鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸を、解離して除去する工程、

固定化された核酸又はペプチド核酸に連結した被験核酸と、

被験核酸にハイブリダイズ可能な核酸又はペプチド核酸であって、標識部位を有する標識核酸又は標識ペプチド核酸とを、ハイブリダイズする工程、

標識核酸又は標識ペプチド核酸が有する標識部位を、検出する工程、

を含む、被験核酸中のメチルシトシンを検出する方法。

【請求項 8】

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸が、固定化された核酸又はペプチド核酸の一部又は全部の配列とハイブリダイズ可能な配列、及び被験核酸の一部又は全部の配列とハイブリダイズ可能な配列を有し、

これらのハイブリダイズ可能な配列が、固定化された核酸又はペプチド核酸、及び被験核酸を、ハイブリダイズした場合に、被験核酸のメチルシトシンと、固定化された核酸又はペプチド核酸の式 I、式 II、式 III、又は式 IV で表される基とが、隣接して配置される配列である、請求項 7 に記載の方法。

【請求項 9】

標識部位が、蛍光色素、ビオチン、ハプテン、酵素、フェロセン、スピン活性化化合物、及び放射性物質からなる群より選択された標識によって標識されている、請求項 7 ~ 8 の何れかに記載の方法。

【請求項 10】

請求項 1 又は請求項 2 に記載の式 I、式 II、式 III、又は式 IV で表される基を塩基部分として末端に有する核酸又はペプチド核酸であって、担体に固定化された核酸又はペプチド核酸、

鋳型核酸又は鋳型ペプチド核酸、及び、

標識部位を有する標識核酸又は標識ペプチド核酸、

を含んでなる、メチルシトシン検出用キット。

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2009/001090
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER C07H19/06(2006.01)i, C07H19/073(2006.01)i, C07H19/10(2006.01)i, C07H19/14(2006.01)i, C12N15/09(2006.01)i, C12Q1/68(2006.01)i, G01N33/58(2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C07H19/06, C07H19/073, C07H19/10, C07H19/14, C12N15/09, C12Q1/68, G01N33/58 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2009 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2009 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2009 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAplus/REGISTRY/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS/REGISTRY(STN), JSTplus(JDreamII), JMEDplus(JDreamII), Igaku-Yakugaku Yokoshu Zenbun Database		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	FARINA, V. et al, The Stille reaction, Organic Reactions (Hoboken, NJ, United States), 1997, Vol.50, CHAPTER 1, pp.1-652, particularly, p.366	1,2 3-10
X A	DING, H. et al, Hole Migration is the Major Pathway Involved in Alkali-Labile Lesion Formation in DNA by the Direct Effect of Ionizing Radiation, Journal of the American Chemical Society, 2007, Vol.129, No.4, p.772-773, particularly, p.772, Scheme 2	1,2 3-10
X A	DING, Y. et al, Synthesis of 2'-O-methyl-5-alkynyl and alkenyl substituted uridine derivatives to screen for inhibitors of HCV, Heterocycles, 2006, Vol.68, No.3, p.521-530, particularly, p.522, Scheme 1	1,2 3-10
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 14 April, 2009 (14.04.09)		Date of mailing of the international search report 28 April, 2009 (28.04.09)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/001090

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	AUCAGNE, V. et al, Palladium-Catalyzed Synthesis of Uridines on Polystyrene-Based Solid Supports, Journal of Combinatorial Chemistry, 2004, Vol.6, No.5, p.717-723, particularly, p.718, Scheme 2a	1,2 3-10
X A	GUPTA, S. et al, Applications of graph theory: Relationship of molecular connectivity index and atomic molecular connectivity index with anti-HSV activity, THEOCHEM, 2001, Vol.571, 147-152, p.571, 147-152, particularly, p.148, Fig.1; p.149-151, Table 1	1,2 3-10
X A	POZNAŃSKI, J. et al, 1H NMR conformational study of antiherpetic C5-substituted 2'-deoxyuridines: insight into the nature of structure-activity relationships, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2000, Vol.272, No.1, p.64-74, particularly, p.66, TABLE 1	1,2 3-10
X A	SELVIDGE, S.D. et al, Synthesis of 5-formyluridines, Nucleosides & Nucleotides, 1997, Vol.16, No.10 & 11, p.2019-2024, particularly, p.2021, Scheme	1,2 3-10
X A	YAMAGUCHI, T. et al, Synthesis and utilization of a photolabile oligodeoxyribonucleotide probe bearing an aryl(trifluoromethyl) diazirine moiety, Nucleic Acids Symposium Series, 1996, No.35 (Twentythird Symposium on Nucleic, p.237-238, full text	1,2 3-10
X A	CSERHÁTI, T. et al, Inclusion complex formation of antisense nucleotides with hydroxypropyl β -cyclodextrin, International Journal of Pharmaceutics, 1996, Vol.141, No.1, 2, p.1-7, particularly, p.3, Table 1	1,2 3-10
X A	YAMAGUCHI, T. et al, Synthetic nucleoside and nucleotides. XXXIV. Photoaffinity labeling of HIV reverse transcriptase: synthesis and utilization of 2',3'-dideoxy uridylylate analogs bearing aryl(trifluoromethyl)diazirine moiety, Nucleosides & Nucleotides, 1996, Vol.15, No.1-3, p.607-18, particularly, p.608, FIG.1	1,2 3-10
X A	MATSUHASHI, H. et al, Synthesis of 5-substituted pyrimidine nucleosides through a palladium-catalyzed cross-coupling of alkenylhalosilanes, Heterocycles, 1996, Vol.42, No.1, p.375-84, particularly, p.378	1,2 3-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/001090

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	CSERHÁTI, T. et al, Thin layer chromatography and principal component analysis for the study of the interaction of amino acids with some antisense nucleosides, <i>Analytica Chimica Acta</i> , 1995, Vol.316, No.1, p.105-10, particularly, p.106	1,2 3-10
X A	KÁLMÁN, A. et al, Crystal structure of (E)-5-(1-butenyl)-2'-deoxyuridine, $C_{13}H_{18}N_2O_5$, <i>Zeitschrift für Kristallographie</i> , 1995, Vol.210, No.9, p.713-14, particularly, title	1,2 3-10
X A	MOLINA, M.J. et al, Theoretical studies of 5-X-2'-deoxyuracils with known antiviral activity. Part 2. A comparison of molecular mechanics, AM1, and PM3 methodologies, <i>THEOCHEM</i> , 1995, Vol.333, No.1-2, p.111-19, particularly, p.112	1,2 3-10
X A	YAMAGUCHI, T. et al, Utilization of photo-reactive 2'-deoxy-5-styryluridylic acid analog as a photoaffinity labeling for HIV-1 reverse transcriptase, <i>Nucleic Acids Symposium Series</i> , 1994, No.31, p.287-8, full text	1,2 3-10
X A	YAMAGUCHI, T. et al, Synthetic nucleosides and nucleotides. XXXI. Inhibitory effects of 2'-deoxy-5-styryluridine 5'-triphosphate analogs on retroviral reverse transcriptases and higher eukaryotic DNA polymerases, <i>Nucleosides & Nucleotides</i> , 1994, Vol.13, No.6-7, p.1247-58, particularly, p.1248	1,2 3-10
X A	CZERNECKI, S. et al, Carbometallation of 5-ethynyl-pyrimidine-2'-deoxy nucleosides: preparation of 5-(1-[E]-butenyl)- and 5-(3-[E]-hex-3-enyl)-2'-deoxyuridine, <i>Tetrahedron Letters</i> , 1994, Vol.35, No.21, p.3539-42, particularly, p.3539	1,2 3-10
X A	MENDIRATTA, S. et al, Structure-Activity Study on Antiviral 5-Vinylpyrimidine Nucleoside Analogs Using Wiener's Topological Index, <i>Journal of Chemical Information and Computer Sciences</i> , 1994, Vol.34, No.4, p.867-71, full text	1,2 3-10
X A	MOLINA, M.J. et al, Structural study of β -D-arabinofuranosyluracil derivatives with known antiviral activity. Part 2. Molecular mechanics and molecular orbital (MNDO, AM1 and PM3) calculations: a comparative study, <i>THEOCHEM</i> , 1994, Vol.305, p.35-53, particularly, p.36, Table 1	1,2 3-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/001090

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	WO 93/10820 A1 (GILEAD SCIENCE, INC.), 10 June, 1993 (10.06.93), Claims; pages 47 to 48 & JP 7-501527 A & JP 3739785 B & US 5484908 A & US 5645985 A & US 5830653 A & US 6235887 B1 & US 6380368 B1 & US 2003/0096980 A1 & US 2003/0170680 A1 & US 2004/0220395 A1 & EP 637965 A & EP 1256589 A3 & DE 637965 T & DE 69232816 D & DE 69232816 T & AU 6345394 A & AU 3222793 A & CA 2122365 A & TW 393513 B & AT 226093 T	1,2 3-10
X A	HIROTA, K. et al, Facile synthesis of thymidine derivatives by cross-coupling of 5-halogenouridine derivatives with trimethylaluminum, Synthesis, 1993, No.2, p.213-15, particularly, p.213, right column	1,2 3-10
X A	YAMAGUCHI, T. et al, Inhibitory effects of 2'-deoxy-5-styryluridine 5'-triphosphate analogs on retroviral reverse transcriptase and eukaryotic DNA polymerases, Nucleic Acids Symposium Series, 1992, Vol.27, p.191-2, particularly, p.213, Figure 1	1,2 3-10
X A	VALKÓ, K. et al, Relationships between nucleotide incorporation rates and molecular parameters obtained by molecular modelling and chromatography, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 1991, Vol.9, No.10-12, p.1125-31, particularly, p.1126, Table 1	1,2 3-10
X A	YAMAGUCHI, T. et al, Synthetic nucleosides and nucleotides. XXX. Synthesis and antiviral activity of 3'-azido, 2',3'-unsaturated and 2',3'-dideoxy derivatives of E-5-styryl-2'- deoxyuridine on human immunodeficiency virus, Nucleosides & Nucleotides, 1992, Vol.11, No.2-4, p.373-82, particularly, p.375, SCHEME 1	1,2 3-10
X A	HASSAN, M.E., Cytidine nucleosides. II. Photochemical synthesis of 5-alkylcytidine nucleosides, Chemical Papers, 1991, Vol.45, No.5, p.697-702, particularly, p.698, Scheme 1	1,2 3-10
X A	WHALE, R.F. et al, The synthesis of some 5-vinyluracil nucleoside analogs, Nucleosides & Nucleotides, 1991, Vol.10, No.7, p.1615-24, particularly, p.1617	1,2 3-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/001090

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	HASSAN, M.E., Palladium-catalyzed cross-coupling reaction of organostannanes with nucleoside halides, Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 1991, Vol.56, No.9, p.1944-7, particularly, p.1946, SCHEME 2	1,2 3-10
X A	US 5043510 A (E. I. Du Pont de Nemours and Co.), 27 August, 1991 (27.08.91), Example 5 & CA 2020648 A1 & JP 4-77439 A	1,2 3-10
X A	CSERHÁTI, T., Retention behavior of some synthetic nucleosides on cyano (CN), diol, and amino (NH ₂) precoated high-performance thin-layer chromatographic plates, Journal of Chromatographic Science, 1991, Vol.29, No.5, p.210-16, particularly, p.211, TABLE II	1,2 3-10
X A	CSERHÁTI, T. et al, Hydrophobic interaction between tryptophan and some synthetic nucleosides, Biochemistry International, 1991, Vol.23, No.5, p.987-97, particularly, p.990, TABLE I	1,2 3-10
X A	VALKÓ, K. et al, Comparative investigation of the retention behavior of nucleoside derivatives on alumina stationary phases in thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatography, Journal of Chromatography, 1991, Vol.550, No.1-2, p.667-75, particularly, p.670, TABLE I	1,2 3-10
X A	ERIKSSON, S. et al, Comparison of the substrate specificities of human thymidine kinase 1 and 2 and deoxycytidine kinase toward antiviral and cytostatic nucleoside analogs, Biochemical and Biophysical Research Communications, 1991, Vol.176, No.2, p.586-92, particularly, p.589, TABLE II	1,2 3-10
X A	HASSAN, M.E., A new palladium-catalyzed coupling reaction of vinylic and allylic triflates with pyrimidine nucleosides, Canadian Journal of Chemistry, 1991, Vol.69, No.2, p.198-200, particularly, p.199, SCHEME 2	1,2 3-10
X A	OLOFSSON, S. et al, New virus-selective inhibitor of terminal glycosylation increasing immunological reactivity of a viral glycoprotein, Antiviral Chemistry & Chemotherapy, 1990, Vol.1, No.1, p.17-24, particularly, p.18, Fig.1	1,2 3-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/001090

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	CSERHÁTI, T. et al, Relationship between the hydrophobic and hydrophilic molecular parameters of some synthetic nucleosides, determined by means of adsorptive and reversed-phase thin-layer chromatography, Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 1990, Vol.20, No.2, p.81-95, particularly, p.84, TABLE 1	1,2 3-10
X A	VALKÓ, K. et al, Application of chromatographic retention data in an investigation of a quantitative structure-nucleotide incorporation rate relationship, Journal of Chromatography, 1990, Vol.506, 35-44, particularly, p.37, TABLE II	1,2 3-10
X A	CASALNUOVO, A.L. et al, Palladium-catalyzed alkylations in aqueous media, Journal of the American Chemical Society, 1990, Vol.112, No.11, p.4324-30, particularly, p.4329, Table III	1,2 3-10
X A	VALKÓ, K. et al, Correlation of nucleotide incorporation rate and HPLC retention parameters of substituted nucleosides, Journal of Liquid Chromatography, 1989, Vol.12, No.11, p.2103-16, particularly, p.2107, Table 1	1,2 3-10
X A	WO 88/04662 A1 (ASTRA LÄKEMEDEL AB.), 30 June, 1988 (30.06.88), Table 1 & JP 1-501551 A & US 5215971 A & EP 294443 A & DE 3780814 A & DE 3780814 T & DE 3780814 D & SE 8605503 A & AU 1083488 A & DK 462688 A & AT 78824 T & CA 1306695 A & SE 8605503 D & SE 8605503 A0	1,2 3-10
X A	IZUTA, S. et al, Synthetic nucleosides and nucleotides. XXVII. Selective inhibition of deoxyribonucleic acid polymerase α by 1- β -D-arabinofuranosyl-5-styryluracil 5'-triphosphates and related nucleotides: influence of hydrophobic and steric factors on the inhibitory action, Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1987, Vol.35, No.12, p.4829-38, particularly, p.4830, Chart 1	1,2 3-10
X A	HIROTA, K. et al, A simple synthesis of 5-(1-alkenyl)uracil derivatives by palladium catalyzed oxidative coupling of uracils with olefins, Synthesis, 1987, No.5, p.495-6, particularly, p.496, Table	1,2 3-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/001090

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	GOODCHILD, J. et al, The carbocyclic analog of 5-(1-propenyl)-2'-deoxyuridine. Synthesis and anti-herpes activity, Nucleosides & Nucleotides, 1986, Vol.5, No.5, p.571-8, particularly, p.575	1,2 3-10
X A	VINCENT, P. et al, Synthesis and biological activities of new (E)-5-alkynyl-2'-deoxyuridines, Nucleosides & Nucleotides, 1985, Vol.4, No.4, p.447-63, particularly, p.449, SCHEMA 1	1,2 3-10
X A	BALZARINI, J. et al, Incorporation of 5-substituted pyrimidine nucleoside analogs into DNA of a thymidylate synthetase-deficient murine FM3A carcinoma cell line, Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 1985, Vol.7, No.1, p.19-28, particularly, p.22, TABLE 1	1,2 3-10
X A	SIM, I.S. et al, 5-Substituted deoxyuridines - structural requirements for antiviral activity against herpes simplex virus types 1 and 2 and possible biochemical basis for relative potency, Antiviral Research, 1984, Vol.4, No.3, p.159-68, particularly, p.163, TABLE 2	1,2 3-10
X A	CROW, F.W. et al, Fast atom bombardment combined with tandem mass spectrometry for the determination of nucleosides, Analytical Biochemistry, 1984, Vol.139, No.1, p.243-62, particularly, p.248, TABLE 5	1,2 3-10
X A	CASSIMAN, J.J. et al, Induction of sister-chromatid exchange by 5-substituted 2'-deoxyuridines, Mutation Research, Genetic Toxicology Testing, 1983, Vol.117, No.3-4, p.317-27, particularly, p.320, TABLE 1	1,2 3-10
X A	GOODCHILD, J. et al, Structural requirements of olefinic 5-substituted deoxyuridines for antiherpes activity, Journal of Medicinal Chemistry, 1983, Vol.26, No.9, p.1252-7, particularly, p.1254, Table I	1,2 3-10
X A	ROBINS, M.J. et al, Nucleic acid related compounds. 39. Efficient conversion of 5-iodo to 5-alkynyl and derived 5-substituted uracil bases and nucleosides, Journal of Organic Chemistry, 1983, Vol.48, No.11, p.1854-62, particularly, p.1856, right column	1,2 3-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/001090

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	BALZARINI, J. et al, Structure-function relationship of the antitumor cell activity of pyrimidine and pyridine derivatives, Proc. Int. Round Table Nucleosides, Nucleotides Their Biol. Appl., 4th, 1982, p.275-91, particularly, p.280-281, Table 1	1,2 3-10
X A	DE CLERCQ, E. et al, Nucleic acid related compounds. 40. Synthesis and biological activities of 5-alkynyluracil nucleosides, Journal of Medicinal Chemistry, 1983, Vol.26, No.5, p.661-6, particularly, p.662, Scheme I	1,2 3-10
X A	SIM, I.S. et al, Possible molecular basis for antiviral activity of certain 5-substituted deoxyuridines, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1983, Vol.23, No.3, p.416-21, particularly, Abstract	1,2 3-10
X A	BALZARINI, J. et al, 5-Substituted 2'-deoxyuridines: correlation between inhibition of tumor cell growth and inhibition of thymidine kinase and thymidylate synthetase, Biochemical Pharmacology, 1982, Vol.31, No.22, p.3673-82, particularly, p.3678, Table 5	1,2 3-10
X A	LARSSON, A. et al, Selectivity of antiherpes compounds on viral and cellular DNA synthesis, International Congress Series, 1982, Vol.571 (Herpesvirus): Clin. Pharmaco, p.211-14, particularly, p.212, TABLE 1	1,2 3-10
X A	VINCENT, P. et al, E-5-alkenyl-2'-deoxyuridines by coupling of alkenyl organozirconiums with 5-iodo-0-3',5'-bis(trimethylsilyl)deoxyuridine, catalyzed by organopalladium complexes, Tetrahedron Letters, 1982, Vol.23, No.1, p.63-4, full text	1,2 3-10
X A	HAMPTON, A. et al, Species- or isozyme-specific enzyme inhibitors. 5. Differential effects of thymidine substituents on affinity for rat thymidine kinase isozymes, Journal of Medicinal Chemistry, 1982, Vol.25, No.6, p.644-9, particularly, p.645, left column	1,2 3-10
X A	BIGGE, C.F. et al, Palladium(II) catalyzed coupling reactions of polyuridylic acid and uridylyl(3' → 5')uridine with styrene and 3-nitrostyrene, Journal of Carbohydrates, Nucleosides, Nucleotides, 1981, Vol.8, No.4, p.295-313, particularly, p.302, SCHEME 2	1,2 3-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/001090

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	STENING, G. et al, Antiherpes activity of [E]-5-(1-propenyl)-2'-deoxyuridine and 5-(1-propenyl)-1-β-D-arabinofuranosyluracil, Antiviral Research, 1981, Vol.1, No.4, p.213-23, particularly, p.215, -216	1,2 3-10
X A	KULIKOWSKI, T. et al, Pyrimidine arabinofuranosyl nucleosides with 5-substituted long, branched and unsaturated chains: synthesis and antiherpes properties, Nucleic Acids Research, Symposium Series, 1981, No.9, p.103-6, particularly, p.104	1,2 3-10
X A	DE CLERCQ, E. et al, Differential inhibition of herpes simplex viruses, type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2), by (E)-5-(2-X-vinyl)-2'-deoxyuridines, Acta Microbiologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1981, Vol.28, No.3, p.307-12, particularly, p.308, Fig.1	1,2 3-10
X A	US 4267171 A (The Regents of the University of California), 12 May, 1981 (12.05.81), Column 1 (Family: none)	1,2 3-10
X A	BERGSTROM, D.E. et al, C-5-Substituted pyrimidine nucleosides. 3. Reaction of allylic chlorides, alcohols, and acetates with pyrimidine nucleoside derived organopalladium intermediates, Journal of Organic Chemistry, 1981, Vol.46, No.7, p.1432-41, particularly, p.1434, Table 1	1,2 3-10
X A	BERGSTROM, D.E. et al, Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine nucleoside antibiotic analogs. Synthesis via organopalladium intermediates derived from 5-mercuritubercidin, Journal of Organic Chemistry, 1981, Vol.46, NO.7, p.1423-31, particularly, p.1428, Scheme IV	1,2 3-10
X A	CHENG, Y. et al, Anti-herpes simplex virus and anti-human cell growth activity of E-5-propenyl-2'-deoxyuridine and the concept of selective protection in antiviral chemotherapy, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1980, Vol.18, No.6, p.957-61, particularly, p.958, TABLE 2	1,2 3-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/001090

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	MACHIDA, H. et al, Antiherpesviral activity and inhibitory action on cell growth of 5-alkenyl derivatives of 1-β-D-arabinofuranosyluracil, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1980, Vol.17, No.6, p.1030-1, particularly, p.1031, TABLE 1	1,2 3-10
X A	NAKAYAMA, C. et al, Thymidine phosphorylase. Substrate specificity for 5-substituted 2'-deoxyuridines, Journal of Medicinal Chemistry, 1980, Vol.23, No.8, p.962-4, particularly, p.963, Table I	1,2 3-10
X A	BIGGE, C.F. et al, Palladium-catalyzed coupling reactions of uracil nucleosides and nucleotides, Journal of the American Chemical Society, 1980, Vol.102, No.6, p.2033-8, particularly, p.2033, Scheme 1 ^a	1,2 3-10
X A	BIGGE, C.F. et al, Synthesis of 5-styryl derivatives of uracil nucleosides and nucleotides, Tetrahedron Letters, 1979, No.19, p.1653-6, particularly, p.19, Table 1	1,2 3-10
X A	BERGSTROM, D.E. et al, C-5 substituted pyrimidine nucleosides. 2. Synthesis via olefin coupling to organopalladium intermediates derived from uridine and 2'-deoxyuridine, Journal of the American Chemical Society, 1978, Vol.100, No.26, p.8106-12, particularly, p.8108, Scheme I	1,2 3-10
X A	RUTH, J.L. et al, C-5 substituted pyrimidine nucleosides. 1. Synthesis of C-5 allyl, propyl, and propenyl uracil and cytosine nucleosides via organopalladium intermediates, Journal of Organic Chemistry, 1978, Vol.43, No.14, p.2870-6, particularly, p.2871, Scheme I	1,2 3-10
P,X	OGINO, M. et al, Highly selective detection of 5-methylcytosine using photochemical ligation, Chemical Communications(Cambridge, United Kingdom), 2008.12, No.45, p.5996-5998	1-10
A	WO 2006/137190 A1 (Kyoto University), 28 December, 2006 (28.12.06), (Family: none)	1-10
A	Yoshiaki KYOI et al., "Hikari Otosei Cytosine Yudotai o Mochiita DNA-Enkitagata no Kenshutsu", The Chemical Society of Japan Koen Yokoshu, 12 March, 2007 (12.03.07), Vol.87th, No.2, page 1292, 2J2-50	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/001090

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	Masayuki OGINO et al., "DNA Hikari Ligation ni yoru RNA Mattan Labeling", The Chemical Society of Japan Koen Yokoshu, 12 March, 2008 (12.03.08), Vol.88th, No.2, page 1527, 3PA-038	1-10

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2009/001090									
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. C07H19/06(2006.01)i, C07H19/073(2006.01)i, C07H19/10(2006.01)i, C07H19/14(2006.01)i, C12N15/09(2006.01)i, C12Q1/68(2006.01)i, G01N33/58(2006.01)i											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. C07H19/06, C07H19/073, C07H19/10, C07H19/14, C12N15/09, C12Q1/68, G01N33/58											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2009年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2009年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2009年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2009年	日本国実用新案登録公報	1996-2009年	日本国登録実用新案公報	1994-2009年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2009年										
日本国実用新案登録公報	1996-2009年										
日本国登録実用新案公報	1994-2009年										
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CAplus/REGISTRY/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS/REGISTRY (STN), JSTPlus (JDreamII), JMEDPlus (JDreamII), 医学・薬学予稿集全文データベース											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
X A	FARINA,V. et al, The Stille reaction, Organic Reactions(Hoboken, NJ, United States), 1997, Vol.50, CHAPTER 1, pp.1-652, 特に、p.366	1, 2 3-10									
X A	DING,H. et al, Hole Migration is the Major Pathway Involved in Alkali-Labile Lesion Formation in DNA by the Direct Effect of Ionizing Radiation, Journal of the American Chemical Society, 2007, Vol.129, No.4, p.772-773 特に、p.772, Scheme 2	1, 2 3-10									
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。											
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献									
国際調査を完了した日 14.04.2009		国際調査報告の発送日 28.04.2009									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 瀬下 浩一	4P 9284								
		電話番号 03-3581-1101 内線 3492									

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 0 1 0 9 0
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X A	DING,Y. et al, Synthesis of 2'-O-methyl-5-alkynyl and alkenyl substituted uridine derivatives to screen for inhibitors of HCV, <i>Heterocycles</i> , 2006, Vol.68, No.3, p.521-530 特に、 p.522, Scheme 1	1, 2 3-10
X A	AUCAGNE,V. et al, Palladium-Catalyzed Synthesis of Uridines on Polystyrene-Based Solid Supports, <i>Journal of Combinatorial Chemistry</i> , 2004, Vol.6, No.5, p.717-723 特に、 p.718, Scheme 2a	1, 2 3-10
X A	GUPTA,S. et al, Applications of graph theory: Relationship of molecular connectivity index and atomic molecular connectivity index with anti-HSV activity, <i>THEOCHEM</i> , 2001, Vol.571, 147-152, p.571, 147-152 特に、 p.148, Fig.1; p.149-151, Table 1	1, 2 3-10
X A	POZNAŃSKI,J. et al, 1H NMR conformational study of antiherpetic C5-substituted 2'-deoxyuridines: insight into the nature of structure-activity relationships, <i>Biochemical and Biophysical Research Communications</i> , 2000, Vol.272, No.1, p.64-74 特に、 p.66, TABLE 1	1, 2 3-10
X A	SELVIDGE,S.D. et al, Synthesis of 5-formyluridines, <i>Nucleosides & Nucleotides</i> , 1997, Vol.16, No.10 & 11, p.2019-2024 特に、 p.2021, Scheme	1, 2 3-10
X A	YAMAGUCHI,T. et al, Synthesis and utilization of a photolabile oligodeoxyribonucleotide probe bearing an aryl(trifluoromethyl) diazirine moiety, <i>Nucleic Acids Symposium Series</i> , 1996, No.35(Twentythird Symposium on Nucleic, p.237-238 文献全体	1, 2 3-10
X A	CSERHÁTI,T. et al, Inclusion complex formation of antisense nucleotides with hydroxypropyl β -cyclodextrin, <i>International Journal of Pharmaceutics</i> , 1996, Vol.141, No.1,2, p.1-7 特に、 p.3, Table 1	1, 2 3-10
X A	YAMAGUCHI,T. et al, Synthetic nucleoside and nucleotides. XXXIV. Photoaffinity labeling of HIV reverse transcriptase: synthesis and utilization of 2',3'-dideoxy uridylate analogs	1, 2 3-10

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 0 1 0 9 0
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
	bearing aryl(trifluoromethyl)diazirine moiety, Nucleosides & Nucleotides, 1996, Vol.15, No.1-3, p.607-18 特に、 p.608, FIG.1	
X A	MATSUHASHI,H. et al, Synthesis of 5-substituted pyrimidine nucleosides through a palladium-catalyzed cross-coupling of alkenylhalosilanes, Heterocycles, 1996, Vol.42, No.1, p.375-84 特に、 p.378	1, 2 3-10
X A	CSERHÁTI,T. et al, Thin layer chromatography and principal component analysis for the study of the interaction of amino acids with some antisense nucleosides, Analytica Chimica Acta, 1995, Vol.316, No.1, p.105-10 特に、 p.106	1, 2 3-10
X A	KÁLMÁN,A. et al, Crystal structure of (E)-5-(1-butenyl)-2'-deoxyuridine, C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₅ , Zeitschrift für Kristallographie, 1995, Vol.210, No.9, p.713-14 特に、 title	1, 2 3-10
X A	MOLINA,M.J. et al, Theoretical studies of 5-X-2'-deoxyuracils with known antiviral activity. Part 2. A comparison of molecular mechanics, AM1, and PM3 methodologies, THEOCHEM, 1995, Vol.333, No.1-2, p.111-19 特に、 p.112	1, 2 3-10
X A	YAMAGUCHI,T. et al, Utilization of photo-reactive 2'-deoxy-5-styryluridylic acid analog as a photoaffinity labeling for HIV-1 reverse transcriptase, Nucleic Acids Symposium Series, 1994, No.31, p.287-8 文献全体	1, 2 3-10
X A	YAMAGUCHI,T. et al, Synthetic nucleosides and nucleotides. XXXI. Inhibitory effects of 2'-deoxy-5-styryluridine 5'-triphosphate analogs on retroviral reverse transcriptases and higher eukaryotic DNA polymerases, Nucleosides & Nucleotides, 1994, Vol.13, No.6-7, p.1247-58 特に、 p.1248	1, 2 3-10
X A	CZERNECKI,S. et al, Carbometallation of 5-ethynyl-pyrimidine-2'-deoxy nucleosides: preparation of 5-(1-[E]-butenyl)- and 5-(3-	1, 2 3-10

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 0 1 0 9 0
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
	[E]-hex-3-enyl)-2'- deoxyuridine, Tetrahedron Letters, 1994, Vol.35, No.21, p.3539-42 特に、 p.3539	
X A	MENDIRATTA,S. et al, Structure-Activity Study on Antiviral 5-Vinylpyrimidine Nucleoside Analogs Using Wiener's Topological Index, Journal of Chemical Information and Computer Sciences, 1994, Vol.34, No.4, p.867-71 文献全体	1, 2 3-10
X A	MOLINA,M.J. et al, Structural study of β-D- arabinofuranosyluracil derivatives with known antiviral activity. Part 2. Molecular mechanics and molecular orbital (MNDO, AM1 and PM3) calculations: a comparative study, THEOCHEM, 1994, Vol.305, p.35-53 特に、 p.36, Table 1	1, 2 3-10
X A	WO 93/10820 A1 (GILEAD SCIENCE, INC.) 1993.06.10, CLAIMS; p.47-48 & JP 7-501527 A & JP 3739785 B & US 5484908 A & US 5645985 A & US 5830653 A & US 6235887 B1 & US 6380368 B1 & US 2003/0096980 A1 & US 2003/0170680 A1 & US 2004/0220395 A1 & EP 637965 A & EP 1256589 A3 & DE 637965 T & DE 69232816 D & DE 69232816 T & AU 6345394 A & AU 3222793 A & CA 2122365 A & TW 393513 B & AT 226093 T	1, 2 3-10
X A	HIROTA,K. et al, Facile synthesis of thymidine derivatives by cross-coupling of 5-halogenouridine derivatives with trimethylaluminum, Synthesis, 1993, No.2, p.213-15 特に、 p.213, 右欄	1, 2 3-10
X A	YAMAGUCHI,T. et al, Inhibitory effects of 2'-deoxy-5'- styryluridine 5'-triphosphate analogs on retroviral reverse transcriptase and eukaryotic DNA polymerases, Nucleic Acids Symposium Series, 1992, Vol.27, p.191-2 特に、 p.213, Figure 1	1, 2 3-10
X A	VALKÓ,K. et al, Relationships between nucleotide incorporation rates and molecular parameters obtained by molecular modelling and chromatography, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 1991, Vol.9, No.10-12, p.1125-31	1, 2 3-10

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 0 1 0 9 0
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
	特に、 p.1126, Table 1	
X A	YAMAGUCHI,T. et al, Synthetic nucleosides and nucleotides. XXX. Synthesis and antiviral activity of 3'-azido, 2',3'- unsaturated and 2',3'-dideoxy derivatives of E-5-styryl-2'- deoxyuridine on human immunodeficiency virus, Nucleosides & Nucleotides, 1992, Vol.11, No.2-4, p.373-82 特に、 p.375, SCHEME 1	1, 2 3-10
X A	HASSAN,M.E., Cytidine nucleosides. II. Photochemical synthesis of 5-alkylcytidine nucleosides, Chemical Papers, 1991, Vol.45, No.5, p.697-702 特に、 p.698, Scheme 1	1, 2 3-10
X A	WHALE,R.F. et al, The synthesis of some 5-vinyluracil nucleoside analogs, Nucleosides & Nucleotides, 1991, Vol.10, No.7, p.1615-24 特に、 p.1617	1, 2 3-10
X A	HASSAN,M.E., Palladium-catalyzed cross-coupling reaction of organostannanes with nucleoside halides, Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 1991, Vol.56, No.9, p.1944-7 特に、 p.1946, SCHEME 2	1, 2 3-10
X A	US 5043510 A (E. I. Du Pont de Nemours and Company) 1991.08.27, EXAMPLE 5 & CA 2020648 A1 & JP 4-77439 A	1, 2 3-10
X A	CSERHÁTI,T., Retention behavior of some synthetic nucleosides on cyano (CN), diol, and amino (NH ₂) precoated high- performance thin-layer chromatographic plates, Journal of Chromatographic Science, 1991, Vol.29, No.5, p.210-16 特に、 p.211, TABLE II	1, 2 3-10
X A	CSERHÁTI,T. et al, Hydrophobic interaction between tryptophan and some synthetic nucleosides, Biochemistry International, 1991, Vol.23, No.5, p.987-97 特に、 p.990, TABLE I	1, 2 3-10
X	VALKÓ,K. et al, Comparative investigation of the retention	1, 2

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 0 1 0 9 0
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	behavior of nucleoside derivatives on alumina stationary phases in thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatography, <i>Journal of Chromatography</i> , 1991, Vol.550, No.1-2, p.667-75 特に、 p.670, TABLE I	3 - 1 0
X A	ERIKSSON,S. et al, Comparison of the substrate specificities of human thymidine kinase 1 and 2 and deoxycytidine kinase toward antiviral and cytostatic nucleoside analogs, <i>Biochemical and Biophysical Research Communications</i> , 1991, Vol.176, No.2, p.586-92 特に、 p.589, TABLE II	1, 2 3 - 1 0
X A	HASSAN,M.E., A new palladium-catalyzed coupling reaction of vinylic and allylic triflates with pyrimidine nucleosides, <i>Canadian Journal of Chemistry</i> , 1991, Vol.69, No.2, p.198-200 特に、 p.199, SCHEME 2	1, 2 3 - 1 0
X A	OLOFSSON,S. et al, New virus-selective inhibitor of terminal glycosylation increasing immunological reactivity of a viral glycoprotein, <i>Antiviral Chemistry & Chemotherapy</i> , 1990, Vol.1, No.1, p.17-24 特に、 p.18, Fig.1	1, 2 3 - 1 0
X A	CSERHÁTI,T. et al, Relationship between the hydrophobic and hydrophilic molecular parameters of some synthetic nucleosides, determined by means of adsorptive and reversed-phase thin-layer chromatography, <i>Journal of Biochemical and Biophysical Methods</i> , 1990, Vol.20, No.2, p.81-95 特に、 p.84, TABLE 1	1, 2 3 - 1 0
X A	VALKÓ,K. et al, Application of chromatographic retention data in an investigation of a quantitative structure-nucleotide incorporation rate relationship, <i>Journal of Chromatography</i> , 1990, Vol.506, 35-44 特に、 p.37, TABLE II	1, 2 3 - 1 0
X A	CASALNUOVO,A.L. et al, Palladium-catalyzed alkylations in aqueous media, <i>Journal of the American Chemical Society</i> , 1990, Vol.112, No.11, p.4324-30 特に、 p.4329, Tabl III	1, 2 3 - 1 0

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 0 1 0 9 0
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X A	VALKÓ,K. et al, Correlation of nucleotide incorporation rate and HPLC retention parameters of substituted nucleosides, Journal of Liquid Chromatography, 1989, Vol.12, No.11, p.2103-16 特に、 p.2107, Table 1	1, 2 3-10
X A	WO 88/04662 A1 (ASTRA LÄKEMEDEL AKTIEBOLAG) 1988.06.30, Table 1 & JP 1-501551 A & US 5215971 A & EP 294443 A & DE 3780814 A & DE 3780814 T & DE 3780814 D & SE 8605503 A & AU 1083488 A & DK 462688 A & AT 78824 T & CA 1306695 A & SE 8605503 D & SE 8605503 A0	1, 2 3-10
X A	IZUTA,S. et al, Synthetic nucleosides and nucleotides. XXVII. Selective inhibition of deoxyribonucleic acid polymerase α by 1- β -D-arabinofuranosyl-5-styryluracil 5'-triphosphates and related nucleotides: influence of hydrophobic and steric factors on the inhibitory action, Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1987, Vol.35, No.12, p.4829-38 特に、 p.4830, Chart 1	1, 2 3-10
X A	HIROTA,K. et al, A simple synthesis of 5-(1-alkenyl)uracil derivatives by palladium catalyzed oxidative coupling of uracils with olefins, Synthesis, 1987, No.5, p.495-6 特に、 p.496, Table	1, 2 3-10
X A	GOODCHILD,J. et al, The carbocyclic analog of 5-(1-propenyl)-2'-deoxyuridine. Synthesis and anti-herpes activity, Nucleosides & Nucleotides, 1986, Vol.5, No.5, p.571-8 特に、 p.575	1, 2 3-10
X A	VINCENT,P. et al, Synthesis and biological activities of new (E)-5-alkynyl-2'-deoxyuridines, Nucleosides & Nucleotides, 1985, Vol.4, No.4, p.447-63 特に、 p.449, SCHEMA 1	1, 2 3-10
X A	BALZARINI,J. et al, Incorporation of 5-substituted pyrimidine nucleoside analogs into DNA of a thymidylate synthetase-deficient murine FM3A carcinoma cell line, Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 1985, Vol.7, No.1, p.19-28	1, 2 3-10

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 0 1 0 9 0
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
	特に、 p.22, TABLE 1	
X A	SIM,I.S. et al, 5-Substituted deoxyuridines - structural requirements for antiviral activity against herpes simplex virus types 1 and 2 and possible biochemical basis for relative potency, Antiviral Research, 1984, Vol.4, No.3, p.159-68 特に、 p.163, TABLE 2	1, 2 3-10
X A	CROW,F.W. et al, Fast atom bombardment combined with tandem mass spectrometry for the determination of nucleosides, Analytical Biochemistry, 1984, Vol.139, No.1, p.243-62 特に、 p.248, TABLE 5	1, 2 3-10
X A	CASSIMAN,J.J. et al, Induction of sister-chromatid exchange by 5-substituted 2'-deoxyuridines, Mutation Research, Genetic Toxicology Testing, 1983, Vol.117, No.3-4, p.317-27 特に、 p.320, TABLE 1	1, 2 3-10
X A	GOODCHILD,J. et al, Structural requirements of olefinic 5-substituted deoxyuridines for antiherpes activity, Journal of Medicinal Chemistry, 1983, Vol.26, No.9, p.1252-7 特に、 p.1254, Table I	1, 2 3-10
X A	ROBINS,M.J. et al, Nucleic acid related compounds. 39. Efficient conversion of 5-iodo to 5-alkynyl and derived 5-substituted uracil bases and nucleosides, Journal of Organic Chemistry, 1983, Vol.48, No.11, p.1854-62 特に、 p.1856, 右欄	1, 2 3-10
X A	BALZARINI,J. et al, Structure-function relationship of the antitumor cell activity of pyrimidine and pyridine derivatives, Proc. Int. Round Table Nucleosides, Nucleotides Their Biol. Appl., 4th, 1982, p.275-91 特に、 p.280-281, Table 1	1, 2 3-10
X A	DE CLERCQ, E. et al, Nucleic acid related compounds. 40. Synthesis and biological activities of 5-alkynyluracil nucleosides, Journal of Medicinal Chemistry, 1983, Vol.26, No.5, p.661-6 特に、 p.662, Scheme I	1, 2 3-10
X	SIM,I.S. et al, Possible molecular basis for antiviral activity of	1, 2

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 0 1 0 9 0
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	certain 5-substituted deoxyuridines, <i>Antimicrobial Agents and Chemotherapy</i> , 1983, Vol.23, No.3, p.416-21 特に、Abstract	3 - 1 0
X A	BALZARINI,J. et al, 5-Substituted 2'-deoxyuridines: correlation between inhibition of tumor cell growth and inhibition of thymidine kinase and thymidylate synthetase, <i>Biochemical Pharmacology</i> , 1982, Vol.31, No.22, p.3673-82 特に、p.3678, Table 5	1, 2 3 - 1 0
X A	LARSSON,A. et al, Selectivity of antiherpes compounds on viral and cellular DNA synthesis, <i>International Congress Series</i> , 1982, Vol.571(Herpesvirus): <i>Clin. Pharmaco</i> , p.211-14 特に、p.212, TABLE 1	1, 2 3 - 1 0
X A	VINCENT,P. et al, E-5-alkenyl-2'-deoxyuridines by coupling of alkenyl organozirconiums with 5-iodo-O-3',5'-bis(trimethylsilyl)deoxyuridine, catalyzed by organopalladium complexes, <i>Tetrahedron Letters</i> , 1982, Vol.23, No.1, p.63-4 文献全体	1, 2 3 - 1 0
X A	HAMPTON,A. et al, Species- or isozyme-specific enzyme inhibitors. 5. Differential effects of thymidine substituents on affinity for rat thymidine kinase isozymes, <i>Journal of Medicinal Chemistry</i> , 1982, Vol.25, No.6, p.644-9 特に、p.645, 左欄	1, 2 3 - 1 0
X A	BIGGE,C.F. et al, Palladium(II) catalyzed coupling reactions of polyuridylic acid and uridylyl(3' → 5')uridine with styrene and 3-nitrostyrene, <i>Journal of Carbohydrates, Nucleosides, Nucleotides</i> , 1981, Vol.8, No.4, p.295-313 特に、p.302, SCHEME 2	1, 2 3 - 1 0
X A	STENING,G. et al, Antiherpes activity of [E]-5-(1-propenyl)-2'-deoxyuridine and 5-(1-propenyl)-1-β-D-arabinofuranosyluracil, <i>Antiviral Research</i> , 1981, Vol.1, No.4, p.213-23 特に、p.215,-216	1, 2 3 - 1 0
X A	KULIKOWSKI,T. et al, Pyrimidine arabinofuranosyl nucleosides with 5-substituted long, branched and unsaturated chains: synthesis and antiherpes properties, <i>Nucleic Acids Research</i> ,	1, 2 3 - 1 0

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 0 1 0 9 0
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
	Symposium Series, 1981, No.9, p.103-6 特に、 p.104	
X A	DE CLERCQ, E. et al, Differential inhibition of herpes simplex viruses, type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2), by (E)-5-(2-X-vinyl)-2'-deoxyuridines, Acta Microbiologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1981, Vol.28, No.3, p.307-12 特に、 p.308, Fig.1	1, 2 3-10
X A	US 4267171 A (The Reagents of the University of California) 1981.05.12, 第1欄 (ファミリーなし)	1, 2 3-10
X A	BERGSTROM, D.E. et al, C-5-Substituted pyrimidine nucleosides. 3. Reaction of allylic chlorides, alcohols, and acetates with pyrimidine nucleoside derived organopalladium intermediates, Journal of Organic Chemistry, 1981, Vol.46, No.7, p.1432-41 特に、 p.1434, Table 1	1, 2 3-10
X A	BERGSTROM, D.E. et al, Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine nucleoside antibiotic analogs. Synthesis via organopalladium intermediates derived from 5-mercuritubercidin, Journal of Organic Chemistry, 1981, Vol.46, No.7, p.1423-31 特に、 p.1428, Scheme IV	1, 2 3-10
X A	CHENG, Y. et al, Anti-herpes simplex virus and anti-human cell growth activity of E-5-propenyl-2'-deoxyuridine and the concept of selective protection in antiviral chemotherapy, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1980, Vol.18, No.6, p.957-61 特に、 p.958, TABLE 2	1, 2 3-10
X A	MACHIDA, H. et al, Antiherpesviral activity and inhibitory action on cell growth of 5-alkenyl derivatives of 1-β-D-arabinofuranosyluracil, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1980, Vol.17, No.6, p.1030-1 特に、 p.1031, TABLE 1	1, 2 3-10
X	NAKAYAMA, C. et al, Thymidine phosphorylase. Substrate	1, 2

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 0 1 0 9 0
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	specificity for 5-substituted 2'-deoxyuridines, Journal of Medicinal Chemistry, 1980, Vol.23, No.8, p.962-4 特に、 p.963, Table I	3 - 1 0
X A	BIGGE,C.F. et al, Palladium-catalyzed coupling reactions of uracil nucleosides and nucleotides, Journal of the American Chemical Society, 1980, Vol.102, No.6, p.2033-8 特に、 p.2033, Scheme 1 ^a	1, 2 3 - 1 0
X A	BIGGE,C.F. et al, Synthesis of 5-styryl derivatives of uracil nucleosides and nucleotides, Tetrahedron Letters, 1979, No.19, p.1653-6 特に、 p.19, Table 1	1, 2 3 - 1 0
X A	BERGSTROM,D.E. et al, C-5 substituted pyrimidine nucleosides. 2. Synthesis via olefin coupling to organopalladium intermediates derived from uridine and 2'-deoxyuridine, Journal of the American Chemical Society, 1978, Vol.100, No.26, p.8106-12 特に、 p.8108, Scheme I	1, 2 3 - 1 0
X A	RUTH,J.L. et al, C-5 substituted pyrimidine nucleosides. 1. Synthesis of C-5 allyl, propyl, and propenyl uracil and cytosine nucleosides via organopalladium intermediates, Journal of Organic Chemistry, 1978, Vol.43, No.14, p.2870-6 特に、 p.2871, Scheme I	1, 2 3 - 1 0
P X	OGINO,M. et al, Highly selective detection of 5-methylcytosine using photochemical ligation, Chemical Communications(Cambridge, United Kingdom), 2008.12, No.45, p.5996-5998	1 - 1 0
A	WO 2006/137190 A1 (国立大学法人京都大学) 2006.12.28, (ファミリーなし)	1 - 1 0
A	京井祥哲 等, 光応答性シトシン誘導体を用いた DNA-塩基多型の検出, 日本化学会講演予稿集, 2007.03.12, Vol.87th, No.2, p.1292, 2 J2-50	1 - 1 0
A	荻野雅之 等, DNA 光ライゲーションによる RNA 末端ラベリング, 日本化学会講演予稿集, 2008.03.12, Vol.88th, No.2, p.1527, 3 PA-038	1 - 1 0

フロントページの続き

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
C 0 7 H 19/06 (2006.01)	C 0 7 H 19/06	
C 0 7 H 19/073 (2006.01)	C 0 7 H 19/073	
C 0 7 H 19/10 (2006.01)	C 0 7 H 19/10	
C 0 7 H 19/14 (2006.01)	C 0 7 H 19/14	

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(72) 発明者 藤本 健造

石川県能美市旭台 1 - 1 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科内

(72) 発明者 荻野 雅之

石川県能美市旭台 2 丁目 1 3 番地 J S T イノベーションプラザ石川内

(72) 発明者 田屋 悠太

石川県能美市旭台 1 - 1 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学内

F ターム (参考) 2G045 AA25 DA13 FB02 FB11
 2G054 CA22 CE02 EA03 GA09
 4B024 AA11 CA01 CA20 HA12
 4B063 QA18 QQ42 QR32 QR42 QR56 QR66 QR82 QS03 QS28 QS34
 QS36 QX02
 4C057 BB02 BB05 CC03 DD01 LL11 LL19 LL21 LL26

(注) この公表は、国際事務局 (W I P O) により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願 (日本語実用新案登録出願) の国際公開の効果は、特許法第 1 8 4 条の 1 0 第 1 項 (実用新案法第 4 8 条の 1 3 第 2 項) により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。