

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02010/001640

発行日 平成23年12月15日(2011.12.15)

(43) 国際公開日 平成22年1月7日(2010.1.7)

| (51) Int.Cl. | F I | テーマコード(参考) |
|-----------------------------|------------------|------------|
| C07C 1/32 (2006.01) | C07C 1/32 | 4G169 |
| C07C 41/30 (2006.01) | C07C 41/30 C S P | 4H006 |
| C07C 43/21 (2006.01) | C07C 43/21 | 4H050 |
| C07C 13/24 (2006.01) | C07C 13/24 | |
| C07C 13/18 (2006.01) | C07C 13/18 | |

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 69 頁) 最終頁に続く

| | |
|---|--|
| 出願番号 特願2010-518946 (P2010-518946) | (71) 出願人 504132272 国立大学法人京都大学 京都府京都市左京区吉田本町36番地1 |
| (21) 国際出願番号 PCT/JP2009/054588 | |
| (22) 国際出願日 平成21年3月10日(2009.3.10) | |
| (31) 優先権主張番号 特願2008-174021 (P2008-174021) | (74) 代理人 110000796 特許業務法人三枝国際特許事務所 |
| (32) 優先日 平成20年7月2日(2008.7.2) | |
| (33) 優先権主張国 日本国(JP) | (72) 発明者 中村 正治 京都府宇治市五ヶ庄 国立大学法人京都大学化学研究所内 |
| | (72) 発明者 島山 琢次 京都府宇治市五ヶ庄 国立大学法人京都大学化学研究所内 |
| | (72) 発明者 藤原 優一 京都府宇治市五ヶ庄 国立大学法人京都大学化学研究所内 |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 クロスカップリング反応用触媒、及びこれを用いた芳香族化合物の製造方法


(57) 【要約】

本発明は、ハロゲン化アルキルと芳香族マグネシウム試薬とのクロスカップリング反応により、効率的に収率良くアルキル化された芳香族化合物を製造する方法を提供する。一般式(1)：




[式中、Rは炭化水素基、Ar'はアリール基である。]

で表される芳香族化合物の製造方法であって、鉄化合物及び一般式(4)：



[式中、Qはアリール環から隣接する炭素原子上の2個の水素原子(H)を除いた2価の基であり、Arはアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物からなるクロスカップリング反応用触媒の存在下、一般式(2)：



【特許請求の範囲】

【請求項 1】


一般式 (1) :



[式中、R は置換基を有してもよい炭化水素基であり、該炭化水素基の炭素 - 炭素結合の間に - O - で示される基を有してもよく、Ar' は置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基である。]

で表される芳香族化合物の製造方法であって、鉄化合物及び一般式 (4) :

【化 1】



10

[式中、Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 個の基であり、Ar は同一又は異なって置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物からなるクロスカップリング反应用触媒の存在下、一般式 (2) :

20



[式中、X はハロゲン原子を示し、R は前記に同じ。]

で表される化合物と、一般式 (3) :



[式中、Y はハロゲン原子を示し、Ar' は前記に同じ。]

で表されるマグネシウム試薬を反応させることを特徴とする製造方法。

【請求項 2】


前記鉄化合物が、二価若しくは三価の鉄塩、又はその溶媒和物である請求項 1 に記載の製造方法。

【請求項 3】

30

前記一般式 (4) において、Ar が式 :

【化 2】



[式中、R¹ は同一又は異なって、H、F、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、又はトリアリールシリル基を示し、n₁ は 1 ~ 5 の整数、n₂ は 1 ~ 4 の整数を示す。]


40

で表される基である請求項 1 又は 2 に記載の製造方法。

【請求項 4】

前記一般式 (4) において、Ar が式 :

【化 3】



50

[式中、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は同一又は異なって、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示し、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} の全てが H の場合を除く。]

で表される基である請求項 1 又は 2 に記載の製造方法。

【請求項 5】


前記一般式 (4) の Ar において、 R^{12} が H であり、 R^{11} 及び R^{13} が同一又は異なって $C_1 \sim C_6$ アルキル基、又はトリアルキルシリル基である請求項 4 に記載の製造方法。

【請求項 6】

前記一般式 (4) において、Q が式：

10

【化 4】




で表される 2 個の基である項 1 ~ 5 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 7】

鉄化合物及び一般式 (4) :

【化 5】



20

[式中、Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 個の基であり、Ar は同一又は異なって置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]


で表されるビスホスフィン化合物からなる触媒。

【請求項 8】

30

前記一般式 (4) において、Ar が式：

【化 6】



[式中、 R^1 は同一又は異なって、H、F、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラリール基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、又はトリアリールシリルを示し、 n_1 は 1 ~ 5 の整数、 n_2 は 1 ~ 4 の整数を示す。]


40

で表される基である請求項 7 に記載の触媒。

【請求項 9】

前記一般式 (4) において、Ar が式：

【化 7】



50

[式中、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は同一又は異なって H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示す。但し、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} の全てが H の場合を除く。]

で表される基である請求項 7 に記載の触媒。


【請求項 10】

前記一般式 (4) の Ar において、 R^{12} が H であり、 R^{11} 及び R^{13} が同一又は異なって $C_1 \sim C_6$ アルキル基、又はトリアルキルシリル基である請求項 9 に記載の触媒。

【請求項 11】

前記一般式 (4) において、Q が式：

【化 8】




10

で表される 2 個の基である請求項 7 ~ 10 のいずれかに記載の触媒。

【請求項 12】

一般式 (5) :

【化 9】



20

[式中、 X^1 はハロゲン原子を示す。q は 1、2 又は 3 を示す。r は 1 又は 2 を示す。Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 個の基であり、Ar は同一又は異なって置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

]


で表される錯体。

30

【請求項 13】


一般式 (4a) :

【化 10】



[式中、 Ar^1 は同一又は異なって式：

【化 11】



40

で表される基であり、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は同一又は異なって H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示す。但し、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} の全てが H の場合を除く。ベンゼン環上の R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} のうち 2 つが H であり、かつ残りの 1 つがメチル、エチル又はプロピル基の場合を除く。]


50

で表されるビスホスフィン化合物。

【請求項 1 4】

一般式 (4) :


【化 1 2】



[式中、Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 価の基であり、Ar は同一又は異なって置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物の製造方法であって、一般式 (6) :

【化 1 3】



[式中、X² はハロゲン原子を示し、Q は前記に同じ。]

で表される化合物に、一般式 (7) :




[式中、M は Li 又は式 : Mg Y¹ で示される基であり、Y¹ はハロゲン原子を示す。Ar は前記に同じ。]

で表される金属試薬を反応させることを特徴とする製造方法。

【請求項 1 5】

一般式 (4) 及び (6) において、Q が式 :

【化 1 4】



で示される基である請求項 1 3 に記載の製造方法。

【請求項 1 6】


一般式 (8) :



[式中、R は、置換基を有してもよい炭化水素基であり、該炭化水素基の炭素 - 炭素結合の間に - O - で示される基を有してもよく、Ar'' は、置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基である。]

で表される芳香族化合物の製造方法であって、鉄化合物及び一般式 (4 a) :

【化 1 5】



[式中、Ar¹ は同一又は異なって式 :


10

20

30

40

【化 1 6】




で表される基であり、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は同一又は異なって H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示す。但し、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} の全てが H の場合を除く。]

で表されるビスホスフィン化合物からなるクロスカップリング反应用触媒の存在下、一般式 (2) :



[式中、 X はハロゲン原子を示し、 R は前記に同じ。]

で表される化合物と、一般式 (9) :




[式中、 $Mt1$ は亜鉛 (Zn)、ホウ素 (B) 又はアルミニウム (Al) を示し、 Ar'' は前記に同じ。]

で表される結合を有する有機金属試薬を反応させることを特徴とする製造方法。

【請求項 17】


一般式 (4a) で表されるビスホスフィン化合物が、一般式 (4b) :

【化 1 7】



[式中、 Ar^2 は式 :

【化 1 8】



で表される基であり、 R^{110} 及び R^{130} は同一又は異なって、 $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基、又はトリ ($C_1 \sim C_6$) アルキルシリル基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物である請求項 16 に記載の製造方法。

【請求項 18】

前記鉄化合物が、二価若しくは三価の鉄塩、又はその溶媒和物である請求項 16 又は 17 に記載の製造方法。

【請求項 19】

前記 R^{110} 及び R^{130} が *tert*-ブチル又はトリメチルシリルである請求項 16、17 又は 18 に記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、鉄化合物及びビスホスフィン化合物からなる新規触媒の調製方法、及び該触媒を用いてハロゲン化炭化水素類と芳香族金属試薬とをカップリングさせて芳香族化合物を製造する方法に関する。

【背景技術】

10

20

30

40

50

【 0 0 0 2 】

アルキル化芳香族化合物、特に第二級アルキル基を芳香環上に有する一群の芳香族化合物は、医薬や農薬等の化成品中間体、液晶などの原料として有用であることが知られている。

【 0 0 0 3 】

近年、ハロゲン化アルキルと芳香族金属試薬とをクロスカップリングさせる反応が精力的に研究されてきている。特に、安価であり入手が容易である鉄触媒を用いたクロスカップリング反応について報告がなされている（例えば、非特許文献 1～8、特許文献 1）。

【 0 0 0 4 】

例えば、特許文献 1 及び非特許文献 7 には、塩化鉄 (I I I) 及び N , N , N ' , N ' - テトラメチルエチレンジアミン (T M E D A) の存在下に、ハロゲン化アルキルと芳香族マグネシウム試薬をクロスカップリング反応させる方法が記載されている。しかし、この方法では、基質であるハロゲン化アルキルに対し鉄触媒を 5 モル % 程度と比較的多く必要であることから、コスト面及び反応の効率面で改善の余地があった。また、クロスカップリング化合物に多様な機能性を付与する観点から、芳香環上にフッ素原子を導入することが盛んに行われている。しかし、この方法では、芳香環上にフッ素原子を有する芳香族マグネシウム試薬では、クロスカップリング反応が全く進行しないため、多様な機能性化合物の製造方法としては制約がある。

10

【 0 0 0 5 】

また、非特許文献 8 では、塩化鉄 (I I I) 及び 1 , 2 - ビス (ジフェニルホスフィノ) ベンゼン (D P P B z) の存在下に、ハロゲン化アルキルと芳香族亜鉛試薬をクロスカップリング反応させる方法が記載されている。この方法でも、ハロゲン化アルキルに対し鉄触媒を 3 モル % 程度と比較的多く必要であり、コスト面及び反応の効率面で改善の余地があった。

20

【 0 0 0 6 】

これらの点から、基質の構造に制約がなく多様性のあるクロスカップリング化合物を効率よく製造することができる製造方法が望まれていた。

【特許文献 1】国際公開第 2 0 0 5 / 0 7 5 3 8 4 号パンフレット

【非特許文献 1】Org.Lett., 6, 1297 (2004)

【非特許文献 2】Angew. Chem., Int. Ed., 43, 3955 (2004)

30

【非特許文献 3】J. Org. Chem., 71, 1104 (2006)

【非特許文献 4】Angew. Chem., Int. Ed., 46, 4346 (2007)

【非特許文献 5】Angew. Chem., Int. Ed., 47, 1 (2008)

【非特許文献 6】Synlett, 1794 (2005)

【非特許文献 7】J. Am. Chem. Soc., 126, 3686-3687 (2004)

【非特許文献 8】日本化学会第 8 7 春季年会講演予稿集、1 D 8 - 1 2

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 7 】

本発明は、ハロゲン化アルキルと芳香族金属試薬とのクロスカップリング反応により、効率的に収率良くアルキル化された芳香族化合物を製造する方法を提供することを目的とする。

40

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 8 】

本発明者は、上記の課題に鑑みて鋭意研究を行った結果、塩化鉄 (I I I) 及び 1 , 2 - ビス (ジ (置換されたフェニル) ホスフィノ) ベンゼン等のビスホスフィン化合物の存在下に、ハロゲン化アルキルと芳香族マグネシウム試薬とをクロスカップリング反応に供することにより、上記の課題を解決できることを見出した。かかる知見に基づき、さらに研究を重ねた結果、本発明を完成するに至った。以下、「第 1 の実施態様」と表記する。

【 0 0 0 9 】

50

即ち、本発明は、以下のアルキル化された芳香族化合物の製造方法等を提供する。

【0010】

項1 一般式(1)：




[式中、Rは、置換基を有してもよい炭化水素基であり、該炭化水素基の炭素-炭素結合の間に-O-で示される基を有してもよく、Ar'は、置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基である。]

で表される芳香族化合物の製造方法であって、鉄化合物及び一般式(4)：

【0011】

【化1】



【0012】

[式中、Qは置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の2個の水素原子(H)を除いた2価の基であり、Arは同一又は異なって置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物からなるクロスカップリング反应用触媒の存在下、一般式(2)：



[式中、Xはハロゲン原子を示し、Rは前記に同じ。]

で表される化合物と、一般式(3)：



[式中、Yはハロゲン原子を示し、Ar'は前記に同じ。]

で表されるマグネシウム試薬を反応させることを特徴とする製造方法。

【0013】


項2 前記鉄化合物が、二価若しくは三価の鉄塩、又はその溶媒和物である項1に記載の製造方法。

【0014】

項3 前記一般式(4)において、Arが式：

【0015】

【化2】



【0016】

[式中、R¹は同一又は異なって、H、F、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラールキル基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、又はトリアリールシリル基を示し、n₁は1~5の整数、n₂は1~4の整数を示す。]

で表される基である項1又は2に記載の製造方法。

【0017】

項4 前記一般式(4)において、Arが式：

【0018】


10

20

30

40

【化3】



【0019】

[式中、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は同一又は異なって、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示し、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} の

10

全てがHの場合を除く。]

で表される基である項1又は2に記載の製造方法。

【0020】


項5 前記一般式(4)のArにおいて、 R^{12} がHであり、 R^{11} 及び R^{13} が同一又は異なって $C_1 \sim C_6$ アルキル基、又はトリアルキルシリル基である項4に記載の製造方法。

【0021】

項6 前記一般式(4)において、Qが式：

【0022】

【化4】



20

【0023】


で表される2個の基である項1～5のいずれかに記載の製造方法。

【0024】

項7 鉄化合物及び一般式(4)：

【0025】

【化5】



30

【0026】

[式中、Qは置換基を有してもよいアリール環又はヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の2個の水素原子(H)を除いた2個の基であり、Arは同一又は異なって置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物からなる触媒。


40

【0027】

項8 前記一般式(4)において、Arが式：

【0028】

【化6】



【0029】

[式中、 R^1 は同一又は異なって、H、F、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、ア

50

ラルキル基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリーールシリル基、アルキルジアリーールシリル基、又はトリアリーールシリル基を示し、 n_1 は 1 ~ 5 の整数、 n_2 は 1 ~ 4 の整数を示す。]


で表される基である項 7 に記載の触媒。

【 0 0 3 0 】

項 9 前記一般式 (4) において、 A_r が式 :

【 0 0 3 1 】

【化 7 】



10

【 0 0 3 2 】

[式中、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は同一又は異なって、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示し、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} の全てが H の場合を除く。]

で表される基である項 7 に記載の触媒。

【 0 0 3 3 】

項 10 前記一般式 (4) の A_r において、 R^{12} が H であり、 R^{11} 及び R^{13} が同一又は異なって $C_1 \sim C_6$ アルキル基、又はトリアルキルシリル基である項 9 に記載の触媒。


20

【 0 0 3 4 】

項 11 前記一般式 (4) において、 Q が式 :

【 0 0 3 5 】

【化 8 】



30

【 0 0 3 6 】


で表される 2 価の基である項 7 ~ 10 のいずれかに記載の触媒。

【 0 0 3 7 】

項 12 一般式 (5) :

【 0 0 3 8 】

【化 9 】



40

【 0 0 3 9 】

[式中、 X^1 はハロゲン原子を示す。 q は 1、2 又は 3 を示す。 r は 1 又は 2 を示す。 Q は置換基を有してもよいアリーール環又は置換基を有してもよいヘテロアリーール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 価の基であり、 Ar は同一又は異なって置換基を有してもよいアリーール基又は置換基を有してもよいヘテロアリーール基を示す。]

で表される錯体。


【 0 0 4 0 】

50

項 1 3 一般式 (4 a) :

【 0 0 4 1 】

【 化 1 0 】




【 0 0 4 2 】

[式中、Ar¹ は同一又は異なって式 :

【 0 0 4 3 】

【 化 1 1 】



【 0 0 4 4 】


で表される基であり、R^{1 1}、R^{1 2} 及び R^{1 3} は同一又は異なって H、C₁ ~ C₆ アルキル基、C₁ ~ C₆ アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示す。但し、R^{1 1}、R^{1 2} 及び R^{1 3} の全てが H の場合を除く。ベンゼン環上の R^{1 1}、R^{1 2} 及び R^{1 3} のうち 2 つが H であり、かつ残りの 1 つがメチル、エチル又はプロピル基の場合を除く。]
で表されるビスホスフィン化合物。

【 0 0 4 5 】

項 1 4 一般式 (4) :

【 0 0 4 6 】

【 化 1 2 】




【 0 0 4 7 】

[式中、Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 価の基であり、Ar は同一又は異なって置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物の製造方法であって、一般式 (6) :

【 0 0 4 8 】

【 化 1 3 】



【 0 0 4 9 】

[式中、X² はハロゲン原子を示し、Q は前記に同じ。]

で表される化合物に、一般式 (7) :

Ar - M (7)

[式中、M は Li 又は式 : Mg Y¹ で示される基であり、Y¹ はハロゲン原子を示す。Ar は前記に同じ。]

10

20

30

40

50


で表される金属試薬を反応させることを特徴とする製造方法。

【0050】

項15 一般式(4)及び(6)において、Qが式：

【0051】

【化14】



【0052】

で示される基である項13に記載の製造方法。

10

【0053】

また、本発明は、上記の課題に鑑みて鋭意研究を行った結果、塩化鉄(III)及び1,2-ビス(3,5-ジ tert-ブチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン等の嵩高いビスホスフィン化合物の存在下に、ハロゲン化アルキルと、芳香族亜鉛試薬、芳香族ホウ素試薬又は芳香族アルミニウム試薬とをクロスカップリング反応に供することにより、上記の課題を解決できることを見出した。かかる知見に基づき、さらに研究を重ねた結果、本発明を完成するに至った。以下、「第2の実施態様」と表記する。

【0054】

即ち、本発明は、以下のアルキル化された芳香族化合物の製造方法等を提供する。

20

【0055】

項16 一般式(8)：


$R - Ar''$ (8)

[式中、Rは、置換基を有してもよい炭化水素基であり、該炭化水素基の炭素-炭素結合の間に-O-で示される基を有してもよく、Ar''は、置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基である。]

で表される芳香族化合物の製造方法であって、鉄化合物及び一般式(4a)：

【0056】

【化15】




30

【0057】

[式中、Ar¹は同一又は異なって式：

【0058】

【化16】



40

【0059】

で表される基であり、R¹¹、R¹²及びR¹³は同一又は異なってH、C₁~C₆アルキル基、C₁~C₆アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示す。但し、R¹¹、R¹²及びR¹³の全てがHの場合を除く。]


で表されるビスホスフィン化合物からなるクロスカップリング反应用触媒の存在下、一般式(2)：

$R - X$ (2)

50

[式中、X はハロゲン原子を示し、R は前記に同じ。]

で表される化合物と、一般式 (9) :



[式中、Mt 1 は亜鉛 (Zn)、ホウ素 (B) 又はアルミニウム (Al) を示し、Arⁿ は前記に同じ。]

で表される結合を有する有機金属試薬を反応させることを特徴とする製造方法。


【 0 0 6 0 】

項 1 7 一般式 (4 a) で表されるビスホスフィン化合物が、一般式 (4 b) :

【 0 0 6 1 】

【 化 1 7 】

10




【 0 0 6 2 】

[式中、Ar² は式 :

【 0 0 6 3 】

【 化 1 8 】



20

【 0 0 6 4 】

で表される基を示し、R¹¹⁰ 及び R¹³⁰ は同一又は異なって、C₁ ~ C₆ アルキル基、C₁ ~ C₆ アルコキシ基、又はトリ (C₁ ~ C₆) アルキルシリル基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物である項 1 6 に記載の製造方法。

【 0 0 6 5 】

30

項 1 8 前記鉄化合物が、二価若しくは三価の鉄塩、又はその溶媒和物である項 1 6 又は 1 7 に記載の製造方法。

【 0 0 6 6 】

項 1 9 前記 R¹¹⁰ 及び R¹³⁰ が tert - ブチル又はトリメチルシリルである項 1 6、1 7 又は 1 8 に記載の製造方法。

【 発明の効果 】

【 0 0 6 7 】

本発明の鉄化合物及びビスホスフィン化合物からなる触媒は、ハロゲン化アルキルと芳香族マグネシウム試薬とのクロスカップリング反応を効率的に進行させる。そのため、本発明の触媒はクロスカップリング反用触媒として有用である。この触媒を用いて多様性のあるアルキル化された芳香族化合物 (クロスカップリング化合物) を高収率で得ることができる。有機液晶分子や、有機電子材料、医薬農薬中間体合成上極めて有用な反応である。

40

【 0 0 6 8 】

本発明の触媒のうち、ホスフィン上の置換基が嵩高い基であるビスホスフィン化合物を含む触媒を用いた場合には、より効率的にクロスカップリング反応が進行する。この場合、芳香族マグネシウム試薬だけでなく、芳香族亜鉛試薬、芳香族ホウ素試薬又は芳香族アルミニウム試薬を用いたクロスカップリング反応も極めて効率的に進行する。

【 発明を実施するための最良の形態 】

【 0 0 6 9 】


50

1. 第1の実施態様 (Mg 試薬を用いたクロスカップリング反応)

本発明は、下記式で示される、鉄化合物 (又は鉄触媒) 及び一般式 (4) で表されるビスホスフィン化合物からなるクロスカップリング反应用触媒の存在下、一般式 (2) で表される化合物と、一般式 (3) で表されるマグネシウム試薬を反応させて、一般式 (1) で表される芳香族化合物を製造する方法である。

【0070】

【化19】



10

【0071】

[式中、Rは、置換基を有してもよい炭化水素基であり、該炭化水素基の炭素 - 炭素結合の間に - O - で示される基を有してもよい。Xはハロゲン原子を示す。Ar'は、置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基である。Yはハロゲン原子を示す。Qは置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の2個の水素原子 (H) を除いた2個の基を示す。Arは同一又は異なって置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

20

一般式 (1) 及び (2) で表される化合物において、Rは、置換基を有してもよい炭化水素基であり、該炭化水素基の炭素 - 炭素結合の間に - O - で示される基を有してもよい。

【0072】

該炭化水素基としては、例えば C₁ ~ C₃₀ の炭化水素基が挙げられ、或いは、さらに多くの炭素数を含有する高分子炭化水素基であってもよい。また、飽和若しくは不飽和のいずれであってもよく、非環式、環式、又はそのいずれも含む形態であってもよい。なお、不飽和の炭化水素基の場合、Xと結合する (即ち、クロスカップリング反応により Ar' と結合を形成する) 炭素原子は、sp³ 混成炭素原子であることが好ましい。

30

【0073】

該炭化水素基としては、例えば、C₂ ~ C₃₀ アルキル基、C₃ ~ C₃₀ アルケニル基、C₃ ~ C₃₀ アルキニル基、C₅ ~ C₃₀ アルキルジエニル基、C₇ ~ C₃₀ アラルキル基、C₃ ~ C₃₀ シクロアルキル基、C₃ ~ C₃₀ シクロアルケニル基、(C₃ ~ C₁₅ シクロアルキル) C₁ ~ C₁₅ アルキル基などが含まれる。

【0074】

Rで示される「C₂ ~ C₃₀ アルキル基」は、C₂ ~ C₁₅ アルキル基が好ましく、C₄ ~ C₁₂ アルキル基が更に好ましい。アルキル基の例としては、エチル、プロピル、イソプロピル、n-ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、イソブチル、ペンチル、ネオペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、ドデシル、オクタデシル等を挙げることができる。

40

【0075】

Rで示される「C₃ ~ C₃₀ アルケニル基」は、C₃ ~ C₁₅ アルケニル基が好ましく、C₄ ~ C₁₀ アルケニル基が更に好ましい。アルケニル基の例としては、2-プロペニル、2-メチル-2-プロペニル、2-メチルアリル、2-ブテニル、3-ブテニル、4-ペンテニル等を挙げることができる。

【0076】

Rで示される「C₃ ~ C₃₀ アルキニル基」は、C₃ ~ C₁₅ アルキニル基が好ましく、C₄ ~ C₁₀ アルキニル基が更に好ましい。アルキニル基の例としては、3-ブチニル

50

、4 - ペンチニル等を挙げるができる。

【0077】

Rで示される「 $C_5 \sim C_{30}$ アルキルジエニル基」は、 $C_5 \sim C_{15}$ アルキルジエニル基が好ましく、 $C_6 \sim C_{10}$ アルキルジエニル基が更に好ましい。アルキルジエニル基の例としては、3, 5 - ヘキサジエニル、シクロペンタジエニル等を挙げるができる。

【0078】

Rで示される「 $C_7 \sim C_{30}$ アラルキル基」は、 $C_7 \sim C_{12}$ アラルキル基が好ましい。アラルキル基の例としては、ベンジル、フェネチル、ジフェニルメチル、トリフェニルメチル、1 - ナフチルメチル、2 - ナフチルメチル、2, 2 - ジフェニルエチル、3 - フェニルプロピル、4 - フェニルブチル、5 - フェニルペンチル、1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフチル等を挙げるができるが、例えば、2, 2 - ジフェニルエチル、3 - フェニルプロピル、4 - フェニルブチル、5 - フェニルペンチルであることが好ましい。

10

【0079】

Rで示される「 $C_3 \sim C_{30}$ シクロアルキル基」は、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル基が好ましい。シクロアルキル基の例としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、ボルニル、ノルボルニル、アダマンチル、ノルアダマンチル、ノルピニル、デカヒドロナフチル等を挙げるができる。

【0080】

Rで示される「 $C_3 \sim C_{30}$ シクロアルケニル基」は、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルケニル基が好ましい。シクロアルケニル基の例としては、シクロプロペニル、シクロブテニル、シクロペンテニル、シクロヘキセニル、ノルボルネニル、ノルボルナジエニル等を挙げるができる。

20

【0081】

Rで示される「($C_3 \sim C_{15}$ シクロアルキル) $C_1 \sim C_{15}$ アルキル基」は、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル) $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基が好ましい。その具体例としては、(シクロプロピル) $C_1 \sim C_3$ アルキル、(シクロブチル) $C_1 \sim C_3$ アルキル、(シクロペンチル) $C_1 \sim C_3$ アルキル、(シクロヘキシル) $C_1 \sim C_3$ アルキル、(シクロヘプチル) $C_1 \sim C_3$ アルキル、(アダマンチル) $C_1 \sim C_3$ アルキル等を挙げるができる。

【0082】

さらに、上記したRで示される炭化水素基の炭素 - 炭素結合の間に - O - で示される基を有してもよい。即ち、Rで示される炭化水素基は、1又は2以上のエーテル結合を含有していてもよい。

30

【0083】

Rで示される炭化水素基には置換基を有していてもよい。この置換基としては、クロスカップリング反応に悪影響を与えない基であれば特に限定はない。例えば、ハロゲン原子(例えば、F、Cl、Br等であり、特にFである)、アルコキシ基(例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等の $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基等)、アリール基(例えば、フェニル、トルイル、ナフチル、ビフェニル、ターフェニル基等の $C_6 \sim C_{20}$ の単環又は多環のアリール基等)、ヘテロアリール基(例えば、チエニル基、フリル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、インドリル基、キノリル基、イソキノリル基等の $C_6 \sim C_{20}$ の単環又は多環のヘテロアリール基等)、アリールオキシ基(例えば、式： $(\text{上記のアリール基}) - O -$ で示される基等)、アラルキルオキシ基(例えば、ベンジルオキシ基等)、エステル基(例えば、式： $-C(=O)OR^2$ で示される基であり、 R^2 は $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基等)、ジアルキルアミド基(例えば、式： $-C(=O)N(R^3)_2$ で示される基が挙げられ、 R^3 は $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基等)、保護されていてもよい水酸基(例えば、式： $-OR^4$ で示される基であり、 R^4 はH、アルキルカルボニル基、アルコキシカルボニル基、アラルキル基、トリアルキルシリル基等)、トリアルキルシリル基(例えば、トリメチルシリル、ジメチルtert - ブチルシリル、トリエチルシリル等)、アセタール基(例えば、

40

50

式： $-CR^5(OR^6)(OR^7)$ で示される基であり、 R^5 は水素原子又は置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 R^6 及び R^7 は同一または異なってアルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等）であり、互いに架橋して2価のアルキレン基を形成していてもよい。 R^6 及び R^7 の例としては、メチル基、エチル基等が挙げられ、互いに架橋している場合には、エチレン基、トリメチレン基等が挙げられる）等が挙げられる。

【0084】

上記の置換基は、該炭化水素基の置換可能な位置に1個以上有していてもよく、例えば、1個～4個、更に1～3個有していてもよい。置換基数が2個以上の場合、各置換基は同一であっても異なってもよい。

10

【0085】

一般式(2)で表される化合物において、 X はハロゲン原子を示す。具体的には、 Cl 、 Br 、 I 等であり、好ましくは Br である。

【0086】

一般式(1)及び(3)で表される化合物において、 Ar' は置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基である。

【0087】

Ar' で示される置換基を有していてもよいアリール基におけるアリール基としては、例えば、1～5環性のアリール基が挙げられる。具体的には、フェニル基、トルイル基、ナフチル基、アンズリル基、フェナンスリル基、フルオレニル基、テトラセニル、ペンタセニル等が例示される。

20

【0088】

Ar' で示される置換されていてもよいヘテロアリール基におけるヘテロアリール基としては、例えば、1～4環性の酸素、窒素及び硫黄から選ばれる少なくとも1種のヘテロ原子を環に有するヘテロアリール基が挙げられ、具体的には、チエニル基、フリル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、ピリジリル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、インドリル基、キノリル基、イソキノリル基等が例示される。

【0089】

上記アリール基又はヘテロアリール基は置換されていてもよく、該置換基としては本発明のクロスカップリング反応に悪影響を与えないものであれば特に限定はない。

30

【0090】

この置換基としては、例えば、ハロゲン原子（例えば、 F 、 Cl 、 Br 等であり、特に F である）、アルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等の $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基等）、アリール基（例えば、フェニル、トルイル、ナフチル、ピフェニル、ターフェニル基等の $C_6 \sim C_{20}$ の単環又は多環のアリール基等）、アリールオキシ基（例えば、式： $(\text{上記のアリール基})-O-$ で示される基等）、アラルキルオキシ基（例えば、ベンジルオキシ基等）、エステル基（例えば、式： $-C(=O)OR^{20}$ で示される基であり、 R^{20} は $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基等）、ジアルキルアミド基（例えば、式： $-C(=O)N(R^{30})_2$ で示される基であり、 R^{30} が $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基等）、保護されていてもよい水酸基（例えば、式： $-OR^{40}$ で示される基であり、 R^{40} は H 、アルキルカルボニル基、アルコキシカルボニル基、アラルキル基、トリアルキルシリル基等）、トリアルキルシリル基（例えば、トリメチルシリル、ジメチル*tert*-ブチルシリル、トリエチルシリル等）、アセタール基（例えば、式： $-CR^{50}(OR^{60})(OR^{70})$ で示される基であり、 R^{50} は水素原子又は置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 R^{60} 及び R^{70} は同一または異なって、アルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等）であり、互いに架橋して2価のアルキレン基を形成していてもよい。 R^{60} 及び R^{70} の例としては、メチル基、エチル基等が挙げられ、互いに架橋している場合には、エチレン基、トリメチレン基等が挙げられる）等が挙

40

50

げられる。

【0091】

上記の置換基は、該アリアル基又はヘテロアリアル基の置換可能な位置に1個以上有していてもよく、例えば、1個～4個、更に1～3個有していてもよい。置換基数が2個以上の場合、各置換基は同一であっても異なってもよい。

【0092】

一般式(3)で表される化合物において、Yはハロゲン原子を示す。具体的には、F、Cl、Br、I等であり、好ましくはCl、Br又はIであり、特にBrである。

【0093】

鉄化合物としては、二価又は三価の鉄塩又は鉄錯体であり、好ましくは三価の鉄塩である。この鉄塩又は鉄錯体は溶媒和物(例えば水和物)であってもよい。具体的には、ハロゲン化鉄(II)(FeX^1_2 ; X^1 はハロゲン原子、特にCl)、ハロゲン化鉄(III)(FeX^1_3 ; X^1 はハロゲン原子、特にCl)、又はそれらの水和物が好ましく、特に、塩化鉄(III)($FeCl_3$)、塩化鉄(III)・6水和物($FeCl_3 \cdot 6H_2O$)、塩化鉄(II)($FeCl_2 \cdot 4$ 水和物($FeCl_2 \cdot 4H_2O$))等が好ましい。

10

【0094】

一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物は、鉄化合物の配位子として作用し、クロスカップリング反応を促進する。一般式(4)において、Qは置換基を有してもよいアリアル環又は置換基を有してもよいヘテロアリアル環から隣接する炭素原子上の2個の水素原子(H)を除いた2価の基である。


20

【0095】

該アリアル環としては、例えば、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナントレン等の $C_6 \sim C_{20}$ の単環又は多環のアリアル環が挙げられる。該アリアル環から隣接する炭素原子上の2個の水素原子(H)を除いた2価の基としては、例えば、式：

【0096】

【化20】



30

【0097】

で表される基等が挙げられる。


【0098】

該ヘテロアリアル環としては、例えば、チオフェン、フラン、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、インドール、キノリン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン等の $C_4 \sim C_{20}$ のN、O及びSから選ばれるヘテロ原子を有する単環又は多環のヘテロアリアル基が挙げられる。該ヘテロアリアル環から隣接する炭素原子上の2個の水素原子(H)を除いた2価の基としては、例えば、式：

40

【0099】

【化 2 1】



【0100】

で表される基等が挙げられる。

10

【0101】

該アリール環及びヘテロアリール環上には、置換基を有していてもよく、例えば、アルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル等の $C_1 \sim C_6$ アルキル基等）、アルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等の $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基等）等が挙げられる。これらの置換基は該アリール環及びヘテロアリール環上に 1 ~ 3 個有していてもよい。


【0102】

このうち、好ましくはオルトフェニレン基、即ち、式：

【0103】

20

【化 2 2】



【0104】

で表される基である。

【0105】

一般式 (4) で表されるビスホスフィン化合物において、Ar は同一又は異なって置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。

30

【0106】

Ar で示される置換基を有してもよいアリール基における「アリール基」としては、例えば、フェニル基、トルイル基、ナフチル基、アンスリル基、フェナンスリル基、フルオレニル基等の 1 ~ 4 環性のアリール基が例示される。好ましくはフェニル基である。

【0107】

Ar で示される置換基を有してもよいヘテロアリール基における「ヘテロアリール基」としては、例えば、チオフェン、フラン、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、インドール、キノリン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン等の $C_4 \sim C_{20}$ の N、O 及び S から選ばれるヘテロ原子を有する単環又は多環（特に 1 又は 2 環性）のヘテロアリール基が例示される。好ましくはピリジル基であり、特に 4 - ピリジル基である。

40

【0108】

上記アリール基又はヘテロアリール基は、置換可能な位置に置換基を有していてもよい。この置換基としては、例えば、ハロゲン原子（例えば、F、Cl、Br 等であり、特に F である）、アルキル基（例えば、メチル、エチル、n - プロピル、イソプロピル、tert - ブチル等の $C_1 \sim C_6$ アルキル基等）、アルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等の $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基等）、アリール基（例えば、フェニル、トルイル、2, 6 - ジメチルフェニル、ナフチル等の $C_6 \sim C_{20}$ の単環又は多環のアリール基等）、アラルキル基（例えば、ベンジル、フェネチル等）、アリールオキシ基（例えば、式：（上記のアリール基） - O - で示される基等）、アラルキルオキシ基（

50

例えば、ベンジルオキシ基等)、トリアルキシルシリル基(例えば、トリメチルシリル、ジメチル *tert*-ブチルシリル、トリエチルシリル等)、ジアルキルアリールシリル基(例えば、ジメチルフェニルシリル基等)、アルキルジアリールシリル基(例えば、*tert*-ブチルジフェニルシリル基等)、トリアリールシリル基(例えば、トリフェニルシリル基等)等が挙げられる。

【0109】

好ましい置換基としては、メチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、*tert*-ブチル等の $C_1 \sim C_6$ アルキル基；メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等の $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基；フェニル、トルイル、2,6-ジメチルフェニル、ナフチル等の $C_6 \sim C_{20}$ の単環又は多環のアリール基；トリメチルシリル、ジメチル *tert*-ブチルシリル、トリエチルシリル等のトリアルキル(特に、トリ $C_1 \sim C_6$ アルキル)シリル基等である。

10

【0110】

上記の置換基は、該アリール基又は又はヘテロアリール基の置換可能な位置に1個以上有していてもよく、例えば、1個~4個、更に1~3個有していてもよい。置換基数が2個以上の場合、各置換基は同一であっても異なってもよい。


【0111】

一般式(4)で表される化合物において、好ましいArとして、式：

【0112】

【化23】

20



【0113】

[式中、 R^1 は同一又は異なって、H、F、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラキル基、トリアルキシルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、又はトリアリールシリル基を示し、 n_1 は1~5の整数、 n_2 は1~4の整数を示す。]

で表される基が挙げられる。 R^1 で示される各置換基の具体例は、上記列挙した中から選択することができる。好ましい R^1 で示される置換基としては、メチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、*tert*-ブチル等の $C_1 \sim C_6$ アルキル基；メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等の $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基；フェニル、トルイル、2,6-ジメチルフェニル、ナフチル等の $C_6 \sim C_{20}$ の単環又は多環のアリール基；トリメチルシリル、ジメチル *tert*-ブチルシリル、トリエチルシリル等のトリアルキル(特に、トリ $C_1 \sim C_6$ アルキルシリル基等である。 n_1 が2~5の整数又は n_2 が2~4の整数の時、 R^1 は同一又は異なってもよい。特に、 $n_1 = 2$ 又は $n_2 = 2$ であり、 R^1 が $C_1 \sim C_6$ アルキル基(特に、*tert*-ブチル、イソプロピル)、トリ $C_1 \sim C_6$ アルキルシリル基(特に、トリメチルシリル)が好適である。また、 $n_1 = 1$ であり、 R^1 が $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基が好適である。 n_1 は1~3の整数が好ましく、1又は2がより好ましい。 n_2 は1~3の整数が好ましく、2がより好ましい。

30


40

【0114】

より好ましいArとしては、式：

【0115】

【化24】



【0116】

[式中、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は同一又は異なって、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示す。但し、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} の全てが H の場合を除く。]

10

で表される基が挙げられる。 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} で示される各置換基の具体例は、上記列挙した中から選択することができる。好ましい R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} で示される置換基としては、メチル、エチル、 n -プロピル、イソプロピル、*tert*-ブチル等の $C_1 \sim C_6$ アルキル基；メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等の $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基；トリメチルシリル、ジメチル*tert*-ブチルシリル、トリエチルシリル等のトリアルキル（特に、トリ $C_1 \sim C_6$ アルキル）シリル基等である。特に好ましくは、 R^{12} が H であり、 R^{11} 及び R^{13} が $C_1 \sim C_6$ アルキル基（特に、*tert*-ブチル）又はトリ $C_1 \sim C_6$ アルキルシリル基（特に、トリメチルシリル）である。また、 R^{12} が $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基であり、 R^{11} 及び R^{13} が H である。


20

【0117】

他のより好ましい Ar としては、式：

【0118】

【化25】



30

【0119】

[式中、 R^{110} 及び R^{130} は同一又は異なって、 $C_3 \sim C_6$ アルキル基、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基、又はトリ($C_1 \sim C_6$)アルキルシリル基を示す。]

で表される基が挙げられる。

【0120】

$C_3 \sim C_6$ アルキル基としては、 n -プロピル、イソプロピル、*tert*-ブチル等が挙げられ、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基としては、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等が挙げられ、トリ($C_1 \sim C_6$)アルキルシリル基としては、トリメチルシリル、トリエチルシリル等が挙げられる。 R^{110} 及び R^{130} として好ましくは、*tert*-ブチル又はトリメチルシリルである。


40

【0121】

さらに好ましい Ar としては、

【0122】

【化26】




【0123】

[式中、Zは -CH= 又は -N= を示す。好適にはZは -CH= である。]
で表される基が挙げられる。特に好ましいArとしては、

10

【0124】

【化27】



20

【0125】


である。

【0126】

一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物のうち、好ましいものとして、一般式(4a)：

【0127】

【化28】




30

【0128】

[式中、Ar¹は同一又は異なって式：

【0129】

【化29】



40

【0130】

で表される基を示し、R¹¹、R¹²及びR¹³は前記に同じ。]

で表されるビスホスフィン化合物が挙げられる。一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物は、リン原子上に嵩高い置換フェニル基を有するため、クロスカップリング反応の促進効果が高い。


【0131】

一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物のうち、より好ましいものとして、一般式(4b)：

50

【 0 1 3 2 】

【 化 3 0 】




【 0 1 3 3 】

[式中、Ar² は式 :

【 0 1 3 4 】

【 化 3 1 】



10

【 0 1 3 5 】

で表される基を示し、R¹¹⁰ 及び R¹³⁰ は前記に同じ。]

20

で表される化合物が挙げられる。上記の一般式(4b)で表されるビスホスフィン化合物は、リン原子上に、2つのメタ位に嵩高い基を有するフェニル基を有するため、クロスカップリング反応の促進効果が極めて高い。そのため、より少ない触媒量でもクロスカップリング反応が進行し、非常に高い収率でクロスカップリング化合物を得ることができる。

【 0 1 3 6 】

本発明の製造方法では、鉄化合物及び一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物からなる触媒(クロスカップリング反应用触媒)の存在下、一般式(2)で表される化合物と、一般式(3)で表されるマグネシウム試薬を反応させて、一般式(1)で表される芳香族化合物を製造する。

【 0 1 3 7 】

反応溶媒は、本発明の反応に悪影響を及ぼさない溶媒であれば特に限定はなく、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、tert-ブチルメチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル、テトラヒドロフラン(THF)、1,4-ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル系溶媒；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒；ペンタン、ヘキサン等の脂肪族炭化水素系溶媒；又はこれらの混合溶媒が挙げられる。好ましくは、テトラヒドロフランである。

30

【 0 1 3 8 】

本反応では、一般式(2)で表される化合物の濃度は、上記反応溶媒中において、通常0.1~2.0モル/L、好ましくは0.2~1.5モル/L、より好ましくは0.5~1.0モル/L程度に調整することができる。

40

【 0 1 3 9 】

一般式(3)で表されるマグネシウム試薬の使用量は、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、通常1~3モル、好ましくは1~2モル、より好ましくは1.1~1.5モルである。本発明の方法では、一般式(3)で表されるマグネシウム試薬の使用量を、一般式(2)で表される化合物に対して量論量でよいため効率的である。これは、非特許文献8に示されるような亜鉛試薬を用いた場合のように、クロスカップリング反応に關与する芳香族基が1当量分だけ無駄になる方法と比べて有利である。

【 0 1 4 0 】

鉄化合物の使用量は、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、0.1~5モル%、好ましくは0.1~3モル%、より好ましくは0.5~3モル%である。

50

【0141】

一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物の使用量は、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、通常0.1~10モル%、好ましくは0.2~6モル%、より好ましくは0.5~3モル%である。鉄化合物と一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物のモル比率は、通常、1:1~1:3、好ましくは1:1~1:2の範囲から選択することができる。かかる範囲であると、クロスカップリング反応が収率よく進行し、副生物を抑制することができる。

【0142】

特に、後述する一般式(4b)で表される嵩高いビスホスフィン化合物を配位子として使用する場合には、クロスカップリング反応が大きく促進される。そのため、鉄化合物及びビスホスフィン化合物の使用量をより少なくすることができる。例えば、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、鉄化合物を0.1~5.0モル%、好ましくは0.5~3モル%、ビスホスフィン化合物を0.1~10.0モル%、好ましくは0.5~6モル%で十分である。

10

【0143】

本発明の製造方法における典型的な反応操作としては、鉄化合物及び一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物からなる触媒(クロスカップリング反应用触媒)と一般式(2)で表される化合物を含む溶液に、一般式(3)で表されるマグネシウム試薬を添加(特に、ゆっくり滴下)する方法が好ましい。

【0144】

上記のクロスカップリング反应用触媒は、反応系中で、鉄化合物と一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物を混合することにより調製され、特に単離する必要はない。

20


【0145】

或いは、鉄化合物と一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物を反応して、一旦錯体(クロスカップリング反应用触媒)を形成しさらに単離して、これをクロスカップリング反応に供してもよい。なお、該錯体(クロスカップリング反应用触媒)は、通常、溶媒(例えば、エタノール等のアルコール系溶媒等)中、30~80にて、鉄化合物と一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物を、例えば1:1~1:2のモル比で反応させて製造することができる。典型例として、ハロゲン化鉄と一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物から、一般式(5)で表されるクロスカップリング反应用触媒を製造するスキームを下記に示す。

30

【0146】

【化32】



40

【0147】

[式中、 X^1 はハロゲン原子、特にClを示す。pは2又は3であり、特に2を示す。qは1、2又は3であり、特に2を示す。rは1又は2であり、特に1である。Q及びArは前記に同じ。]

【0148】

典型的な錯体(クロスカップリング反应用触媒)として、 $\text{FeCl}_1 \cdot \text{L}$ 、 $\text{FeCl}_2 \cdot \text{L}$ 、 $\text{FeCl}_2 \cdot \text{L}_2$ 、又は $\text{FeCl}_3 \cdot \text{L}$ (式中、Lは一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物を示す。)等が挙げられ、好適には、 $\text{FeCl}_2 \cdot \text{L}$ である。

【0149】

単離した錯体(クロスカップリング反应用触媒)を用いてクロスカップリング反応する

50

場合、該錯体の使用量は、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、通常0.1~5モル%、好ましくは0.1~3モル%、より好ましくは0.5~3モル%とすればよい。該錯体のみでも反応は好適に進行するが、さらに、必要に応じて、一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物を添加してもよい。これにより、オレフィン体等の副生物を抑制することができる場合がある。この場合も、上記したように、反応系中における、鉄化合物と一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物のモル比率が、通常、1:1~1:3、好ましくは1:1~1:2の範囲になるように、一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物の添加量を調整すればよい。

【0150】

一般式(3)で表されるマグネシウム試薬は、対応する一般式(3'):



[式中、Ar'及びYは前記に同じ。]

で表される化合物とマグネシウム(Mg)から、公知の方法(例えば、実験化学講座第5版, 18巻, 59~76ページ等を参照)により調製される。溶媒としては、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、tert-ブチルメチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル、テトラヒドロフラン(THF)、1,4-ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル系溶媒;ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒;又はこれらの混合溶媒等が用いられる。好ましくは、テトラヒドロフラン(THF)である。該マグネシウム試薬の溶液の濃度は、通常0.5~1.5モル/L程度であればよい。

【0151】

本発明では、一般式(3)で表されるマグネシウム試薬同士のホモカップリングやオレフィン等の副生物を抑制して、目的とする一般式(1)で表されるクロスカップリング反応物の収率を向上させるため、クロスカップリング反应用触媒と一般式(2)で表される化合物を含む溶液に、一般式(3)で表されるマグネシウム試薬をゆっくり滴下する方法が好適である。滴下の速度は、反応のスケールにもよるが、例えば、反応系中式(2)で表される化合物の量が100~1000mmol程度の場合には、一般式(3)で表されるマグネシウム試薬の溶液を0.5~50mmol/分程度の速度で加えるのが好ましく、上記式(2)で示される化合物の量が1~100mmol程度の場合には、一般式(3)で表されるマグネシウム試薬の溶液を0.005~5mmol/分程度で加えるのが好ましい。

【0152】

反応は通常、無水の条件下、かつ不活性ガス(例えば、アルゴン、窒素等)雰囲気下で行うことが好ましい。反応温度は、通常-10~80であり、好ましくは0~60、より好ましくは20~60である。反応圧力は特に限定はなく、典型的には常圧である。

【0153】

上記のようにして反応させた後、反応液をプロトン性溶媒(例えば、水、塩化アンモニウム水溶液、希塩酸等)でクエンチして抽出し、必要に応じてカラムクロマトグラフィー、蒸留、再結晶、トリチュレーション等の精製操作を経て目的とする一般式(1)で表される化合物を得る。

【0154】

2. 第2の実施態様(Zn、B又はAl試薬を用いたクロスカップリング反応)

本発明は、下記式で示される、鉄化合物及び一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物からなるクロスカップリング反应用触媒の存在下、一般式(2)で表される化合物と、一般式(9)で表される結合を有する有機金属試薬を反応させて、一般式(8)で表される芳香族化合物を製造する方法である。

【0155】


10

20

30

40

【化 3 3】



【0156】

10

[式中、Ar"は、置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基である。Mtlは亜鉛(Zn)、ホウ素(B)又はアルミニウム(Al)を示す。R、X及びAr¹は前記に同じ。]

一般式(2)及び(8)で表される化合物において、Rは置換基を有してもよい炭化水素基であり、該炭化水素基の炭素-炭素結合の間に-O-で示される基を有してもよい。Xはハロゲン原子を示す。即ち、R及びXは、前記「1.第1の実施態様」において示したR及びXと同義である。

【0157】

一般式(8)及び(9)で表される化合物において、Ar"は置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基である。即ち、Ar"は、前記「1.第1の実施態様」において示したAr'と同義である。

20

【0158】

一般式(9)で表される有機金属試薬としては、有機亜鉛試薬、有機ホウ素試薬、又は有機アルミニウム試薬が挙げられる。具体的な試薬としては、次のようなものが例示される。


【0159】

有機亜鉛試薬としては、例えば、Ar"-Zn結合を有する試薬であれば特に限定はない。例えば、下記のような試薬を選択できる。

【0160】



30



[式中、X'はハロゲン原子を示し、2つのX'を含む場合X'は同一または異なってもよい。Ar"は前記に同じであり、2つのAr"を含む場合Ar"は同一または異なってもよい。]

【0161】

これらの試薬は、例えば、1) M. Schlosser ed. "Organometallics in Synthesis, A Manual" second edition, Wiley, Weinheim, 2002、2) P. Knochel, P. Jones, Organozinc Reagents, Oxford University Press, New York, 1999、3) E. Erdik, Organozinc Reagents in Organic Synthesis, CRC Press, New York, 1996等の記載に準じて容易に調製することができる。


40

【0162】


有機ホウ素試薬としては、例えば、Ar"-B結合を有する試薬であれば特に限定はない。例えば、下記のような試薬を選択できる。

【0163】

【化34】



【0164】



[式中、 R^8 は $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 k は1、2又は3を示し、 Ar'' は前記に同じ。]


10

これらの試薬は、例えば、M. Schlosser ed. "Organometallics in Synthesis, A Manual" second edition, Wiley, Weinheim, 2002等の記載に準じて容易に調製することができる。

【0165】

有機アルミニウム試薬としては、例えば、 $Ar'' - Al$ 結合を有する試薬であれば特に限定はない。例えば、下記のような試薬を選択できる。

【0166】



[式中、 R^9 は $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 X' はハロゲン原子、 m は1、2又は3を示し、 Ar'' は前記に同じ。]

20

【0167】

これらの試薬は、例えば、M. Schlosser ed. "Organometallics in Synthesis, A Manual" second edition, Wiley, Weinheim, 2002等の記載に準じて容易に調製することができる。

【0168】

鉄化合物としては、二価又は三価の鉄塩又は鉄錯体であり、好ましくは三価の鉄塩である。この鉄塩又は鉄錯体は溶媒和物(例えば水和物)であってもよい。具体的には、ハロゲン化鉄(II)(FeX^1_2 ; X^1 はハロゲン原子、特にCl)、ハロゲン化鉄(III)(FeX^1_3 ; X^1 はハロゲン原子、特にCl)、又はそれらの水和物が好ましく、特に、塩化鉄(III)($FeCl_3$)、塩化鉄(III)・6水和物($FeCl_3 \cdot 6H_2O$)、塩化鉄(II)($FeCl_2 \cdot 4$ 水和物($FeCl_2 \cdot 4H_2O$))等が好ましい。

30

【0169】

一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物として、好適には一般式(4b)で表されるビスホスフィン化合物が挙げられる。2つのメタ位に嵩高い基が存在するため、クロスカップリング反応の促進効果が極めて高い。例えば、一般式(4b)で表される化合物を用いたクロスカップリング反応では、1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)ベンゼンを用いた場合と比べて反応収率が極めて高い。例えば、実施例5、6、10、11及び12を参照。

40

【0170】

本発明の製造方法では、鉄化合物及び一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物からなる触媒(クロスカップリング反应用触媒)の存在下、一般式(2)で表される化合物と、一般式(9)で表される結合を有する有機金属試薬を反応させて、一般式(8)で表される芳香族化合物を製造する。

【0171】

一般式(9)で表される結合を有する有機金属試薬として、有機亜鉛試薬、有機ホウ素試薬、又は有機アルミニウム試薬を用いる場合の具体的なカップリング反応を記載する。

【0172】

有機亜鉛試薬を用いたカップリング反応の典型例を以下に示す。鉄化合物及び一般式(

50

4 a) で表されるビスホスフィン化合物からなる触媒(クロスカップリング反应用触媒)の存在下、一般式(2)で表される化合物と、上記した種々の公知の方法で調整される有機亜鉛試薬を反応させて、一般式(8)で表される芳香族化合物を製造する。

【0173】

反応溶媒は、本発明の反応に悪影響を及ぼさない溶媒であれば特に限定はなく、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、tert-ブチルメチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル、テトラヒドロフラン(THF)、1,4-ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル系溶媒；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒；ペンタン、ヘキサン等の脂肪族炭化水素系溶媒；又はこれらの混合溶媒が挙げられる。好ましくは、テトラヒドロフランである。

10

【0174】

本反応では、一般式(2)で表される化合物の濃度は、上記反応溶媒中において、通常0.1~2.0モル/L、好ましくは0.2~1.5モル/L、より好ましくは0.5~1.0モル/L程度に調整することができる。

【0175】

有機亜鉛試薬の使用量は、亜鉛原子のモル数換算で、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、通常1~3モル、好ましくは1~2モル、より好ましくは1.1~1.5モルである。

【0176】

鉄化合物の使用量は、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、0.1~5モル%、好ましくは0.1~3モル%、より好ましくは0.5~3モル%である。

20

【0177】

一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物の使用量は、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、通常0.1~10モル%、好ましくは0.2~6モル%、より好ましくは0.5~3モル%である。鉄化合物と一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物のモル比率は、通常、1:1~1:3、好ましくは1:1~1:2の範囲から選択することができる。

【0178】

本発明の製造方法における典型的な反応操作としては、有機亜鉛試薬に、一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物、鉄化合物、及び一般式(2)で表される化合物を添加する方法が好ましい。

30

【0179】

上記のクロスカップリング反应用触媒は、反応系中で、鉄化合物と一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物から調製される。或いは、あらかじめ両者の錯体を形成してから反応に供してもよい。例えば、一般式(5)で表される錯体が挙げられる。

【0180】

反応は通常、無水の条件下、かつ不活性ガス(例えば、アルゴン、窒素等)雰囲気下で行うことが好ましい。反応温度は、通常-10~80であり、好ましくは0~60、より好ましくは20~60である。反応圧力は特に限定はなく、典型的には常圧である。

40

【0181】

上記のようにして反応させた後、反応液をプロトン性溶媒(例えば、水、塩化アンモニウム水溶液、希塩酸等)でクエンチして抽出し、必要に応じてカラムクロマトグラフィー、蒸留、再結晶、トリチュレーション等の精製操作を経て目的とする一般式(8)で表される化合物を得る。

【0182】

有機ホウ素試薬を用いたカップリング反応の典型例を以下に示す。鉄化合物及び一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物からなる触媒(クロスカップリング反应用触媒)の存在下、一般式(2)で表される化合物と、上記した種々の公知の方法で調整される有機ホウ素試薬(必要に応じ活性化して得られる有機ホウ素アート錯体)を反応させて、

50

一般式(8)で表される芳香族化合物を製造する。

【0183】

反応溶媒は、本発明の反応に悪影響を及ぼさない溶媒であれば特に限定はなく、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、tert-ブチルメチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル、テトラヒドロフラン(THF)、1,4-ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル系溶媒；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒；ペンタン、ヘキサン等の脂肪族炭化水素系溶媒；又はこれらの混合溶媒が挙げられる。好ましくは、テトラヒドロフランである。

【0184】

本反応では、一般式(2)で表される化合物の濃度は、上記反応溶媒中において、通常0.1~2.0モル/L、好ましくは0.2~1.5モル/L、より好ましくは0.5~1.0モル/L程度に調整することができる。

10

【0185】

有機ホウ素試薬の使用量は、ホウ素原子のモル数換算で、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、通常1~3モル、好ましくは1~2モル、より好ましくは1.1~1.5モルである。

【0186】

鉄化合物の使用量は、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、0.1~5モル%、好ましくは0.1~3モル%、より好ましくは0.5~3モル%である。

【0187】

一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物の使用量は、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、通常0.1~10モル%、好ましくは0.2~6モル%、より好ましくは0.5~3モル%である。鉄化合物と一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物のモル比率は、通常、1:1~1:3、好ましくは1:1~1:2の範囲から選択することができる。

20

【0188】

本発明の製造方法における典型的な反応操作としては、有機ホウ素試薬、必要に応じホウ素原子に求核的に反応してアート錯体を形成し得る求核剤(例えば、n-ブチルリチウム、tert-ブチルリチウム等)をさせて得られる有機ホウ素アート錯体に、一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物、鉄化合物、及び一般式(2)で表される化合物を添加する方法が好ましい。有機ホウ素アート錯体は、例えば、上記の式(9d)~(9e)で表される有機ホウ素試薬に、tert-ブチルリチウム等の求核剤、必要に応じマグネシウムハライド(MgX^3_2 ; X^3 はハロゲン原子を示し、特にCl又はFである。)を添加して調製される。該求核剤は、有機ホウ素試薬1モルに対し、通常1~1.5モル程度である。マグネシウムハライドは、有機ホウ素試薬1モルに対し、通常0.1~1.5モル程度である。

30

【0189】

上記のクロスカップリング反应用触媒は、反応系中で、鉄化合物と一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物から調製される。或いは、あらかじめ両者の錯体を形成してから反応に供してもよい。例えば、一般式(5)で表される錯体が挙げられる。

40

【0190】

反応は通常、無水の条件下、かつ不活性ガス(例えば、アルゴン、窒素等)雰囲気下で行うことが好ましい。反応温度は、通常-10~80であり、好ましくは0~60、より好ましくは20~60である。反応圧力は特に限定はなく、典型的には常圧である。

【0191】

上記のようにして反応させた後、反応液をプロトン性溶媒(例えば、水、塩化アンモニウム水溶液、希塩酸等)でクエンチして抽出し、必要に応じてカラムクロマトグラフィー、蒸留、再結晶、トリチュレーション等の精製操作を経て目的とする一般式(8)で表される化合物を得る。

50

【0192】

有機アルミニウム試薬を用いたカップリング反応の典型例を以下に示す。鉄化合物及び一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物からなる触媒(クロスカップリング反应用触媒)の存在下、一般式(2)で表される化合物と、上記した種々の公知の方法で調整される有機アルミニウム試薬を反応させて、一般式(8)で表される芳香族化合物を製造する。

【0193】

反応溶媒は、本発明の反応に悪影響を及ぼさない溶媒であれば特に限定はなく、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、tert-ブチルメチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル、テトラヒドロフラン(THF)、1,4-ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル系溶媒；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒；ペンタン、ヘキサン等の脂肪族炭化水素系溶媒；又はこれらの混合溶媒が挙げられる。好ましくは、テトラヒドロフランである。

10

【0194】

本反応では、一般式(2)で表される化合物の濃度は、上記反応溶媒中において、通常0.1~2.0モル/L、好ましくは0.2~1.5モル/L、より好ましくは0.5~1.0モル/L程度に調整することができる。

【0195】

有機アルミニウム試薬の使用量は、アルミニウム原子のモル数換算で、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、通常1~3モル、好ましくは1~2モル、より好ましくは1.1~1.5モルである。

20

【0196】

鉄化合物の使用量は、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、0.1~5モル%、好ましくは0.1~3モル%、より好ましくは0.5~3モル%である。

【0197】

一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物の使用量は、一般式(2)で表される化合物1モルに対し、通常0.1~10モル%、好ましくは0.2~6モル%、より好ましくは0.5~3モル%である。鉄化合物と一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物のモル比率は、通常、1:1~1:3、好ましくは1:1~1:2の範囲から選択することができる。

30

【0198】

本発明の製造方法における典型的な反応操作としては、有機アルミニウム試薬に、一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物、鉄化合物、及び一般式(2)で表される化合物を添加する方法が好ましい。

【0199】

上記のクロスカップリング反应用触媒は、反応系中で、鉄化合物と一般式(4a)で表されるビスホスフィン化合物から調製される。或いは、あらかじめ両者の錯体を形成してから反応に供してもよい。例えば、一般式(5)で表される錯体が挙げられる。

【0200】

反応は通常、無水の条件下、かつ不活性ガス(例えば、アルゴン、窒素等)雰囲気下で行うことが好ましい。反応温度は、通常-10~80であり、好ましくは0~60、より好ましくは20~60である。反応圧力は特に限定はなく、典型的には常圧である。

40

【0201】

上記のようにして反応させた後、反応液をプロトン性溶媒(例えば、水、塩化アンモニウム水溶液、希塩酸等)でクエンチして抽出し、必要に応じてカラムクロマトグラフィー、蒸留、再結晶、トリチュレーション等の精製操作を経て目的とする一般式(8)で表される化合物を得る。

【0202】


3. ビスホスフィン化合物の製造

50

本発明で鉄化合物の配位子として用いられる、一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物は、例えば、次のようにして製造することができる。

【0203】

【化35】



10


【0204】

[式中、 X^2 はハロゲン原子、MはLi又は式： MgY^1 で示される基であり、 Y^1 はハロゲン原子を示す。Q及びArは前記に同じ。]

一般式(6)において、Qは上記したものが挙げられる。好ましくは、式：

【0205】

【化36】




20

【0206】

で表される基である。一般式(4)及び(7)において、Arが同一又は異なって式：

【0207】

【化37】



30

【0208】

[式中、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は前記に同じ。]

で示される化合物が好ましい。このうち、Arが置換フェニル基(上記左の基)であり、該フェニル基上の R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} のうち2つがHであり、かつ残りの1つがメチル、エチル又はプロピル基の場合を除いたものは新規な化合物である。

【0209】

特に、 R^{12} がHであり、 R^{11} 及び R^{13} が $\text{C}_1 \sim \text{C}_6$ アルキル基又はトリアルキルシリル基の場合には、鉄化合物を用いたクロスカップリング反応の促進効果が大きい。

【0210】

一般式(4)で表される化合物のうち、好ましいものとして一般式(4a)で表される化合物が挙げられ、より好ましいものとして一般式(4b)で表される化合物が挙げられる。

【0211】

一般式(6)において、 X^2 はF、Cl、Br、I等のハロゲン原子であり、好ましくはClである。一般式(7)において、Mが式： MgY^1 で示される基の場合、 Y^1 はCl、Br、I等のハロゲン原子であり、好ましくはCl、Brであり、より好ましくはClである。

【0212】

本反応は、一般式(6)で表される化合物に、一般式(7)で表される金属試薬を反応

50

させて、一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物を得る。

【0213】

反応溶媒は、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、tert-ブチルメチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル、テトラヒドロフラン(THF)、1,4-ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル系溶媒；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒；又はこれらの混合溶媒等が用いられる。好ましくは、テトラヒドロフラン(THF)である。該マグネシウム試薬の溶液の濃度は、通常、0.5~1.5モル/L程度であればよい。

【0214】

一般式(7)で表される金属試薬の使用量は、一般式(6)で表される化合物1モルに対し、通常4~12モル、好ましくは6~9モル使用することができる。

10

【0215】

なお、一般式(7)で表される金属試薬は、MがLiの場合は、例えば実験化学講座第5版、18巻、8~58ページの記載に準じて、MがMgY¹(グリニア試薬)の場合は、例えば実験化学講座第5版、18巻、59~76ページの記載に準じて製造することができる。

【0216】

反応は通常、無水の条件下、かつ不活性ガス(例えば、アルゴン、窒素等)雰囲気下で行うことが好ましい。反応温度は、通常、一般式(7)で表される金属試薬の添加時は、-100~80であり、好ましくは-80~30、より好ましくは-80~0である。その後、必要に応じ反応液を0~100程度に昇温してさらに反応させることもできる。反応圧力は特に限定はなく、典型的には常圧である。

20

【0217】

反応後、反応液をプロトン性溶媒(例えば、水、塩化アンモニウム水溶液、希塩酸等)でクエンチして抽出し、必要に応じてカラムクロマトグラフィー、蒸留、再結晶、トリチュレーション等の精製操作を経て目的とする一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物を得る。

【図面の簡単な説明】

【0218】

【図1】実施例1(1)で製造された、塩化鉄・1,2-ビス(ビス(3,5-ジターシャリブチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン錯体(FeCl₂·L)のX線解析によって求められた構造(ORTEP)を示す。

30

【図2】実施例1(1)で製造された錯体のX線解析における結晶データを示す。

【図3】実施例1(2)のエントリーで製造された、塩化鉄・1,2-ビス(ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン錯体(FeCl₂·L)のX線解析によって求められた構造(ORTEP)を示す。

【図4】実施例1(2)で製造された錯体のX線解析における結晶データを示す。

【実施例】

【0219】

本発明を、実施例を用いて更に詳述するが、これに限定されるものではない。なお、ビスホスフィン化合物をL(配位子)と標記する場合がある。

40

【0220】

製造例1：1,2-ビス(ビス(4-フルオロフェニル)ホスフィノ)ベンゼン

1,2-ビス(ジクロロホスフィノ)ベンゼン(0.96g、3.43mmol)及びTHF(20mL)の混合物に、アルゴン雰囲気下、-78で、p-フルオロフェニルマグネシウムブロミドのTHF溶液(26.6mL、1.03M、27.40mmol)を添加した。室温に昇温後、60で終夜反応させた。周囲温度まで冷却し、溶媒を減圧下に除去した後、CH₂Cl₂(30mL)を添加した。反応混合物に、1N塩酸水溶液(20mL)を添加し、CH₂Cl₂を用いて水層を3回抽出した。合わせた有機抽出物中に含まれる水分を硫酸マグネシウムで除去し、濾過した。溶媒を減圧下に除去した後、

50

得られる黄色の油状物質にメタノールを用いてトリチュレーションすることで白色粉末を生成させ、2回メタノールで洗浄し、白色粉末として標題化合物を得た(1.10g、収率62%)。

$^1\text{H NMR (CDCl}_3)$ 6.90 - 6.96 (m, 8H), 6.99 - 7.03 (m, 2H), 7.04 - 7.14 (m, 8H), 7.28 - 7.32 (m, 2H); $^1\text{C NMR (CDCl}_3)$ 115.6 (dt, $J = 4.0, 20.8\text{ Hz}$, 8C), 129.3 (2C), 131.9 (d, $J = 2.3\text{ Hz}$, 4C), 133.8 (dd, $J = 3.1, 3.5\text{ Hz}$, 2C), 135.7 (dt, $J = 8.0, 10.8\text{ Hz}$, 8C), 143.2 (dd, $J = 9.7, 10.0\text{ Hz}$, 2C), 163.2 (d, $J = 247.6\text{ Hz}$, 4C); $^3\text{P NMR (CDCl}_3)$ -17.6; Anal. calcd for $\text{C}_{30}\text{H}_{20}\text{F}_4\text{P}_2$; C, 69.50; H, 3.89. found C, 69.77; H, 4.08.

【0221】

製造例2: 1, 2 - ビス(ビス(4 - メトキシフェニル)ホスフィノ)ベンゼン

出発物質として1, 2 - ビス(ジクロロホスフィノ)ベンゼン(0.96g、3.43mmol)、及びp - メトキシフェニルマグネシウムブロミドのTHF溶液(30.0mL、0.88M、26.40mmol)を用いて、製造例1と同様にして反応させた。反応は40で終夜反応させた。精製後、白色粉末として標題化合物を得た(1.53g、収率79%)。

$^1\text{H NMR (CDCl}_3)$ 3.77 (brs, 12H), 6.71 (brs, 4H), 6.75 (brs, 4H), 7.00 - 7.09 (m, 10H), 7.21 - 7.26 (m, 2H); $^1\text{C NMR (CDCl}_3)$ 55.0 (4C), 113.9 (dd, $J = 4.0\text{ Hz}$, 8C), 128.0 (4C), 128.5 (2C), 133.6 (dd, $J = 3.1\text{ Hz}$, 2C), 135.4 (dd, $J = 10.8\text{ Hz}$, 8C), 144.2 (dd, $J = 9.4\text{ Hz}$, 2C), 159.7 (4C); $^3\text{P NMR (CDCl}_3)$ -18.7; Anal. calcd for $\text{C}_{34}\text{H}_{20}\text{O}_4\text{P}_2$; C, 72.08; H, 5.67. found C, 71.91; H, 5.75.

【0222】

製造例3: 1, 2 - ビス(ビス(2 - メチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン

出発物質として1, 2 - ビス(ジクロロホスフィノ)ベンゼン(0.94g、3.36mmol)、及びo - メチルフェニルマグネシウムブロミドのTHF溶液(26.6mL、0.80M、27.40mmol)を用いて、製造例1と同様にして反応させた。反応は60で終夜反応させた。精製後、白色粉末として標題化合物を得た(0.84g、収率50%)。

$^1\text{H NMR (CDCl}_3)$ d 2.20 (brs, 12H), 6.74 (dd, $J = 1.5, 7.8\text{ Hz}$, 4H), 6.93 (dq, $J = 3.6, 5.7\text{ Hz}$, 2H), 7.00 (dt, $J = 1.2, 7.5\text{ Hz}$, 4H), 7.15 (dt, $J = 1.2, 7.5\text{ Hz}$, 4H), 7.17 (dq, $J = 1.5, 7.8\text{ Hz}$, 4H), 7.23 (dd, $J = 3.6, 5.7\text{ Hz}$, 2H); $^{13}\text{C NMR (CDCl}_3)$ d 21.1 (dd, $J = 10.9\text{ Hz}$, 4C), 125.7 (4C), 128.3 (4C), 129.1 (2C), 129.8 (dd, $J = 2.3\text{ Hz}$, 4C), 133.5 (4C), 133.8 (dd, $J = 3.2\text{ Hz}$, 2C), 135.3 (dd, $J = 3.1\text{ Hz}$, 4C), 142.6 (dd, $J = 13.1\text{ Hz}$, 4C), 142.8 (dd, $J = 12.2\text{ Hz}$, 2C); $^3\text{P NMR (CDCl}_3)$ d -28.5.

【0223】

製造例4: 1, 2 - ビス(ビス(3, 5 - ジメチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン

マグネシウム(1.07g、44.03mmol)及びTHF(30mL)に、アルゴン雰囲気下、3, 5 - ジメチルプロモベンゼン(5.54g、29.93mmol)を滴下した。反応液を周囲温度まで冷却し、濾過して得られる3, 5 - ジメチルフェニルマグネシウムブロミドのTHF溶液、及び1, 2 - ビス(ジクロロホスフィノ)ベンゼン(0.95g、3.39mmol)を用いて、製造例1と同様にして反応させた。反応は60で終夜反応させた。精製後、白色粉末として標題化合物を得た(1.45g、収率76%)。

10

20

30

40

50

^1H NMR (CDCl_3) 2.18 (brs, 24H), 6.78 (brs, 8H), 6.86 (brs, 4H), 7.06 - 7.13 (m, 2H), 7.24 - 7.26 (m, 2H); ^{13}C NMR (CDCl_3) 21.3 (8C), 128.7 (2C), 130.0 (4C), 131.6 (dd, $J = 10.0, 10.2$ Hz, 8C), 134.0 (dd, 2.9, 3.2 Hz, 2C), 137.0 (dd, $J = 2.6$ Hz, 4C), 137.4 (dd, $J = 3.7$ Hz, 8C), 144.1 (dd, $J = 10.0, 10.2$ Hz, 2C); ^3P NMR (CDCl_3) -15.0; Anal. calcd for $\text{C}_{38}\text{H}_{16}\text{P}_2$; C, 81.69; H, 7.22. found C, 81.40; H, 7.22.

【0224】

10

製造例 5 : 1, 2 - ビス (ビス (3, 5 - ジイソプロピルフェニル) ホスフィノ) ベンゼン

マグネシウム (0.48 g、19.75 mmol) 及び THF (7 mL) に、アルゴン雰囲気下、3, 5 - ジイソプロピルプロモベンゼン (3.04 g、12.60 mmol) を滴下した。滴下終了後、1 時間加熱還流した。反応液を周囲温度まで冷却し、濾過して得られる 3, 5 - ジイソプロピルフェニルマグネシウムプロミドの THF 溶液、及び 1, 2 - ビス (ジクロロホスフィノ) ベンゼン (0.45 g、1.61 mmol) を用いて、製造例 1 と同様にして反応させた。反応は 60 で終夜反応させた。精製後、黄色の油状物質として標題化合物を得た (1.18 g、収率 74%)。

^1H NMR (CDCl_3) 1.11 (s, 24H), 1.14 (s, 24H), 2.69 - 2.79 (m, 8H), 6.86 - 6.89 (m, 8H), 6.94 (brs, 12H), 7.01 - 7.09 (m, 2H), 7.22 - 7.26 (m, 2H); ^{13}C NMR (CDCl_3) 23.9 (8C), 24.0 (8C), 34.0 (8C), 124.4 (4C), 128.6 (2C), 129.4 (dd, $J = 9.9$ Hz, 8C), 133.8 (t, $J = 2.8, 2.9$ Hz, 2C), 137.5 (dd, $J = 2.9$ Hz, 4C), 144.6 (dd, $J = 10.2, 10.3$ Hz, 2C), 148.2 (dd, $J = 3.2, 3.4$ Hz, 8C); ^3P NMR (CDCl_3) -12.8.

20

【0225】

製造例 6 : 1, 2 - ビス (ビス (3, 5 - ジターシャリブチルフェニル) ホスフィノ) ベンゼン

30

マグネシウム (1.70 g、69.96 mmol) 及び THF (50 mL) に、アルゴン雰囲気下、3, 5 - ジターシャリブチルプロモベンゼン (12.50 g、46.43 mmol) を滴下した。滴下終了後、1 時間加熱還流した。反応液を周囲温度まで冷却し、濾過して得られる 3, 5 - ジターシャリブチルフェニルマグネシウムプロミドの THF 溶液、及び 1, 2 - ビス (ジクロロホスフィノ) ベンゼン (2.00 g、7.15 mmol) を用いて、製造例 1 と同様にして反応させた。反応は 60 で終夜反応させた。精製後、白色粉末として標題化合物を得た (4.66 g、収率 73%)。

^1H NMR (CDCl_3) 1.18 (brs, 72H), 7.00 - 7.07 (m, 10H), 7.21 - 7.24 (m, 2H), 7.27 - 7.30 (m, 4H); ^{13}C NMR (CDCl_3) 31.4 (24C), 34.8 (8C), 121.9 (4C), 128.0 (dd, $J = 10.0$ Hz, 8C), 128.5 (2C), 133.8 (2C), 137.0 (dd, $J = 2.6$ Hz, 4C), 144.8 (dd, $J = 10.0, 10.2$ Hz, 2C), 150.0 (dd, $J = 3.2, 3.5$ Hz, 8C); ^3P NMR (CDCl_3) -11.4; Anal. calcd for $\text{C}_{62}\text{H}_{88}\text{P}_2$; C, 83.17; H, 9.91. found C, 83.17; H, 9.92.

40

【0226】

製造例 7 : 1, 2 - ビス (ビス (3, 5 - ビス (2, 6 - ジメチルフェニル) フェニル) ホスフィノ) ベンゼン

マグネシウム (0.28 g、11.52 mmol) 及び THF (10 mL) に、アルゴ

50

ン雰囲気下、1 - ブロモ - 3, 5 - ビス(2, 6 - ジメチルフェニル)ベンゼン(2.74 g、7.50 mmol)を滴下した。滴下終了後、1時間加熱還流した。反応液を周囲温度まで冷却し、濾過して得られる1 - (3, 5 - ビス(2, 6 - ジメチルフェニル))マグネシウムプロミドのTHF溶液、及び1, 2 - ビス(ジクロロホスフィノ)ベンゼン(0.28 g、1.00 mmol)を用いて、製造例1と同様にして反応させた。反応は60 で終夜反応させた。精製後、黄色粉末として標題化合物を得た(0.70 g、収率62%)。

$^1\text{H NMR}(\text{CDCl}_3)$ 1.90 (brs, 48H), 6.66 - 7.51 (m, 40H); $^3\text{P NMR}(\text{CDCl}_3)$ -11.8.

【0227】

製造例8: 1, 2 - ビス(ビス(3, 5 - ジトリメチルシリルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン

マグネシウム(0.31 g、12.76 mmol)及びTHF(7 mL)に、アルゴン雰囲気下、3, 5 - ジトリメチルシリルプロモベンゼン(2.51 g、8.33 mmol)を滴下した。滴下終了後、40 で、1.5時間加熱した。反応液を周囲温度まで冷却し、濾過して得られる3, 5 - ジトリメチルシリルフェニルマグネシウムプロミドのTHF溶液、及び1, 2 - ビス(ジクロロホスフィノ)ベンゼン(0.37 g、1.32 mmol)を用いて、製造例1と同様にして反応させた。反応は60 で終夜反応させた。精製後、白色粉末として標題化合物を得た(0.84 g、収率62%)。

$^1\text{H NMR}(\text{CDCl}_3)$ 0.13 (brs, 72H), 7.03 - 7.09 (m, 2H), 7.25 - 7.29 (m, 10H), 7.54 (brs, 4H); $^{13}\text{C NMR}(\text{CDCl}_3)$ -1.1 (24C), 128.8 (2C), 133.9 (2C), 136.0 (dd, $J = 4.0\text{ Hz}$, 4C), 137.8 (4C), 138.9 (dd, $J = 2.3\text{ Hz}$, 8C), 139.1 (dd, $J = 9.4, 9.7\text{ Hz}$, 8C), 144.0 (dd, $J = 10.0, 10.1\text{ Hz}$, 2C); $^3\text{P NMR}(\text{CDCl}_3)$ -13.7; Anal. calcd for $\text{C}_{54}\text{H}_{88}\text{P}_2\text{Si}_8$; C, 63.34; H, 8.66. found C, 63.50; H, 8.71.

【0228】

製造例9: 1, 2 - ビス(ジフェニルホスフィノ)ベンゼン


本化合物はアルドリッチ社製の製品を用いた。CAS番号13991-08-7。

【0229】

製造例10: 2, 3 - ビス(ジフェニルホスフィノ)キノキサリン(DPP - Quinox)

【0230】

【化38】



【0231】

ジフェニルホスフィンのヘキサン溶液(22.3 g、10 wt%、16.06 mmol)にn - ブチルリチウムのヘキサン溶液(7.5 mL、1.6 M、12.00 mmol)をアルゴン雰囲気下、-78 で、10分かけて添加した。室温に昇温し、1時間攪拌後、2, 3 - ジクロロキノキサリン(0.79 g、3.97 mmol)をTHF(24 mL)に溶かし、-78 で、30分かけて添加した。室温に昇温し、3時間反応させた。

【0232】

反応混合物に、1 N塩酸水溶液(30 mL)を添加し、EtOAcを用いて水層を3回抽出し、合わせた有機層を飽和食塩水を用いて洗浄した。合わせた有機抽出物中に含まれる水分を硫酸マグネシウムで除去し、濾過した。溶媒を減圧下に除去した後、得られる赤橙色固体をトルエンを用いて再結晶することで、橙色粉末として標題化合物を得た(0.89 g、収率45%)。

10

20

30

40

50


^1H NMR (CDCl_3) 7.24 - 7.34 (m, 20H), 7.63 - 7.66 (m, 2H), 7.89 - 7.93 (m, 2H); ^{13}C NMR (CDCl_3) 128.1 (dd, $J = 3.7, 3.8\text{ Hz}$, 8C), 128.7 (4C), 129.7 (2C), 129.9 (2C), 134.6 (dd, $J = 10.2, 10.3\text{ Hz}$, 8C), 135.6 (4C), 142.2 (2C), 163.8 (dd, $J = 9.2, 10.2\text{ Hz}$, 2C); ^{31}P NMR (CDCl_3) -10.7; Anal. calcd for $\text{C}_{32}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{P}_2$; C, 77.10; H, 4.85; N, 5.62. found C, 77.32; H, 4.94; N, 5.57.

【0233】

製造例 1 ~ 8 で得られた化合物を表 1 に示す。

【0234】

【表 1】



| 製造例 | ArMgBr | 収率(%) (T °C) | 生成物の略構造式 | |
|-----|--------|----------------------|--|----|
| 1 | | 62 (60 °C) | [4-F]-DPPBz | 10 |
| 2 | | 79 (40 °C) | [4-MeO]-DPPBz | |
| 3 | | 50 (60 °C) | [2-Me]-DPPBz | |
| 4 | | 76 (60 °C) | [3,5-Me ₂]-DPPBz | 20 |
| 5 | | 74 (60 °C) | [3,5-(<i>i</i> -Pr) ₂]-DPPBz | |
| 6 | | 73 (60 °C) | [3,5-(<i>t</i> -Bu) ₂]-DPPBz | 30 |
| 7 | | 54 (60 °C) | [3,5-Ar ₂]-DPPBz | |
| 8 | | 62 (60 °C) | [3,5-(Me ₃ Si) ₂]-DPPBz | 40 |

【 0 2 3 5 】

実施例 1

(1) 塩化鉄・1,2-ビス(ビス(3,5-ジターシャリブチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン錯体 (FeCl₂・L)

FeCl₂・4H₂O (0.22 g、1.11 mmol) 及びエタノール (25 mL) に、アルゴン雰囲気下、1,2-ビス(ビス(3,5-ジターシャリブチルフェニル)ホス

フィノ)ベンゼン(1.00g、1.12mmol)を添加した。以下の操作もアルゴン雰囲気下で行った。90で6時間反応させた。反応液を周囲温度まで冷却し、溶媒を減圧下に除去した。エタノールを用いて得られる白色粉末を3回洗浄し、濾過した後、減圧下で乾燥した。白色粉末として標題化合物を得た(0.70g、収率61%)。図1に該化合物のX線解析によって求められた構造(ORTEP)を示す。

$^1\text{H NMR}(\text{C}_4\text{D}_8\text{O})$ - 5.83 (brs, 6H), - 1.19-2.56 (brs, 74H), 4.54 (brs, 4H), 7.08-7.76 (m, 2H), 15.34 (brs, 2H); Anal. calcd for $\text{C}_{62}\text{H}_{88}\text{Cl}_2\text{FeP}_2$; C, 72.86; H, 8.68. found C, 72.60; H, 8.75.

【0236】

(2) 塩化鉄・1,2-ビス(ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン錯体($\text{FeCl}_2 \cdot \text{L}$)

FeCl_2 (127mg、1.00mmol)及びTHF(10mL)に、アルゴン雰囲気下、1,2-ビス(ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン(586mg、1.05mmol)を添加した。以下の操作もアルゴン雰囲気下で行った。80で6時間反応させた。反応液を周囲温度まで冷却し、溶媒を減圧下に除去した。粗生成物をジクロロメタンに溶解させ、濾過し、溶媒を減圧下に除去した。ジエチルエーテルを用いて得られる茶白色粉末を3回洗浄し、減圧下で乾燥した。淡茶白色粉末として標題化合物を得た(365mg、収率53%)。図3に該化合物のX線解析によって求められた構造(ORTEP)を示す。

$^1\text{H NMR}(\text{CDCl}_3)$ - 5.62 (brs, 6H), - 1.66 (brs, 26H), 3.22 (brs, 2H), 7.00 (m, 2H), 14.92 (brs, 2H); Anal. calcd for $\text{C}_{38}\text{H}_{40}\text{Cl}_2\text{FeP}_2$; C, 66.59; H, 5.88. found C, 66.17; H, 5.87.

【0237】

実施例2：クロスカップリング反応

実施例1(1)で得られた塩化鉄・1,2-ビス(ビス(3,5-ジターシャリブチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン錯体($\text{FeCl}_2 \cdot \text{L}$)、塩化鉄(FeCl_3)、及び1,2-ビス(ビス(3,5-ジターシャリブチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン配位子(L)を用いて、プロモシクロヘプタンとフェニルマグネシウムプロミドを、表2に記載の条件で反応させた。生成物及びその収率を表2に示す。また収率はGCから内部標準としてウンデカンを用いることで決定した。

【0238】

なお、 $\text{FeCl}_2 \cdot \text{L}$ 又は FeCl_3 、及び必要に応じLを含むTHF溶液にプロモシクロヘプタンをアルゴン雰囲気下、0で添加した。さらにTHFを加え、反応容器の内壁をリンスした。混合物に、25で、シリンジポンプを用いフェニルマグネシウムプロミドのTHF溶液を20分かけて滴下し、さらに25で10分攪拌し、反応させた。


【0239】

10

20

30

【表 2】



| entry | 錯体 (mol%) | 追加の配位子 (mol%) | GC 収率 (%) | | | |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|----|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | FeCl ₂ ·L (0.5) | なし | 85 | 13 | 0 | 2 |
| 2 | FeCl ₂ ·L (0.5) | L (0.5) | 92 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | FeCl ₃ (0.5) | L (1) | 92 | 7 | 0 | 0 |

10

【0240】

実施例 3：クロスカップリング反応（配位子の影響）

製造例 1 ~ 9 で得られた配位子及び塩化鉄 (FeCl₃) を用いて、プロモシクロヘプタンとフェニルマグネシウムプロミドの THF 溶液を、表 3 に記載の条件で反応させた。生成物及びその収率を表 3 に示す。また収率は GC から内部標準としてウンデカンを用いることで決定した。


20

【0241】

なお、FeCl₃、及び必要に応じ種々の配位子を含む THF 溶液にプロモシクロヘプタンをアルゴン雰囲気下、0 °C で添加した。さらに THF を加え、反応容器の内壁をリンスした。混合物に、25 °C で、シリンジポンプを用いフェニルマグネシウムプロミドの THF 溶液を 20 分かけて滴下し、さらに 25 °C で 10 分攪拌し、反応させた。

【0242】

【表 3】



| entry | 配位子 | 収率 (%) | | | |
|-------|--|--------|----|----|----|
| | | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | なし | 21 | 69 | 6 | 0 |
| 2 | DPPBz | 55 | 15 | 1 | 23 |
| 3 | [4-F]-DPPBz | 38 | 16 | 2 | 34 |
| 4 | [4-MeO]-DPPBz | 29 | 9 | 1 | 56 |
| 5* | DPP-Quinox | 24 | 31 | 15 | 0 |
| 6 | [2-Me]-DPPBz | 19 | 66 | 5 | 0 |
| 7 | [3,5-Me ₂]-DPPBz | 83 | 17 | 0 | 0 |
| 8 | [3,5-(<i>i</i> -Pr) ₂]-DPPBz | 84 | 16 | 0 | 0 |
| 9 | [3,5-(<i>t</i> -Bu) ₂]-DPPBz | 92 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | [3,5-Ar ₂]-DPPBz ** | 14 | 44 | 8 | 16 |
| 11 | [3,5-(Me ₃ Si) ₂]-DPPBz | 83 | 13 | 0 | 4 |

* 反応は、 FeCl_3 (3 mol%)、配位子(6 mol%)、PhMgBr(2.4 eq)を用いて温度60°Cで30分かけて滴下して実施した。

** Arは、2,6-ジメチルフェニル基を示す。

【0243】

これによれば、エントリー7、8、9及び11では高収率かつ高い選択性でクロスカップリング化合物(2)が得られることが分かった。

【0244】

実施例4：クロスカップリング反応

[エントリー1]シクロヘキシルベンゼンの調製

塩化鉄・1,2-ビス(ビス(3,5-ジターシャリブチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン錯体($\text{FeCl}_2 \cdot \text{L}$)(2.5 mg, 2.5 μmol)、1,2-ビス(ビス(3,5-ジターシャリブチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン(L)(2.2 mg, 2.5 μmol)及びプロモシクロヘキサン(81.5 mg, 0.5 mmol)をアルゴン雰囲気下、0 °Cで添加した。以下の操作もアルゴン雰囲気下で行った。THF(0.80 mL)を加え、反応容器の内壁をリンスした。混合物に、25 で、シリンジポンプを用いフェニルマグネシウムプロミドのTHF溶液(0.77 mL, 0.97 M, 0.75 mmol)を20分かけて滴下し反応させた。さらに25 で10分攪拌し、反応混合物を0 に冷却した後、飽和塩化アンモニウム水溶液2.0 mLを添加した。ヘキサンを用いて水層を4回抽出した。合わせた有機抽出物をフロリジルパッド(100-200メッシュ、ナカライテスク株式会社)を用いて濾過した。溶媒を減圧下に除去した後、内部標準としてピラジン(15.3 mg, 0.19 mmol)を用いて、¹H NMR分析を実施した(収率97%)。

【0245】

10

20

30

40

50

[エントリー 2] シクロヘキシルベンゼンの調製

出発物質として、クロロシクロヘキサン (59.5 mg、0.5 mmol) 及びフェニルマグネシウムブロミドの THF 溶液 (0.77 mL、0.97 M、0.75 mmol) を用い、エントリー 1 と同様に、反応させた。条件 ; 40、2 時間かけて滴下した。内部標準としてピラジン (19.4 mg、0.24 mmol) を用いて、¹H NMR 分析を実施した (収率 85%)。

【 0246 】

[エントリー 3] (2 - メチルフェニル) シクロヘキサンの調製

出発物質として、プロモシクロヘキサン (81.7 mg、0.5 mmol) 及び 2 - メチルフェニルマグネシウムブロミドの THF 溶液 (0.94 mL、0.80 M、0.75 mmol) を用い、エントリー 1 と同様に、反応させた。条件 ; 40、20 分かけて滴下した。内部標準としてピラジン (13.2 mg、0.16 mmol) を用いて、¹H NMR 分析を実施した (収率 99%)。

10

【 0247 】

[エントリー 4] (3, 4, 5 - トリフルオロフェニル) シクロヘキサンの調製

出発物質として、プロモシクロヘキサン (81.5 mg、0.5 mmol) 及び 3, 4, 5 - フェニルマグネシウムブロミドの THF 溶液 (0.84 mL、0.89 M、0.75 mmol) を用い、エントリー 1 と同様に、反応させた。条件 ; 40、20 分かけて滴下した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ペンタン) 後に、無色液体として、標題化合物を得た (0.207 g、収率 98%)。

20

¹H NMR (CDCl₃) 1.15 - 1.45 (m, 5H), 1.72 - 1.86 (m, 5H), 2.40 - 2.48 (m, 1H), 6.74 - 6.85 (m, 2H);
¹³C NMR (CDCl₃) 25.9, 26.5 (2C), 34.2 (2C), 43.9, 110.5 (dt, J = 5.5, 15.0 Hz, 2C), 137.8 (dt, J = 15.5, 246.4 Hz), 144.2 (dt, J = 4.9, 6.7 Hz), 151.0 (ddd, J = 4.5, 9.4, 247.1 Hz, 2C). Anal. calcd for C₁₂H₁₃F₃, 67.28; H, 6.12. found C, 67.29; H, 6.10.

【 0248 】

[エントリー 5] (4 - メトキシフェニル) シクロヘキサンの調製

出発物質として、プロモシクロヘキサン (81.8 mg、0.5 mmol) 及び 4 - メトキシフェニルマグネシウムブロミドの THF 溶液 (0.85 mL、0.88 M、0.75 mmol) を用い、エントリー 1 と同様に、反応させた。条件 ; 25、20 分かけて滴下した。内部標準としてピラジン (19.0 mg、0.24 mmol) を用いて、¹H NMR 分析を実施した (収率 96%)。

30

【 0249 】

[エントリー 6] デシルベンゼンの調製

出発物質として、1 - ヨードデカン (134.1 mg、0.5 mmol) 及びフェニルマグネシウムブロミドの THF 溶液 (0.77 mL、0.97 M、0.75 mmol) を用い、エントリー 1 と同様に、反応させた。条件 ; 40、2 時間かけて滴下した。内部標準としてピラジン (29.0 mg、0.36 mmol) を用いて、¹H NMR 分析を実施した (収率 71%)。

40

【 0250 】

[エントリー 7] 1 - デシル - 2, 4, 6 - トリメチルベンゼンの調製

出発物質として、1 - ヨードデカン (133.9 mg、0.5 mmol) 及び 2, 4, 6 - トリメチルフェニルマグネシウムブロミドの THF 溶液 (0.66 mL、1.14 M、0.75 mmol) を用い、エントリー 1 と同様に、反応させた。条件 ; 40、3 時間かけて滴下した。薄層クロマトグラフィー (ヘキサン) 後に、無色液体として、標題化合物を得た (0.121 g、収率 93%)。

¹H NMR d 0.88 (t, J = 6.5 Hz, 3H), 1.27-1.40 (m, 16H), 2.24 (s, 3H), 2.28 (s, 6

50

H), 2.55 (t, J= 7.8 Hz, 3H), 6.82 (s, 2H); ^{13}C NMR d 14.1, 19.7 (2C), 20.8, 22.7, 29.3 (2C), 29.4, 29.5, 29.6 (2C), 30.3, 31.9, 128.8 (2C), 134.7, 135.8 (2C), 136.7; Anal. calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{32}\text{C}$, 87.62; H, 12.38. found C, 87.39; H, 12.47.

【 0 2 5 1 】

[エントリー 8] 1 - デシル - 2 , 4 , 6 - トリメチルベンゼンの調製

出発物質として、1 - ブロモデカン (1 1 0 . 8 m g 、 0 . 5 m m o l) 及び 2 , 4 , 6 - トリメチルフェニルマグネシウムブロミドのTHF溶液 (0 . 6 6 m L 、 1 . 1 4 M 、 0 . 7 5 m m o l) を用い、エントリー 1 と同様にして、反応させた。条件 ; 4 0 、 3 時間かけて滴下した。薄層クロマトグラフィー (ヘキサン) 後に、無色液体として、標題化合物を得た (0 . 0 9 9 g 、 収率 7 6 %) 。

10

【 0 2 5 2 】

[エントリー 9] 1 - フェニルアダマンタンの調製

出発物質として、1 - ブロモアダマンタン (2 1 5 . 4 m g 、 1 . 0 m m o l) 及びフェニルマグネシウムブロミドのTHF溶液 (1 . 5 5 . m L 、 0 . 9 7 M 、 1 . 5 0 m m o l) を用い、エントリー 1 と同様にして、反応させた。条件 ; 4 0 、 3 時間かけて滴下した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ペンタン) 後に、白色固体として、標題化合物を得た (0 . 1 7 3 g 、 収率 8 1 %) 。

【 0 2 5 3 】

[エントリー 1 0] 4 - (4 - ブロモフェネチル) - 1 - メトキシベンゼンの調製





















出発物質として、4 - ブロモフェネチルブロמיד (2 6 1 . 4 m g 、 1 . 0 m m o l) 及び 4 - メトキシフェニルマグネシウムブロミドのTHF溶液 (1 . 4 2 m L 、 1 . 0 6 M 、 1 . 5 m m o l) を用い、エントリー 1 と同様にして、反応させた。条件 ; 4 0 、 3 時間かけて滴下した。薄層クロマトグラフィー (ヘキサン / 酢酸エチル = 9 2 / 8) 後に、無色液体として、標題化合物を得た (0 . 2 2 6 g 、 収率 7 8 %) 。

20

^1H NMR d 2.84 (brs, 4H), 3.79 (s, 3H), 6.79-6.84 (m, 2H), 6.99-7.08 (m, 4H), 7.36-7.40 (m, 2H); ^{13}C NMR d 36.7, 37.5, 55.2, 113.7 (2C), 129.3 (2C), 130.3 (2C), 131.3 (2C), 133.3, 140.7, 157.9. Anal. calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{BrO}$ C, 61.87; H, 5.19. found C, 62.13; H, 5.27.

【 0 2 5 4 】

【表 4】

| $\text{R-X (1.0 eq)} \xrightarrow[\text{THF, 0 } ^\circ\text{C}]{\text{FeCl}_2\cdot\text{L (Y mol\%)} \text{ 及び L (Y mol\%)}} \xrightarrow[\text{THF, 10min 攪拌}]{\text{Ar'MgBr (1.5 eq) 滴下後}}$ | | | | |
|--|---|---|----------|--|
| entry | R-X | Ar'MgBr | Y mol% | R-Ar'の収率(%) (温度、滴下時間) |
| 1 |  |  | 0.5 mol% | 97 (25 °C, 20 min) |
| 2 |  |  | 3.0 mol% | 85 (40 °C, 2 h) |
| 3 |  |  | 3.0 mol% | 99 (40 °C, 20 min) |
| 4 |  |  | 3.0 mol% | 98 (40 °C, 20 min) |
| 5 |  |  | 3.0 mol% | 96 3.0 mol% (25 °C, 20 min) |
| 6 |  |  | 3.0 mol% | 71 (40 °C, 2 h) |
| 7 |  |  | 3.0 mol% | 93 (40 °C, 3 h) |
| 8 |  |  | 3.0 mol% | 76 (40 °C, 3 h) |
| 9 |  |  | 3.0 mol% | 81 (40 °C, 3 h) |
| 10 |  |  | 3.0 mol% | 78 (40 °C, 3 h) |

a 単離収率 b 内部標準としてピラジンをういて¹H NMRで収率を求めた

L = [3,5-(t-Bu)₂]-DPPBz

表4より、エントリー1～10では、クロスカップリング化合物が高収率で得られることが分かった。しかも、エントリー5のように、芳香族マグネシウム試薬の芳香環上にフッ素原子を有する化合物でも極めて高い収率で反応が進行している点は特筆すべきである。

【0256】

実施例5：クロスカップリング反応（有機亜鉛試薬）

塩化亜鉛 $ZnCl_2$ (81.8 mg, 0.60 mmol) の THF 0.6 ml の溶液に、0にて、1.14 M フェニルマグネシウムブロマイドの THF 溶液 (1.05 mL, 1.2 mmol)、1, 2 - ビス (ビス (3, 5 - ジトリメチルシリルフェニル) ホスフィノ) ベンゼン [3,5-(TMS)₂]-DPPBz (4.5 mg, 50 μmol)、プロモシクロヘプタン (88.7 mg, 0.50 mmol)、及びウンデカン (46.9 mg, 0.30 mmol) を加えた。10分後、同温にて、0.10 M $FeCl_3$ の THF (50.0 μL, 50 μmol) 溶液を加えた。カップリング反応は、50で5時間実施した。室温まで冷却後、反応液の一部を取り出して、内部標準としてウンデカンを用いて、ガスクロマトグラフィー (GC) により生成物の収率を測定した。その結果を、表5のエントリー4に示す。

10

【0257】

エントリー1は配位子を用いないこと以外は、上記と同様の方法により反応させた。


【0258】

エントリー2及び3は、配位子としてそれぞれ、1, 2 - ビス (ジフェニルホスフィノ) ベンゼン (DPPBz) 及び1, 2 - ビス (ビス (3, 5 - ジターシャリブチルフェニル) ホスフィノ) ベンゼン ([3,5-(t-Bu)₂]-DPPBz) を用いたこと以外は、上記と同様の方法により反応させた。

20

【0259】

【表5】



| entry | 配位子 | GC 収率 (%) | | | 原料回収 |
|-------|----------------------------------|-----------|----|---|------|
| | | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | none | 67 | 11 | 3 | 15 |
| 2 | DPPBz | 82 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | [3,5-(t-Bu) ₂]-DPPBz | 96 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | [3,5-(TMS) ₂]-DPPBz | 96 | 3 | 2 | 0 |

30

【0260】

実施例6：クロスカップリング反応（有機ホウ素試薬）

フェニルボロン酸ピナコールエステル (204.1 mg, 1.0 mmol) の THF 2.5 ml 溶液に、-40にて、1.62 M t-BuLi in pentane (0.58 ml, 0.95 mmol) の THF 溶液を加えた。反応液を -40で30分撹拌した後、0で30分撹拌した。0減圧下で溶媒を除去した。残ったリチウムt-ブチルポレート白色結晶を0でTHF 1.5 ml に溶解した。得られたリチウムt-ブチルポレートの溶液に、ウンデカン (51.1 mg, 0.33 mmol)、プロモシクロヘプタン (66.9 mg, 0.50 mmol)、0.10 M マグネシウムブロマイド $MgBr_2$ の THF 溶液 (1.00 mL, 0.10 mmol)、1, 2 - ビス (ビス (3, 5 - ジターシャリブチルフェニル) ホスフィノ) ベンゼン ([3,5-(t-Bu)₂]-DPPBz) (22.4 mg, 0.025 mmol, 5.00 mol%)、及び0.10 M 塩化鉄 $FeCl_3$ の THF 溶液 (250 μL, 0.025 mmol, 5.00 mol%) を加えた。カ

50

カップリング反応を60 で3時間行った。室温まで冷却後、反応液の一部を取り出して、内部標準としてウンデカンを用いて、ガスクロマトグラフィー（GC）により生成物の収率を測定した。収率は95%であった。その結果を、表6のエントリー7に示す。

【0261】

エントリー1は配位子を用いないこと以外は、上記と同様の方法により反応させた。

【0262】

エントリー2及び3は、配位子[3,5-(t-Bu)₂]DPPBzに代えて、1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)ベンゼン(DPPBz)を用い、それぞれプロモシクロヘプタンに対し5 mol%及び10 mol%用いること以外は、上記と同様の方法により反応させた。

【0263】

エントリー4は、配位子[3,5-(t-Bu)₂]-DPPBzに代えて、1,2-ビス(ビス(4-メトキシフェニル)ホスフィノ)ベンゼン([4-MeO]-DPPBz)を用いること以外は、上記と同様の方法により反応させた。

【0264】


エントリー5及び6は、配位子[3,5-(t-Bu)₂]-DPPBzに代えて、1,2-ビス(ビス(3,5-ジトリメチルシリルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン([3,5-(TMS)₂]-DPPBz)を用い、それぞれプロモシクロヘプタンに対し5 mol%及び10 mol%用いること以外は、上記と同様の方法により反応させた。

【0265】

エントリー8は、配位子[3,5-(t-Bu)₂]-DPPBzを、プロモシクロヘプタンに対し10 mol%用いること以外は、上記と同様の方法により反応させた。

【0266】

【表6】



| Entry | 配位子 (mol%) | 収率 (%) ^a | | | 原料回収 |
|-------|---------------------------------------|---------------------|----|----|------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | none | 10 | 44 | 7 | 34 |
| 2 | DPPBz (5) | 17 | 20 | 16 | 33 |
| 3 | DPPBz (10) | 4 | 3 | 8 | 85 |
| 4 | [4-MeO]-DPPBz (5) | 58 | 15 | 10 | 4 |
| 5 | [3,5-(TMS) ₂]-DPPBz (5) | 50 | 15 | 6 | 19 |
| 6 | [3,5-(TMS) ₂]-DPPBz (10) | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [3,5-(t-Bu) ₂]-DPPBz (5) | 72 | 14 | 3 | 0 |
| 8 | [3,5-(t-Bu) ₂]-DPPBz (10) | 95 | <2 | 0 | 0 |

^a 収率は内部標準としてウンデカンを用いてcalibrated GC分析により測定した。

10

20

30

40

50

【 0 2 6 7 】

実施例 7 : クロスカップリング反応 (有機ホウ素試薬)

フェニルボロン酸ピナコールエステルの THF 溶液に、0 にて 1 当量の t-BuLi (1.62 M in pentane) を加えた。反応液を 0 で 30 分撹拌した後、減圧下で溶媒を除去した。残ったリチウム t-ブチルボレートの白色結晶を THF に溶解し、THF / ヘキサンで再結晶した。得られた白色結晶を集めて、アルゴン雰囲気下で THF に溶解した。この溶液は、分解することなく 0 で数週間保存することができる。濃度は、内部標準としてメシチレンを用いて NMR で決定した。

【 0 2 6 8 】

0.73 M リチウム t-ブチルボレートの THF 溶液 (1.40 mL, 1.0 mmol) に、0 にて、ウンデカン (30.3 mg, 0.19 mmol)、プロモシクロヘプタン (67.6 mg, 0.51 mmol)、0.100 M 無水マグネシウムブロマイド $MgBr_2$ の THF 溶液 (1.00 ml, 0.10 mmol)、及び塩化鉄・1, 2-ビス(ビス(3, 5-ジターシャリブチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン錯体 ($FeCl_2 \cdot [3,5-(t-Bu)_2]$ -DPPBz complex) (250 μ L, 0.025 mmol, 5.00 mol%) を加えた。カップリング反応を 60 で 3 時間行った。室温まで冷却後、反応液の一部を取り出して、内部標準としてウンデカンを用いて、ガスクロマトグラフィー (GC) により生成物の収率を測定した。その結果を、表 7 のエントリー 2 に示す。

10


【 0 2 6 9 】

エントリー 1 は、塩化鉄・1, 2-ビス(ビス(3, 5-ジターシャリブチルフェニル)ホスフィノ)ベンゼン錯体 ($FeCl_2 \cdot [3,5-(t-Bu)_2]$ -DPPBz complex) に代えて、塩化鉄・[1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ)ベンゼン]₂ 錯体 ($FeCl_2 \cdot L_2$) を用いること以外、上記と同様の方法により反応させた。

20

【 0 2 7 0 】

【表 7】



30

| Entry | Fe cat. (mol%) | 収率 (%) ^a | | | RSM |
|-------|-------------------------------|---------------------|----|----|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | $FeCl_2(dppbz)_2$ (5) | 0 | 0 | 43 | 56 ^b |
| 2 | $FeCl_2[3,5-t-Bu_2]DPPBz$ (5) | 81 | 14 | 5 | 0 |

40

^a 収率は内部標準としてウンデカンを用いて calibrated GC 分析により測定した。

^b 収率は内部標準としてウンデカンを用いて non-calibrated GC 分析により測定した。

【 0 2 7 1 】

実施例 8 : クロスカップリング反応 (有機ホウ素試薬)


4-メトキシフェニルボロン酸ピナコールエステル (351.2 mg, 1.5 mmol) の THF 5.0 ml 溶液に、-40 にて、1.80 M t-BuLi in pentane (0.78 ml, 1.40 mmol) を加えた。反応液を -40 で 30 分撹拌した後、0 で 30 分撹拌した。0 で減圧下に溶媒を除去した。残ったリチウム t-ブチルボレートの白色結晶を 0 で THF 2.4 ml に溶解した。得られたリチウム t-ブチルボレートの溶液に、ウンデカン (66.2 mg, 0.42 mmol)、プロモ

50

シクロヘプタン (178.2 mg, 1.01 mmol)、0.10 M マグネシウムブロマイド MgBr_2 の THF 溶液 (2.00 mL, 0.20 mmol)、塩化鉄・1, 2 - ビス (ビス (3, 5 - トリメチルシリルフェニル) ホスフィノ) ベンゼン錯体 ($\text{FeCl}_2 \cdot [3,5-(t\text{-Bu})_2]$ -DPPBz complex) の THF 溶液 (0.60 ml, 0.030 mmol, 3.00 mol%) を加えた。カップリング反応を 40 °C で 3 時間行った。反応混合物を 0 °C に冷却した後、飽和塩化アンモニウム水溶液 2.0 mL を添加した。ジエチルエーテルを用いて水層を 5 回抽出した。合わせた有機抽出物をフロリジルパッド (100 - 200 メッシュ、ナカライテスク株式会社) を用いて濾過した。薄層クロマトグラフィー (ヘキサン) 後に、無色液体として、(4 - メトキシフェニル) シクロヘプタンを得た (0.199 g、収率 97%)。

【0272】

【化39】



10

20


【0273】

実施例 9 : クロスカップリング反応 (有機ホウ素試薬)

出発物質として、プロモシクロヘプタン (89.2 mg、0.50 mmol) 及び 3, 4, 5 - トリフルオロフェニルボロン酸ピナコールエステル (193.5 mg、0.75 mmol) を用い、実施例 8 と同様に反応させた。内部標準としてピラジン (11.7 mg、0.15 mmol) を用いて、 ^1H NMR 分析を実施した (収率 94%)。

【0274】

【化40】



30

40

【0275】

実施例 10 : クロスカップリング反応 (有機アルミニウム試薬)


塩化アルミニウム AlCl_3 (80.0 mg, 0.60 mmol) の THF 0.6 mL 溶液に、0 °C にて、1.64 M フェニルマグネシウムクロライドの THF 溶液 (1.10 mL, 2.40 mmol) を加えた。反応液を室温で 1 時間攪拌した。得られた溶液に、0 °C にて、1, 2 - ビス (ビス (3, 5 - ジターシャリブチルフェニル) ホスフィノ) ベンゼン ($[3,5-(t\text{-Bu})_2]$ -DPPBz) (13.4 mg, 0.015 mmol)、0.1 M 塩化鉄 FeCl_3 の THF 溶液 (0.15 mL, 0.015 mmol) を加え、次

50

にクロロシクロヘプタン (66.3 mg, 0.5 mmol) を加えた。カップリング反応は 80 °C で 24 時間行った。室温まで冷却後、反応液の一部を取り出して、内部標準としてウンデカンを用いて、ガスクロマトグラフィー (GC) により生成物の収率を測定した。収率は 94 % であった。その結果を、表 8 のエントリー 5 に示す。

【 0 2 7 6 】

【 表 8 】



10

| entry | 配位子 | GC収率 (%) ^a | | | 原料回収 (%) ^a |
|-------|--|-----------------------|---|---|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | none | 33 | 6 | 6 | 52 |
| 2 | DPPBz | 58 | 5 | 6 | 30 |
| 3 | [4-MeO]-DPPBz | 83 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | [3,5-Me ₂]-DPPBz | 86 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | [3,5-(<i>t</i> -Bu) ₂]-DPPBz ^b | 95 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | [3,5-(TMS) ₂]-DPPBz | 94 | 1 | 3 | 0 |

20

^a 収率は内部標準としてウンデカンを用いてcalibrated GC分析により測定した。

^b 約 2% のBi(cycloheptane) が得られた。

【 0 2 7 7 】


実施例 11 : クロスカップリング反応 (有機アルミニウム試薬)

実施例 10 のエントリー 5 と同様に反応して、下記の反応を行った。エントリー 1 及び 2 の収率は、内部標準として1,1,2,2,-テトラクロロエタンを用いて¹H-NMRより測定した。エントリー 3 の収率は、内部標準としてピラジン (Pyrazine) を用いて¹H-NMRより測定した。

30

【 0 2 7 8 】

【 表 9 】



| entry | 配位子 | t (h) | 収率 (%) | 原料回収 (%) |
|----------------|---|-------|--------|----------|
| 1 ^a | DPPBz | 24 | 30 | 55 |
| 2 ^a | [3,5-(<i>t</i> -Bu) ₂]-DPPBz | 12 | 84 | 8 |
| 3 ^b | [3,5-(TMS) ₂]-DPPBz | 12 | 94 | 3 |

40

^a 収率は、内部標準として1,1,2,2,-テトラクロロエタンを用いて¹H-NMRより測定した。

^b 収率は、内部標準としてピラジン(Pyrazine)を用いて¹H-NMRより測定した。

【 0 2 7 9 】

実施例 12 ; クロスカップリング反応 (有機アルミニウム試薬)


実施例 10 のエントリー 5 と同様に反応して、下記の反応を行った。エントリー 1 及び 2 の収率は、内部標準として1,1,2,2,-テトラクロロエタンを用いて¹H-NMRより測定した

50

。エントリー 3 の収率は、カラムクロマトグラフィー後、目的化合物を単離することで得た。

【 0 2 8 0 】

【 表 1 0 】




| entry | Ligand | yield ^a (%) | RSM ^a (%) |
|-------|---|------------------------|----------------------|
| 1 | DPPBz | 67 | 12 |
| 2 | [3,5-(<i>t</i> -Bu) ₂]-DPPBz | 71 | 11 |
| 3 | [3,5-(TMS) ₂]-DPPBz | 87 ^b | trace |

^a The yield was determined by ¹H NMR using 1,1,2,2-tetrachloroethane as an internal standard. ^b Isolated yield.

10


【 図 1 】



【 図 2 】

| | |
|---|---|
| Molecular Formula | C ₆₂ H ₈₈ Cl ₂ Fe ₂ |
| Formula Weight | 1022.08 |
| Crystal Dimensions | 0.40 x 0.2 x 0.1 mm |
| Crystal Color, Habit | colorless, platelet |
| Crystal System | monoclinic |
| Lattice Type | C-centered |
| Space Group | C2/c (#16) |
| Lattice Parameters | <i>a</i> = 27.612(7) Å <i>b</i> = 19.743(4) Å <i>c</i> = 24.692(6) Å <i>β</i> = 105.9441(16) ° <i>V</i> = 12943(5) Å ³ |
| <i>Z</i> value | 8 |
| <i>D</i> _{calc} | 1.049 g/cm ³ |
| Radiation | MoKα (λ = 0.71070 Å) graphite monochromated |
| <i>μ</i> (MoKα) | 3.973 cm ⁻¹ |
| <i>2θ</i> _{max} | 55.0 ° |
| No. of Reflections Measured | Total: 27248 Unique: 14576 (<i>R</i> _{int} = 0.048) |
| No. Variables | 605 |
| Reflection/Parameter Ratio | 24.09 |
| Residuals: <i>R</i> _i (I > 2.0σ(I)) | 0.1013 |
| Residuals: <i>R</i> (All reflections) | 0.1568 |
| Residuals: <i>wR</i> ₂ (All reflections) | 0.3458 |
| Goodness of Fit Indicator | 1.096 |
| Max Shift/Error in Final Cycle | 0.001 |
| Structure Solution | Direct Methods (SHELX97) |

【 図 3 】



【 図 4 】

| | |
|--|---|
| Molecular Formula | C ₂₈ H ₄₀ Cl ₂ FeP ₂ |
| Formula Weight | 685.43 |
| Crystal Dimensions | 0.30 x 0.15 x 0.05 mm |
| Crystal Color, Habit | colorless, platelet |
| Crystal System | monoclinic |
| Lattice Type | Primitive |
| Space Group | P2 ₁ /m (#11) |
| Lattice Parameters | a = 8.94(5) Å b = 21.32(12) Å c = 10.21(5) Å β = 99.04(4) ° V = 1921(19) Å ³ |
| Z value | 2 |
| ρ _{calc} | 1.185 g/cm ³ |
| Radiation | MoKα (λ = 0.71070 Å) graphite monochromated |
| μ (MoKα) | 6.374 cm ⁻¹ |
| 2θ _{max} | 54.7 ° |
| No. of Reflections Measured | Total: 10572 Unique: 4333 (R _{int} = 0.135) |
| No. Variables | 219 |
| Reflection/Parameter Ratio | 19.98 |
| Residuals: R _i (I > 2.00σ(I)) | 0.1380 |
| Residuals: R (All reflections) | 0.1784 |
| Residuals: wR ₂ (All reflections) | 0.3890 |
| Goodness of Fit Indicator | 1.001 |
| Max Shift/Error in Final Cycle | 0.000 |
| Structure Solution | Direct Methods (SHELX97) |

【 手続補正書 】

【 提出日 】平成22年4月30日(2010.4.30)

【 手続補正 1 】

【 補正対象書類名 】特許請求の範囲

【 補正対象項目名 】全文

【 補正方法 】変更

【 補正の内容 】

【 特許請求の範囲 】

【 請求項 1 】


一般式(1)：



[式中、Rは置換基を有してもよい炭化水素基であり、該炭化水素基の炭素 - 炭素結合の間に - O - で示される基を有してもよく、Ar'は置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基である。]

で表される芳香族化合物の製造方法であって、鉄化合物及び一般式(4)：

【 化 1 】



[式中、Qは置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の2個の水素原子(H)を除いた2価の基であり、Arは同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシ


リル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有するアリール基、又はハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物からなるクロスカップリング反应用触媒の存在下、一般式(2)：



[式中、Xはハロゲン原子を示し、Rは前記に同じ。]

で表される化合物と、一般式(3)：



[式中、Yはハロゲン原子を示し、Ar'は前記に同じ。]

で表されるマグネシウム試薬を反応させることを特徴とする製造方法。

【請求項2】

前記鉄化合物が、二価若しくは三価の鉄塩、又はその溶媒和物である請求項1に記載の製造方法。

【請求項3】

前記一般式(4)において、Arが式：

【化2】




[式中、R¹は同一又は異なって、F、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、又はトリアリールシリル基を示し、n₁は1～5の整数、n₂は1～4の整数を示す。]

で表される基である請求項1又は2に記載の製造方法。

【請求項4】

前記一般式(4)において、Arが式：

【化3】



[式中、R¹¹、R¹²及びR¹³は同一又は異なって、H、C₁～C₆アルキル基、C₁～C₆アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示し、R¹¹、R¹²及びR¹³の全てがHの場合を除く。]

で表される基である請求項1又は2に記載の製造方法。


【請求項5】

前記一般式(4)のArにおいて、R¹²がHであり、R¹¹及びR¹³が同一又は異なってC₁～C₆アルキル基、又はトリアルキルシリル基である請求項4に記載の製造方法。

【請求項6】

前記一般式(4)において、Qが式：

【化 4】




で表される 2 価の基である項 1 ~ 5 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 7】

鉄化合物及び一般式 (4) :

【化 5】




[式中、Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 価の基であり、Ar は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有するアリール基、又はハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物からなる触媒。

【請求項 8】

前記一般式 (4) において、Ar が式 :

【化 6】




[式中、R¹ は同一又は異なって、F、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、又はトリアリールシリルを示し、n₁ は 1 ~ 5 の整数、n₂ は 1 ~ 4 の整数を示す。]

で表される基である請求項 7 に記載の触媒。

【請求項 9】

前記一般式 (4) において、Ar が式 :

【化 7】



[式中、R¹¹、R¹² 及び R¹³ は同一又は異なって H、C₁ ~ C₆ アルキル基、C₁ ~ C₆ アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示す。但し、R¹¹、R¹² 及び R¹³ の全てが H の場合を除く。]

で表される基である請求項 7 に記載の触媒。


【請求項 10】

前記一般式(4)の Ar において、R^{1 2} が H であり、R^{1 1} 及び R^{1 3} が同一又は異なって C₁ ~ C₆ アルキル基、又はトリアルキルシリル基である請求項 9 に記載の触媒。

【請求項 11】

前記一般式(4)において、Q が式：

【化 8】




で表される 2 価の基である請求項 7 ~ 10 のいずれかに記載の触媒。

【請求項 12】

一般式(5)：

【化 9】




[式中、X¹ はハロゲン原子を示す。q は 1、2 又は 3 を示す。r は 1 又は 2 を示す。Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 価の基であり、Ar は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有するアリール基、又はハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表される錯体。

【請求項 13】

一般式(4)：

【化 10】




[式中、Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 価の基であり、Ar は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有するアリール基、又はハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物。

【請求項 1 4】

一般式 (4) :


【化 1 1】



[式中、Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 価の基であり、Ar は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有するアリール基、又はハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物の製造方法であって、一般式 (6) :

【化 1 2】



[式中、X² はハロゲン原子を示し、Q は前記に同じ。]

で表される化合物に、一般式 (7) :




[式中、M は Li 又は式 : Mg Y¹ で示される基であり、Y¹ はハロゲン原子を示す。Ar は前記に同じ。]

で表される金属試薬を反応させることを特徴とする製造方法。

【請求項 1 5】

一般式 (4) 及び (6) において、Q が式 :

【化 1 3】



で示される基である請求項 1 4 に記載の製造方法。

【請求項 1 6】


一般式 (8) :




[式中、R は、置換基を有してもよい炭化水素基であり、該炭化水素基の炭素 - 炭素結合の間に - O - で示される基を有してもよく、Ar'' は、置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基である。]

で表される芳香族化合物の製造方法であって、鉄化合物及び一般式 (4 a) :

【化 1 4】

[式中、Ar¹ は同一又は異なって式：

【化 1 5】




で表される基であり、R¹¹、R¹² 及び R¹³ は同一又は異なって H、C₁ ~ C₆ アルキル基、C₁ ~ C₆ アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示す。但し、R¹¹、R¹² 及び R¹³ の全てが H の場合を除く。]

で表されるビスホスフィン化合物からなるクロスカップリング反応用触媒の存在下、一般式 (2)：



[式中、X はハロゲン原子を示し、R は前記に同じ。]

で表される化合物と、一般式 (9)：




[式中、Mtl は亜鉛 (Zn)、ホウ素 (B) 又はアルミニウム (Al) を示し、Ar'' は前記に同じ。]

で表される結合を有する有機金属試薬を反応させることを特徴とする製造方法。


【請求項 17】

一般式 (4a) で表されるビスホスフィン化合物が、一般式 (4b)：

【化 1 6】

[式中、Ar² は式：

【化 1 7】



で表される基であり、R¹¹⁰ 及び R¹³⁰ は同一又は異なって、C₁ ~ C₆ アルキル基、C₁ ~ C₆ アルコキシ基、又はトリ (C₁ ~ C₆) アルキルシリル基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物である請求項 16 に記載の製造方法。

【請求項 18】

前記鉄化合物が、二価若しくは三価の鉄塩、又はその溶媒和物である請求項 16 又は 17 に記載の製造方法。

【請求項 19】

前記 R¹¹⁰ 及び R¹³⁰ が tert-ブチル又はトリメチルシリルである請求項 16、17 又は 18 に記載の製造方法。

【手続補正書】

【提出日】平成23年1月6日(2011.1.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更


【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

一般式(4)：

【化 1】




[式中、Qは置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の2個の水素原子(H)を除いた2個の基であり、Arは同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有するアリール基、又はハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物。

【請求項 2】


一般式(4a)：

【化 2】



[式中、Ar¹は同一又は異なって式：

【化 3】




で表される基であり、R¹¹、R¹²及びR¹³は同一又は異なってH、C₁~C₆アルキル基、C₁~C₆アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示す。但し、R¹¹、R¹²及びR¹³の全てがHの場合を除く。]

で表される請求項 1 に記載のビスホスフィン化合物。

【請求項 3】

一般式 (4) :


【化 4】



[式中、Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 個の基であり、Ar は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有するアリール基、又はハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物の製造方法であって、一般式 (6) :

【化 5】



[式中、X² はハロゲン原子を示し、Q は前記に同じ。]

で表される化合物に、一般式 (7) :




[式中、M は Li 又は式 : Mg Y¹ で示される基であり、Y¹ はハロゲン原子を示す。Ar は前記に同じ。]

で表される金属試薬を反応させることを特徴とする製造方法。

【請求項 4】

一般式 (4) 及び (6) において、Q が式 :

【化 6】




で示される基である請求項 3 に記載の製造方法。

【請求項 5】

鉄化合物及び一般式 (4) :

【化 7】



[式中、Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 個の基であり、Ar は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれ


る置換基を有するアリール基、又はハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物からなる触媒。

【請求項6】

前記一般式(4)において、Arが式：

【化8】




[式中、R¹は同一又は異なって、F、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、又はトリアリールシリルを示し、n₁は1~5の整数、n₂は1~4の整数を示す。]

で表される基である請求項5に記載の触媒。

【請求項7】

前記一般式(4)において、Arが式：

【化9】



[式中、R¹¹、R¹²及びR¹³は同一又は異なってH、C₁~C₆アルキル基、C₁~C₆アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示す。但し、R¹¹、R¹²及びR¹³の全てがHの場合を除く。]

で表される基である請求項5に記載の触媒。


【請求項8】

前記一般式(4)のArにおいて、R¹²がHであり、R¹¹及びR¹³が同一又は異なってC₁~C₆アルキル基、又はトリアルキルシリル基である請求項7に記載の触媒。

【請求項9】

前記一般式(4)において、Qが式：

【化10】




で表される2価の基である請求項5~8のいずれかに記載の触媒。

【請求項10】

一般式(5)：

【化11】



[式中、 X^1 はハロゲン原子を示す。q は 1、2 又は 3 を示す。r は 1 又は 2 を示す。Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 価の基であり、Ar は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有するアリール基、又はハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表される錯体。

【請求項 1 1】


一般式 (1) :



[式中、R は置換基を有してもよい炭化水素基であり、該炭化水素基の炭素 - 炭素結合の間に - O - で示される基を有してもよく、Ar' は置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基である。]

で表される芳香族化合物の製造方法であって、鉄化合物及び一般式 (4) :

【化 1 2】



[式中、Q は置換基を有してもよいアリール環又は置換基を有してもよいヘテロアリール環から隣接する炭素原子上の 2 個の水素原子 (H) を除いた 2 価の基であり、Ar は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有するアリール基、又はハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基、及びトリアリールシリル基からなる群より選ばれる置換基を有してもよいヘテロアリール基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物からなるクロスカップリング反应用触媒の存在下、一般式 (2) :



[式中、X はハロゲン原子を示し、R は前記に同じ。]

で表される化合物と、一般式 (3) :



[式中、Y はハロゲン原子を示し、Ar' は前記に同じ。]

で表されるマグネシウム試薬を反応させることを特徴とする製造方法。


【請求項 1 2】

前記鉄化合物が、二価若しくは三価の鉄塩、又はその溶媒和物である請求項 1 1 に記載の製造方法。

【請求項 1 3】

前記一般式 (4) において、Ar が式 :

【化 1 3】




[式中、 R^1 は同一又は異なって、F、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアアリールシリル基、又はトリアアリールシリル基を示し、 n_1 は 1 ~ 5 の整数、 n_2 は 1 ~ 4 の整数を示す。]

で表される基である請求項 1 1 又は 1 2 に記載の製造方法。

【請求項 1 4】

前記一般式 (4) において、Ar が式：

【化 1 4】



[式中、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は同一又は異なって、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示し、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} の全てが H の場合を除く。]

で表される基である請求項 1 1 又は 1 2 に記載の製造方法。


【請求項 1 5】

前記一般式 (4) の Ar において、 R^{12} が H であり、 R^{11} 及び R^{13} が同一又は異なって $C_1 \sim C_6$ アルキル基、又はトリアルキルシリル基である請求項 1 4 に記載の製造方法。

【請求項 1 6】

前記一般式 (4) において、Q が式：

【化 1 5】



で表される 2 個の基である請求項 1 1 ~ 1 5 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 1 7】


一般式 (8) :



[式中、R は、置換基を有してもよい炭化水素基であり、該炭化水素基の炭素 - 炭素結合の間に - O - で示される基を有してもよく、 Ar'' は、置換基を有してもよいアリール基又は置換基を有してもよいヘテロアリール基である。]


で表される芳香族化合物の製造方法であって、鉄化合物及び一般式 (4 a) :

【化 1 6】



[式中、 Ar^1 は同一又は異なって式：

【化 17】




で表される基であり、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} は同一又は異なって H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基、又はトリアルキルシリル基を示す。但し、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} の全てが H の場合を除く。]

で表されるビスホスフィン化合物からなるクロスカップリング反应用触媒の存在下、一般式 (2) :



[式中、 X はハロゲン原子を示し、 R は前記に同じ。]

で表される化合物と、一般式 (9) :




[式中、 Mtl は亜鉛 (Zn)、ホウ素 (B) 又はアルミニウム (Al) を示し、 Ar'' は前記に同じ。]

で表される結合を有する有機金属試薬を反応させることを特徴とする製造方法。

【請求項 18】


一般式 (4a) で表されるビスホスフィン化合物が、一般式 (4b) :

【化 18】



[式中、 Ar^2 は式 :

【化 19】



で表される基であり、 R^{110} 及び R^{130} は同一又は異なって、 $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ基、又はトリ ($C_1 \sim C_6$) アルキルシリル基を示す。]

で表されるビスホスフィン化合物である請求項 17 に記載の製造方法。

【請求項 19】

前記鉄化合物が、二価若しくは三価の鉄塩、又はその溶媒和物である請求項 17 又は 18 に記載の製造方法。

【請求項 20】

前記 R^{110} 及び R^{130} が tert-ブチル又はトリメチルシリルである請求項 17、18 又は 19 に記載の製造方法。

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/054588

| | | |
|---|---|--|
| A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER C07C1/32(2006.01)i, B01J31/24(2006.01)i, C07C13/16(2006.01)i, C07C13/24(2006.01)i, C07C13/615(2006.01)i, C07C15/107(2006.01)i, C07F9/50(2006.01)i, C07B61/00(2006.01)n, C07F15/02(2006.01)n According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC | | |
| B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C07C1/32, B01J31/24, C07C13/16, C07C13/24, C07C13/615, C07C15/107, C07F9/50, C07B61/00, C07F15/02 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2009 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2009 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2009 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAplus (STN), REGISTRY (STN), JSTPlus (JDreamII), JST7580 (JDreamII) | | |
| C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
| X | Takayuki KONDO et al., "Fluoro Allyl Kinzoku Hannozaai to Hologen-ka Alkyl tonu Tetsu Shokubai ni yoru Cross Coupling Hanno", CSJ: The Chemical Society of Japan Koen Yokoshu, 12 March, 2007 (12.03.07), Vol.87th, No.2, page 1061 | 1-3, 6-8, 11, 12 4, 5, 9, 10 |
| A | | |
| X | Masao Iwamoto, et al., Reaction of Butadiene with Ethylene. II. NewCatalytic Systems in Synthesis of 1,4-Hexadiene, Journal of Organic Chemistry, Vol.31, No.12, 1966, p.4290-4291 | 6-8, 11, 12 9, 10 |
| A | | |
| X | ROSA, P. et al, Heat- and light-induced spin transition of an iron(II) polymer containing the 1,2,4,5-tetrakis(diphenylphosphanyl) benzene ligand, European Journal of Inorganic Chemistry, 2004, No.15, p.3017-3019 | 12 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. | | <input type="checkbox"/> See patent family annex. |
| * Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed | | "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family |
| Date of the actual completion of the international search 22 May, 2009 (22.05.09) | | Date of mailing of the international search report 02 June, 2009 (02.06.09) |
| Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office | | Authorized officer |
| Facsimile No. | | Telephone No. |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/054588

| | |
|--|--|
| Box No. II | Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet) |
| <p>This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).</p> | |
| Box No. III | Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet) |
| <p>This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: See extra sheet.</p> <p>1. <input type="checkbox"/> As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.</p> <p>3. <input checked="" type="checkbox"/> As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.: 1 - 1.2</p> <p>4. <input type="checkbox"/> No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:</p> <p>Remark on Protest</p> <p><input type="checkbox"/> The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, payment of a protest fee.</p> <p><input type="checkbox"/> The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No protest accompanied the payment of additional search fees.</p> | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/054588

Continuation of Box No.III of continuation of first sheet(2)

The "cross-coupling reaction catalyst comprising an iron compound and a bisphosphine compound represented by general formula (4) (including a bisphosphine compound having an unsubstituted phenyl group as the group Ar in the formula)" recited in claims 7-11 is particularly suitable for the process according to claims 1-6, and the complex claimed in claim 12 can also be used as the cross-coupling catalyst. Therefore, the common matter among the inventions of claims 1-12 resides in this matter. However, the cross-coupling reaction catalyst is known, as disclosed in Documents 1 and 2 shown below. Therefore, the matter cannot be regarded as a special technical feature which makes a contribution over the prior art.

With taking this fact into consideration, it is considered at the present stage that the present application includes at least six groups of inventions.

(1) The inventions of claims 1-6 relate to "a production process using the above-mentioned cross-coupling reaction catalyst".

(2) The inventions of claims 7-11 relate to "the above-mentioned cross-coupling reaction catalyst".

(3) The invention of claim 12 relates to "a complex represented by general formula (5)".

(4) The invention of claim 13 relates to "a compound represented by general formula (4a)", and the special technical feature of the invention resides in a matter that specific substituent are excluded in the proviso.

(5) The invention (or inventions) of claim 14 (and claim 15) relates (or relate) to "a process for producing a compound represented by general formula (4)".

(6) The inventions of claims 16-19 relate to "a production process using a cross-coupling catalyst comprising an iron compound and a compound represented by general formula (4a)", and the special technical feature of the inventions resides in a matter that a compound represented by general formula (4a) having an unsubstituted phenyl group as the group Ar in the formula is excluded.

There is no technical relationship involving one or more of the same or corresponding special technical features among these inventions, and therefore these inventions cannot be regarded as being so linked to one another as to form a single general inventive concept.

In claim 15, there is found an expression "the process claimed in claim 13". However, the invention of claim 13 is an invention which claims a compound. Therefore, the expression is unclear, and it is understood that the expression is a clerical error and is correctly to be understood that claim 15 depends on claim 14.

Document 1: Takayuki KONDO et al., "Fluoro Allyl Kinzoku Hannozaai to Hologen-ka Alkyl tono Tetsu Shokubai ni yoru Cross Coupling Hanno", CSJ: The Chemical Society of Japan Koen Yokoshu, 12 March, 2007 (12.03.07), Vol.87th, No.2, p.1061

(On line 12-13 in the lower left column on p.1061 in this document, it is described that the cross-coupling reaction is carried out "in the presence of 1,2-bis(diphenylphosphinebenzene) and iron chloride (III)".

(continued to the next extra sheet)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/054588

Document 2: Masao Iwamoto, et al., Reaction of Butadiene with Ethylene.
II. New Catalytic Systems in Synthesis of 1,4-Hexadiene,
Journal of Organic Chemistry, Vol.31, No.12, 1966,
p.4290-4291

(In Run No.14 shown in Table on p.4291, a catalyst comprising an
iron halide and PDP is described.)

| 国際調査報告 | | 国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 5 4 5 8 8 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. C07C1/32(2006.01)i, B01J31/24(2006.01)i, C07C13/16(2006.01)i, C07C13/24(2006.01)i, C07C13/615(2006.01)i, C07C15/107(2006.01)i, C07F9/50(2006.01)i, C07B61/00(2006.01)n, C07F15/02(2006.01)n | | | | | | | | | | | |
| B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. C07C1/32, B01J31/24, C07C13/16, C07C13/24, C07C13/615, C07C15/107, C07F9/50, C07B61/00, C07F15/02 | | | | | | | | | | | |
| 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2009年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2009年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2009年</td> </tr> </table> | | | | 日本国実用新案公報 | 1922-1996年 | 日本国公開実用新案公報 | 1971-2009年 | 日本国実用新案登録公報 | 1996-2009年 | 日本国登録実用新案公報 | 1994-2009年 |
| 日本国実用新案公報 | 1922-1996年 | | | | | | | | | | |
| 日本国公開実用新案公報 | 1971-2009年 | | | | | | | | | | |
| 日本国実用新案登録公報 | 1996-2009年 | | | | | | | | | | |
| 日本国登録実用新案公報 | 1994-2009年 | | | | | | | | | | |
| 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CAplus (STN), REGISTRY (STN), JSTPlus (JDreamII), JST7580 (JDreamII) | | | | | | | | | | | |
| C. 関連すると認められる文献 | | | | | | | | | | | |
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求項の番号 | | | | | | | | | |
| X A | 近藤 貴之 他, フルオロアリアル金属反応剤とハロゲン化アルキルとの鉄触媒によるクロスカップリング反応, 日本化学会講演予稿集, 2007.03.12, Vol. 87th, No. 2, p. 1061 | 1-3, 6-8 , 11, 12 4, 5, 9, 10 | | | | | | | | | |
| X A | Masao Iwamoto, et al., Reaction of Butadiene with Ethylene. II. NewCatalytic Systems in Synthesis of 1,4-Hexadiene, Journal of Organic Chemistry, Vol. 31, No. 12, 1966, p. 4290-4291 | 6-8, 11, 12 9, 10 | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。 | | | | | | | | | | | |
| * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 | | の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献 | | | | | | | | | |
| 国際調査を完了した日 22.05.2009 | | 国際調査報告の発送日 02.06.2009 | | | | | | | | | |
| 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | | 特許庁審査官 (権限のある職員) 宮田 和彦 | 4H 3971 | | | | | | | | |
| | | 電話番号 03-3581-1101 | 内線 3443 | | | | | | | | |

国際調査報告

国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 5 4 5 8 8

| C (続き) . 関連すると認められる文献 | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求項の番号 |
| X | ROSA, P. et al, Heat- and light-induced spin transition of an iron(II) polymer containing the 1,2,4,5-tetrakis(diphenylphosphanyl)benzene ligand, European Journal of Inorganic Chemistry, 2004, No. 15, p. 3017-3019 | 12 |

国際調査報告

国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 5 4 5 8 8

第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. 請求項 _____ は、この国際調査機関が調査することを要しない対象に係るものである。つまり、

2. 請求項 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、

3. 請求項 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第III欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

特別ページ参照

1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求項について作成した。
2. 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求項について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求項のみについて作成した。
請求項1-12
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求項について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、出願人から異議申立てがあった。
- 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあったが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間内に支払われなかった。
- 追加調査手数料の納付はあったが、異議申立てはなかった。

様式PCT/ISA/210 (第1ページの続葉(2)) (2007年4月)

請求項7～11に係る発明の「鉄化合物と一般式(4)で表されるビスホスフィン化合物(式中Arが無置換のフェニル基の場合を含む)からなるクロスカップリング反应用触媒」は、請求項1～6に係る発明の製造方法のために特に適したものであり、請求項12に係る発明の錯体も、前記クロスカップリング用触媒として用いることができるものであるから、請求項1～12に係る発明は、この点で共通する技術的特徴を有するが、前記クロスカップリング反应用触媒は、以下文献1, 2に記載されているように公知のものであるから、この点を先行技術に対して貢献する特別な技術的特徴であるとは認められない。

そしてこの点を考慮すると、本願には以下の通り現時点で少なくとも6つの発明が記載されていると認められる。

- (1) 請求項1～6に係る発明は、『前記クロスカップリング反应用触媒を用いる製造方法。』である。
- (2) 請求項7～11に係る発明は、『前記クロスカップリング反应用触媒。』である。
- (3) 請求項12に係る発明は、『一般式(5)で表される錯体』である。
- (4) 請求項13に係る発明は、『一般式(4a)で表される化合物。』であり、但し書きにおいて特定の置換基を除外している点に特別な技術的特徴を有する。
- (5) 請求項14(, 15)に係る発明は、『一般式(4)で表される化合物の製造方法。』である。
- (6) 請求項16-19に係る発明は、『鉄化合物及び一般式(4a)で表される化合物からなるクロスカップリング触媒を用いた製造方法。』であり、式中Arが無置換のフェニル基の場合を含まない点に特別な技術的特徴を有する。

これらの発明は、一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係がないから、単一の一般的発明概念を形成するように連関しているものとは認められない。

なお、請求項15には、「請求項13に記載の製造方法」との記載があるが、請求項13に係る発明は、化合物発明である点で不明瞭であり、請求項14の従属項の誤記であると解釈した。

文献1：近藤 貴之 他，フルオロアリアル金属反応剤とハロゲン化アルキルとの鉄触媒によるクロスカップリング反応，日本化学会講演予稿集，2007.03.12, Vol.87th, No.2, p.1061

p.1061の左下欄の1.12-13には、「1, 2-ビス(ジフェニルホスフィベンゼンと塩化鉄(III)の存在下)」クロスカップリング反応を行う記載がある。

文献2：Masao Iwamoto, et al., Reaction of Butadiene with Ethylene. II. NewCatalytic Systems in Synthesis of 1,4-Hexadiene, Journal of Organic Chemistry, Vol.31, No.12, 1966, p.4290-4291

p.4291のTableのRun No.14には、Iron halideとPDPからなる触媒が記載されている。

フロントページの続き

| (51) Int.Cl. | F I | テーマコード(参考) |
|--------------------------|----------------|------------|
| C 0 7 C 25/13 (2006.01) | C 0 7 C 25/13 | |
| C 0 7 C 17/263 (2006.01) | C 0 7 C 17/263 | |
| C 0 7 C 33/20 (2006.01) | C 0 7 C 33/20 | |
| C 0 7 C 29/32 (2006.01) | C 0 7 C 29/32 | |
| C 0 7 C 69/612 (2006.01) | C 0 7 C 69/612 | |
| C 0 7 C 67/343 (2006.01) | C 0 7 C 67/343 | |
| C 0 7 C 13/615 (2006.01) | C 0 7 C 13/615 | |
| C 0 7 F 9/50 (2006.01) | C 0 7 F 9/50 | |
| B 0 1 J 31/24 (2006.01) | B 0 1 J 31/24 | |
| C 0 7 F 15/02 (2006.01) | C 0 7 F 15/02 | |

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, K, E, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW


特許法第30条第1項適用申請有り

Fターム(参考) 4G169 AA06 AA08 AA09 BA21A BA21B BA21C BA27A BA27B BA27C BA36A
 BC04C BC10C BC66A BC66B BE05A BE05C BE26A BE26C BE27B BE32A
 BE32C BE33A BE33C BE37A BE37B BE37C BE38A BE38C CB59 CB65
 CB66 FA01 FB27 FB37 FB57 FC02
 4H006 AA02 AC24 BA19 BA48 BB15
 4H050 AA01 AA03 AB40

【要約の続き】

[式中、Xはハロゲン原子を示し、Rは前記に同じ。]

で表される化合物と、一般式(3) :



[式中、Yはハロゲン原子を示し、Ar'は前記に同じ。]

で表されるマグネシウム試薬を反応させることを特徴とする製造方法。

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。