

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02009/066447

発行日 平成23年4月7日 (2011.4.7)

(43) 国際公開日 平成21年5月28日 (2009.5.28)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C07H 19/04 (2006.01)	C07H 19/04 CSP	4B024
C07D 209/56 (2006.01)	C07D 209/56	4C057
C12N 15/09 (2006.01)	C12N 15/00 A	4C204

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 31 頁)

出願番号 特願2009-542477 (P2009-542477)	(71) 出願人 304024430 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 石川県能美市旭台一丁目1番地
(21) 国際出願番号 PCT/JP2008/003376	
(22) 国際出願日 平成20年11月19日 (2008.11.19)	
(31) 優先権主張番号 特願2007-299914 (P2007-299914)	(74) 代理人 100102668 弁理士 佐伯 憲生
(32) 優先日 平成19年11月19日 (2007.11.19)	(74) 代理人 100127133 弁理士 小坂橋 浩之
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)	(72) 発明者 藤本 健造 石川県能美市旭台一丁目1番地 国立大学 法人北陸先端科学技術大学院大学 マテリ アルサイエンス研究科内
	(72) 発明者 吉村 嘉永 石川県能美市旭台一丁目1番地 国立大学 法人北陸先端科学技術大学院大学 マテリ アルサイエンス研究科内


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光クロスリンク能を有する光応答性人工ヌクレオチド

(57) 【要約】

本発明は、ソラレンでは光架橋できない配列に対して架橋可能であって、ソラレンより長波長の光を用いて光架橋可能な光反応性架橋剤を提供する。本発明は、式 I で表される基と、式 I I で表される基とが結合してなる化合物を提供する。

【図4】




【特許請求の範囲】

【請求項 1】

次の式 I :

【化 2 1】



(I)

10

(ただし、式 I 中、R_aは、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C₂~C₇のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R₁及びR₂は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C₂~C₇のアルコキシカルボニル基、又は水素である。)

で表される基と、次の式 II :

式 II R_b -


(ただし、R_bは、水素、糖(糖は、リボース、及びデオキシリボースを含む)、多糖類(多糖類は、核酸のポリリボース鎖、及びポリデオキシリボース鎖を含む)、ポリエーテル、ポリオール、ポリペプチド鎖(ポリペプチド鎖は、ペプチド核酸のポリペプチド鎖を含む)、又は水溶性合成高分子である。)

で表される基とが結合してなる化合物。

【請求項 2】

R_bが、次の式 III 又は式 IV :


【化 2 2】



(III)

30

【化 2 3】



(IV)

40

で表される基、又は水素である、請求項 1 に記載の化合物。

【請求項 3】

請求項 1 ~ 2 の何れかに記載の化合物からなる、光反応性架橋剤。

【請求項 4】

塩基部分として、請求項 1 に記載の式 I (ただし、式 I 中、R_aは、シアノ基、アミド

50

基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R 1 及び R 2 は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素である。) で表される基を有するヌクレオシド。

【請求項 5】

請求項 4 に記載のヌクレオシドからなる、光反応性架橋剤。

【請求項 6】

塩基部分として、請求項 1 に記載の式 I (ただし、式 I 中、R a は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R 1 及び R 2 は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素である。) で表される基を有するヌクレオチド。 10

【請求項 7】

請求項 6 に記載のヌクレオチドからなる、光反応性架橋剤。

【請求項 8】

塩基部分として、請求項 1 に記載の式 I (ただし、式 I 中、R a は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R 1 及び R 2 は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素である。) で表される基を有する核酸類 (ただし、核酸類には、核酸及びペプチド核酸が含まれる)。

【請求項 9】

請求項 8 に記載の核酸類からなる、光反応性架橋剤。 20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、核酸類と架橋可能な光反応性の核酸塩基類似構造を有する光反応性架橋剤、及び該構造を塩基部分として備えた光クロスリンク能を有する光応答性人工ヌクレオチドに関する。

【背景技術】

【0002】

分子生物学の分野の基本的な技術に、核酸の連結がある。核酸の連結は、例えば、ハイブリダイゼーションと組みあわせて、遺伝子の導入や、塩基配列の検出のために使用される。そのために、核酸の連結は、分子生物学の基礎研究だけではなく、例えば、医療分野における診断や治療、あるいは治療薬や診断薬等の開発や製造、工業及び農業分野における酵素や微生物等の開発や製造に使用される極めて重要な技術である。 30

【0003】

核酸の連結は、例えば、DNA リガーゼ等を使用して従来から行われている。しかし、このような生体内の酵素反応を取り出した反応は、特別な条件設定を行わなければならない、さらに、使用される酵素類が比較的高価で、安定性に乏しい等の欠点を有する。このような欠点を克服するために、酵素類を使用しない核酸の連結の技術が研究されてきた。

【0004】

酵素類を使用しない核酸の連結の技術として、核酸と反応性のある有機化合物を使用する方法がある。近年、光反応を利用した核酸連結技術が、反応の時間的空間的な制御が自由であること、一般的な有機化学反応よりも緩和な条件で反応可能であること等の利点から、注目されるようになってきた。 40

このような光連結技術として、5 - シアノビニルデオキシウリジンを使用した光連結技術 (特許文献 1 : 特許第 3 7 5 3 9 3 8 号公報、特許文献 2 : 特許第 3 7 5 3 9 4 2 号公報) が知られている。

【0005】

核酸の連結と近似した重要な技術に、核酸の架橋がある。例えば、DNA や RNA の架橋反応は、細胞内の遺伝情報の流れを遮断して、遺伝子発現の阻害に使用される。DNA の架橋剤としては、光反応によって架橋を生じる光架橋剤 (光クロスリンク剤) としてソ 50

ラレンという化合物が古くから用いられている。光架橋剤であるソラレンを医薬品として服用して光照射を行う治療方法は、皮膚疾患である乾癬の標準的な治療方法の一つとして普及している。

【0006】

しかし、ソラレンの光架橋反応は、核酸二本鎖中の5' - T A - 3'配列に対して優先的に起こるために、使用できる対象が限定されているという問題がある。また、ソラレンの光連結波長は350 nmで、光開裂波長は250 nmであることから、ソラレンを光架橋剤として使用する場合には、短波長の光源を使用する必要があり、光照射によりDNAや細胞に損傷を与えやすいという問題がある。

【特許文献1】特許第3753938号公報

10

【特許文献2】特許第3753942号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

以上のような問題があるために、ソラレンでは光架橋できない配列に対して利用可能な光反応性架橋剤が求められていた。また、ソラレンと比較して、より長波長の光を用いて光架橋可能な光反応性架橋剤が求められていた。

【0008】

したがって、本発明の目的は、ソラレンでは光架橋できない配列に対して架橋可能な光反応性架橋剤を提供することにある。さらに、本発明の目的は、ソラレンと比較して、より長波長の光を用いて光架橋可能な光反応性架橋剤を提供することにある。

20

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明者は、光反応性架橋剤の探索研究を鋭意行ってきた結果、ソラレンでは光架橋できない配列に対して架橋可能な新規な光反応性架橋剤化合物を発見し、この光反応性架橋剤化合物によって上記目的を達成できることを見出した。

【0010】

この光反応性架橋剤化合物によれば、ソラレンでは光架橋できない配列に対して光照射による架橋を形成することができ、この架橋形成反応は、ソラレンと比較して、より長波長の光を用いて行うことができる。

30

【0011】

本発明に係る化合物は、カルバゾール構造にビニル基が付加された特徴的な構造を有しており、比較的小さなこの構造によって光架橋性を発揮しているために、ソラレンと同様に様々に修飾して多様な用途で使用することができる。さらに、本発明に係る化合物のこの特徴的な構造は、核酸の塩基に類似した構造を有しているために、人工塩基（人工核酸塩基）として使用することができる。すなわち、本発明に係る化合物の特徴的な構造を人工塩基として導入して、人工ヌクレオシド、及び人工ヌクレオチドを製造することができる。このような人工ヌクレオチドを配列中に含んだ人工核酸類を製造することができる。このような人工核酸類が、光反応によって架橋を形成すると、それは、二重らせんの一方の鎖からもう一方の鎖へと形成された光架橋（光クロスリンク）となるので、光反応性の核酸類は、所望の配列に特異的に反応可能な二重らせんの光クロスリンク剤として使用することができる。


40

【0012】

したがって、本発明は次の[1]～[9]にある。

[1] 次の式I：

【化 1】



10

(ただし、式 I 中、R a は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R 1 及び R 2 は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素である。)

で表される基と、次の式 I I :

式 I I R b -


(ただし、R b は、水素、糖 (糖は、リボース、及びデオキシリボースを含む)、多糖類 (多糖類は、核酸のポリリボース鎖、及びポリデオキシリボース鎖を含む)、ポリエーテル、ポリオール、ポリペプチド鎖 (ポリペプチド鎖は、ペプチド核酸のポリペプチド鎖を含む)、又は水溶性合成高分子である。)

20

で表される基とが結合してなる化合物。


[2] R b が、次の式 I I I 又は式 I V :

【化 2】



30

【化 3】



40

で表される基、又は水素である、[1] に記載の化合物。

[3] [1] ~ [2] の何れかに記載の化合物からなる、光反応性架橋剤。

[4] 塩基部分として、[1] に記載の式 I (ただし、式 I 中、R a は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、R 1 及び R 2 は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素である。) で表される基を有するヌクレオシド。

[5] [4] に記載のヌクレオシドからなる、光反応性架橋剤。

[6] 塩基部分として、[1] に記載の式 I (ただし、式 I 中、R a は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、R 1

50

及びR 2は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7のアルコキシカルボニル基、又は水素である。)で表される基を有するヌクレオチド。

[7] [6]に記載のヌクレオチドからなる、光反応性架橋剤。

[8] 塩基部分として、[1]に記載の式I (ただし、式I中、R aは、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、R 1及びR 2は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7のアルコキシカルボニル基、又は水素である。)で表される基を有する核酸類(ただし、核酸類には、核酸及びペプチド核酸が含まれる)。

[9] [8]に記載の核酸類からなる、光反応性架橋剤。

【 0 0 1 3 】

さらに、本発明は、次の[1 0] ~ [1 3]にもある。

[1 0] [1] ~ [2]の何れかに記載の化合物を使用して、ピリミジン環を有する核酸塩基との間に光架橋を形成する方法。

[1 1] [4]に記載のヌクレオチドを使用して、ピリミジン環を有する核酸塩基との間に光架橋を形成する方法。

[1 2] [6]に記載のヌクレオチドを使用してピリミジン環を有する核酸塩基との間に光架橋を形成する方法。

[1 3] [5]に記載の核酸類と、ピリミジン環を核酸塩基として有する他の核酸類とを、ハイブリダイズして二重らせんを形成させる工程、

形成された二重らせんに光照射する工程、
を含む、光架橋の形成方法。

【 0 0 1 4 】

さらに、本発明は、次の[1 4] ~ [1 7]にもある。

[1 4] [1] ~ [2]の何れかに記載の化合物の、ピリミジン環を有する核酸塩基との間に光架橋を形成するための使用。

[1 5] [4]に記載のヌクレオチドの、ピリミジン環を有する核酸塩基との間に光架橋を形成するための使用。

[1 6] [6]に記載のヌクレオチドの、ピリミジン環を有する核酸塩基との間に光架橋を形成するための使用。

[1 7] [5]に記載の核酸類の、ハイブリダイズして形成された二重らせんにおいてピリミジン環を核酸塩基として有する他の核酸類との間に光架橋を形成するための使用。

【発明の効果】

【 0 0 1 5 】

本発明によれば、ソラレンでは光架橋できない配列に対して光照射による架橋を形成することができる。すなわち、本発明では、架橋対象が5' - T A - 3'配列に限定されたソラレンでは使用できない配列中の塩基に対して、広く架橋を行うことができる。

【 0 0 1 6 】

さらに、本発明に係る化合物のカルバゾール構造にビニル基が付加された特徴的な構造は、人工的な核酸塩基として使用することができ、この人工塩基を含んだ特定の配列の核酸類を、これと相補的な配列の核酸類とハイブリダイズして二重らせんを形成することによって、相補的な配列の核酸類の特定の位置の塩基に対して、光架橋(光クロスリンク)を形成することができる。

【 0 0 1 7 】

したがって、本発明によれば、ソラレンでは光架橋できない種々の配列中の塩基に対して光架橋を形成できるばかりではなく、相補鎖を形成することによってある特定の配列中のある特定の位置の塩基に対して、光架橋を形成することができる。

【 0 0 1 8 】

さらに、本発明による架橋形成反応は、ソラレンと比較して、より長波長の光を用いて行うことができる。そのために、短波長の光源を使用することが回避できるために、光照射によってDNAや細胞に損傷を与える心配が少ない。

10

20

30

40

50

【0019】

さらに、本発明による架橋形成反応は、ソラレンと比較して、極めて短時間の光照射で行うことができる。すなわち、架橋形成が迅速に行われるために、反応の迅速性が要求される用途にも使用することができ、さらに光照射時間の短さの点からも、光照射によってDNAや細胞に損傷を与える心配が少ない。

【図面の簡単な説明】

【0020】

【図1】図1は3-Iodocarbazole-1'-deoxyriboseのNOESYスペクトルを表す図である。

【図2】図2はODN(XT)とODN(A^{CNV}K)の光クロスリンク反応実験のHPLC分析の結果を示すクロマトグラムである。

【図3】図3はODN(XC)とODN(G^{CNV}K)の光クロスリンク反応実験のHPLC分析の結果を示すクロマトグラムである。

【図4】図4はODN(A^{CNV}K)とODN(G^{CNV}K)との光架橋(光クロスリンク)反応の速さを比較したグラフである。

【図5】図5は^{CNV}Kを含むODNの配列特異性を検討した実験結果を表す図である。

【図6】図6はODN(A^{OMeV}K)とODN(GT)の光クロスリンク反応実験のHPLC分析の結果を示すクロマトグラムである。

【図7】図7はODN(G^{OMeV}K)とODN(GC)の光クロスリンク反応実験のHPLC分析の結果を示すクロマトグラムである。

【図8】図8はODN(A^{OHV}K)とODN(GT)の光クロスリンク反応実験のHPLC分析の結果を示すクロマトグラムである。

【図9】図9はODN(G^{OHV}K)とODN(GC)の光クロスリンク反応実験のHPLC分析の結果を示すクロマトグラムである。

【図10】図10はODN(A^{CNV}K)、ODN(A^{OMeV}K)、及びODN(A^{OHV}K)の光クロスリンク反応の速さを比較したグラフである。

【図11】図11はODN(A^{CNV}K-GT)に光照射してHPLC分析した結果を示すクロマトグラムである。

【図12】図12はODN(G^{CNV}K-GC)に光照射してHPLC分析した結果を示すクロマトグラムである。

【発明を実施するための最良の形態】


【0021】

本発明を、以下に詳細に説明する。本発明は以下の具体的な実施の形態に限定されるものではない。

【0022】

本発明は、次の式I:

【化4】



(I)

(ただし、式I中、R_aは、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C₂~C₇のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R₁及びR₂は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C₂~C₇

10

20

30

40

50

のアルコシカルボニル基、又は水素である。)

で表される基と、次の式 I I :

式 I I R b -


(ただし、R b は、水素、糖(糖は、リボース、及びデオキシリボースを含む)、多糖類(多糖類は、核酸のポリリボース鎖、及びポリデオキシリボース鎖を含む)、ポリエーテル、ポリオール、ポリペプチド鎖(ポリペプチド鎖は、ペプチド核酸のポリペプチド鎖を含む)、又は水溶性合成高分子である。)

で表される基とが結合してなる化合物にある。

【0023】

すなわち、本発明は、上記式 I で表される基及び式 I I で表される基を結合させた次の式 V :

【化5】



(ただし、式 V 中の、R a、R 1、R 2、R b は、式 I 及び式 I I について上述した通りである。)

で表される化合物にある。

【0024】

本発明に係る上記化合物は、ソラレンでは光架橋できない配列に対して光照射による架橋を形成することができ、さらに、ソラレンと比較してより長波長の光を用いて光架橋反応を行うことができる

【0025】

R a は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、アルコシカルボニル基、又は水素であり、好ましくは、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、アルコシカルボニル基、又は水素であり、さらに好ましくは、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、又はアルコシカルボニル基である。アルコシカルボニル基は、好ましくは C 2 ~ C 7、さらに好ましくは C 2 ~ C 6、さらに好ましくは C 2 ~ C 5、さらに好ましくは C 2 ~ C 4、さらに好ましくは C 2 ~ C 3、特に好ましくは C 2 のものを使用することができる。

【0026】

R 1 及び R 2 は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、アルコシカルボニル基、又は水素であり、好ましくは、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、アルコシカルボニル基、又は水素であり、さらに好ましくは、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、又はアルコシカルボニル基である。アルコシカルボニル基は、好ましくは C 2 ~ C 7、さらに好ましくは C 2 ~ C 6、さらに好ましくは C 2 ~ C 5、さらに好ましくは C 2 ~ C 4、さらに好ましくは C 2 ~ C 3、特に好ましくは C 2 のものを使用することができる。

【0027】

R b は、水素、糖(糖は、リボース、及びデオキシリボースを含む)、多糖類(多糖類は、核酸のポリリボース鎖、及びポリデオキシリボース鎖を含む)、ポリエーテル、ポリオール、ポリペプチド鎖(ポリペプチド鎖は、ペプチド核酸のポリペプチド鎖を含む)、又は水溶性合成高分子である。

【0028】

10

20


30

40

50

好適な実施の態様において、R bとして水素を使用することができ、この場合における本発明に係る化合物は、次の式 V I :

【化 6】



(VI)


10

(ただし、式 V I 中の、R a、R 1、R 2、式 I について上述した通りである。) で表される。

【0029】

好適な実施の態様において、R bとしてリボースを使用することができ、この場合における本発明に係る化合物の一例は、次の式 V I I :

【化 7】



(VII)

20


30

(ただし、式 V I I 中の、R a、R 1、R 2、式 I について上述した通りである。) で表されるヌクレオシド (リボヌクレオシド) である。

【0030】

好適な実施の態様において、R bとしてデオキシリボースを使用することができ、この場合における本発明に係る化合物の一例は、次の式 V I I I :

【化 8】



10

(ただし、式 VII I 中の、 R_a 、 R_1 、 R_2 、式 I について上述した通りである。) で表されるヌクレオシド (デオキシリボヌクレオシド) である。

【0031】

本発明に係る化合物は、カルバゾール構造にビニル基が付加された特徴的な構造を光反応性の人工核酸塩基として有する核酸類 (光架橋性核酸類) として使用することによって、その核酸類と相補的な塩基配列を有する配列とハイブリダイズさせて二重らせんを形成させることができ、形成した二重らせんに照射を行うと、光架橋性核酸類の相補鎖のなかで本発明に係る光反応性の人工核酸塩基と対応して塩基対となるべき塩基から 1 塩基分だけ 3' 末端側にある塩基と光架橋を形成する。

20

【0032】

本発明に係る光反応性の人工核酸塩基が光架橋を形成可能である相手方の塩基は、ピリミジン環を有する塩基である。一方で、本発明に係る光反応性の人工核酸塩基は、プリン環を有する塩基とは光架橋を形成しない。すなわち、本発明に係る光架橋性の化合物は、天然の核酸塩基としては、シトシン、ウラシル、及びチミンに対して光架橋を形成し、一方で、グアニン及びアデニンに対しては光架橋を形成しないという、強い特異性を有している。

30

【0033】

本発明に係る光架橋剤化合物は、光反応性の人工核酸塩基として有する核酸類 (光架橋性核酸類) として使用することによって、その核酸類と相補的な塩基配列を有する配列とハイブリダイズさせて二重らせんを形成させることができるために、目的とする特定の配列に対してのみ光クロスリンク反応を行わせることができる。すなわち、本発明に係る光架橋剤化合物は、ソラレンなどの従来の光架橋剤では不可能であった、非常に高い配列選択性を、所望に応じて配列設計して、付与することができる。

40

【0034】

さらに、本発明による光架橋剤化合物は、光反応性の人工核酸塩基として有する核酸類 (光架橋性核酸類) として使用して、その核酸類と相補的な塩基配列を有する配列とハイブリダイズさせて二重らせんを形成させる場合に、光架橋性核酸類の相補鎖のなかで本発明に係る光反応性の人工核酸塩基と塩基対となるべき塩基については、特段の制約がなく自由に選択できる。

【0035】

本発明における核酸類とは、核酸及びペプチド核酸 (PNA) を含み、さらにモノヌクレオチドを含む。核酸としては、天然の核酸である DNA 及び RNA が含まれ、さらに、非天然 (人工) の核酸である LNA (BNA) 等の修飾核酸が含まれる。

50

【0036】

光架橋のために照射される光は、一般に350～380nmの範囲、好ましくは360～370nmの範囲、さらに好ましくは366nmの波長を含む光が好ましく、特に好ましくは、366nmの単波長のレーザー光である。

【0037】

本発明に係る光架橋剤化合物は、他の核酸（核酸類）と光照射によって光架橋した後に、さらに光照射によって光開裂をすることができる。すなわち、本発明に係る光架橋剤化合物は、可逆的な光架橋を可能とするものであり、可逆的な光架橋剤として使用することができる。

【0038】

光開裂のために照射される光は、一般に330～370nmの範囲、好ましくは330～360nmの波長を含む光を使用することができる。また、好適な実施の態様において、366nmの波長を含む光、特に好ましくは、366nmの単波長のレーザー光を使用することができる。

10

【0039】

好適な実施の態様において、本発明による光架橋及び光開裂の光反応は、350～370nmの範囲の波長を含む光の照射によって行うことができ、好ましくは366nmの単波長のレーザー光を使用して行うことができる。この範囲の波長の光を使用すれば、同一の光源によって光架橋及び光開裂の光反応のいずれをも行うことができ、2種の光源を用意する必要がない点で有利である。この範囲の波長の光を使用する場合には、温度条件によって、光架橋、及び光開裂のいずれの光反応が進行するかを制御することができる。光架橋反応を進行させるためには、一般に0～50℃、好ましくは0～40℃、さらに好ましくは0～30℃、さらに好ましくは0～20℃、さらに好ましくは0～10℃、さらに好ましくは0～5℃の範囲の温度、特に好ましくは0℃で光照射を行う。光開裂反応を進行させるためには、一般に60～100℃、好ましくは60～90℃、さらに好ましくは70～90℃の範囲の温度で光照射を行う。

20

【0040】

本発明による光架橋及び光開裂は、光反応を利用しているために、pH、温度、塩濃度などに特段の制約がなく、核酸類等の生体高分子が安定に存在可能なpH、温度、塩濃度とした溶液中で、光照射によって行うことができる。

【0041】

本発明による光架橋及び光開裂は、極めて迅速に進行し、例えば、ソラレンであれば数時間を要する条件（350nm光照射）において、わずか1秒間（366nm光照射）で光反応が進行する。すなわち、本発明に係る光架橋剤を使用すれば、数秒間、例えば、1～9秒間、1～7秒間、1～5秒間、又は1～3秒間の時間の光照射によって、光反応を進行させて光架橋を形成されることができる。

30

【実施例】

【0042】

本発明を、実施例を挙げて以下に説明する。本発明は、以下の実施例に限定されるものではない。


【0043】

40

[1. ビニルカルバゾールを塩基部位に持つODNの合成]

次のScheme 1に従い合成を進めた。以下の説明において、化合物に付した番号で化合物を表す場合がある。

【化9】



Scheme 1

【0044】

[3-Iodocarbazole (1)]

carbazole (2.50 g, 15.0 mmol) のエタノール溶液 (500 mL) に NaIO_4 (0.80 g, 3.75 mmol) と I_2 (1.89 g, 7.45 mmol) を順に加えた後、 H_2SO_4 (1.60 mL, 30.0 mmol) のエタノール溶液 (100 mL) を加えて、反応溶液を 65°C で1時間環流した。TLC (HexH : AcOEt = 4 : 1) で原料の消失を確認し、 NaOH (1.4 g) のエタノール溶液 (100 mL) を加えて中和した。エタノールを除去した後、反応溶液をクロロホルムで2回抽出し、水で2回洗浄した。有機相を Na_2SO_4 で乾燥し、溶媒を除去した。カラムクロマトグラフィー (HexH : AcOEt = 4 : 1) で精製し、白色粉末として1 (3.06 g, 70%) を得て、白色粉末として3,6-diiiodocarbazole (0.47 g, 7.5%) を得た。

1: $^1\text{H NMR}$ (DMSO- d_6) 11.4 (s, 1H), 8.49 (d, 1H, $J = 1.7$ Hz), 8.14 (d, 1H, $J = 8.0$ Hz), 7.62 (dd, 1H, $J = 8.4, 1.7$ Hz), 7.48 (d, 1H, $J = 8.0$ Hz), 7.40 (m, 1H), 7.33 (d, 2H, $J = 8.4$ Hz), 7.16 (m, 1H).

3,6-Diiiodocarbazole: $^1\text{H NMR}$ (DMSO- d_6) 11.5 (s, 1H), 8.56 (d, 2H, $J = 1.7$ Hz), 7.65 (dd, 2H, $J = 8.5, 1.7$ Hz), 7.34 (d, 2H, $J = 8.5$ Hz).

【0045】

[3-Cyanovinylcarbazole (2)]

Triphenylphosphine (139 mg, 0.53 μ mol) のジオキサン溶液 (10 mL) に Palladium acetate (40.0 mg, 0.18 μ mol) と Triethylamine (0.59 μ L, 4.23 mmol) を順に加えて、75 °C で 5 分間攪拌した。1 (1.03 g, 3.52 mmol) のジオキサン溶液 (15 mL) と Acrylonitrile (0.46 μ L, 7.04 mmol) を加えて、反応溶液を 11.5 時間環流した。TLC (HexH : AcOEt = 4 : 1) で生成物を確認した後、綿ろ過で Palladium 粉末を取り除いた。カラムクロマトグラフィー (HexH : AcOEt = 4 : 1) で精製し、白色粉末として 2 (0.14 g, 18%, trans : cis = 97 : 3) を得て、白色粉末として 1 (0.37 g, 回収率 37%) を回収した。

2: $^1\text{H NMR}$ (DMSO- d_6) 11.6 (s, 1H), 8.44 (s, 1H), 8.11 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 7.75 (d, 1H, J = 16.7 Hz), 7.69-7.72 (m, 1H), 7.40-7.52 (m, 3H), 7.19-7.24 (m, 1H), 6.36 (d, 1H, J = 16.7 Hz).

10

【 0 0 4 6 】

[3-Cyanovinylcarbazole-1' - -deoxyribose-3', 5' -di-(p-toluoyl)ester (3)]

KOH (0.22 g, 3.87 mmol) と TDA-1 (11 mg, 34 μ mol) のアセトニトリル溶液 (20 mL) に室温で 2 (0.26 g, 1.20 mmol) を加えて 20 分間攪拌した。反応溶液に Chlorosugar (0.53 g, 1.24 mmol) を加えて室温で 20 分間攪拌し、TLC (HexH : AcOEt = 4 : 1) で原料の消失を確認した。沈殿物を除去した後、カラムクロマトグラフィー (CHCl_3) で精製し、黄色オイルとして 3 (0.23 g, 33%) を得た。

3: $^1\text{H NMR}$ (CDCl_3) 8.09 (s, 1H), 8.02 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 7.98 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 7.62-7.65 (m, 1H), 7.62 (d, 1H, J = 8.8 Hz), 7.49 (d, 1H, J = 16.5 Hz), 7.25-7.31 (m, 7H), 7.17-7.20 (m, 1H), 6.68 (dd, 1H, J = 9.3, 5.8 Hz), 5.78 (m, 1H), 5.76 (d, 1H, J = 16.5 Hz), 4.91 (dd, 1H, J = 12.4, 2.7 Hz), 4.78 (dd, 1H, J = 12.4, 3.3 Hz), 4.55-4.57 (m, 1H), 3.09-3.20 (m, 1H), 2.45-2.52 (m, 1H), 2.45 (s, 3H), 2.44 (s, 3H), HRMS (MALDI): calcd. for $\text{C}_{36}\text{H}_{30}\text{N}_2\text{O}_5\text{Na}$ [(M+ Na) $^+$] 593.2053, found 593.2018.

20

【 0 0 4 7 】

[3-Cyanovinylcarbazole-1' - -deoxyribose (4)]

3 (0.22 g, 0.39 mmol) のメタノール溶液 (20 mL) に 0.5 M methanolic NaOMe (2.3 mL, 1.2 mmol) と クロロホルム (5.0 mL) を加えて、反応溶液を室温で 3.5 時間攪拌した。TLC (CHCl_3 : MeOH = 9 : 1) で原料の消失を確認した。溶媒を除去した後、カラムクロマトグラフィー (CHCl_3 : MeOH = 9 : 1) で精製し、白色粉末として 4 (0.11 g, 81%) を得た。

30

4: $^1\text{H NMR}$ (CDCl_3) 8.12 (d, 1H, J = 1.7 Hz), 8.06 (d, 1H, J = 7.7 Hz), 7.59 (d, 1H, J = 9.1 Hz), 7.43-7.57 (m, 4H), 7.26-7.31 (m, 1H), 6.64 (dd, 1H, J = 8.2, 6.9 Hz), 5.87 (d, 1H, J = 16.5 Hz), 4.77-4.82 (m, 1H), 3.95-4.06 (m, 3H), 2.95 (dt, 1H, J = 14.0, 8.2 Hz), 2.30 (ddd, 1H, J = 14.0, 6.9, 3.3 Hz), HRMS (MALDI): calcd. for $\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ [(M+ Na) $^+$] 357.1215, found 357.1265.

【 0 0 4 8 】

[5' -O-(4,4' -dimethoxytrityl)-3-Cyanovinylcarbazole-1' - -deoxyribose (5)]

ピリジン (1.0 mL \times 2) で共沸した 4 (97 mg, 0.29 mmol) に ピリジン (0.5 mL) を加えた。反応溶液に 4,4' -dimethoxytritylchloride (118 mg, 0.35 mmol) と 4-(dimethylamino)pyridine (7.0 mg, 58 μ mol) のピリジン溶液 (1.0 mL) を加えて、反応溶液を室温で 18 時間攪拌した。TLC (CHCl_3 : MeOH = 95 : 5) で生成物を確認した後、ピリジンを除去した。カラムクロマトグラフィー (CHCl_3 : MeOH = 98 : 2) で精製し、黄色粉末として 5 (113 mg, 61%) を得た。

40

5: $^1\text{H NMR}$ (CDCl_3) 8.07 (d, 1H, J = 1.7 Hz), 8.02-8.05 (m, 1H), 7.71 (d, 1H, J = 8.5 Hz), 7.62-7.65 (m, 1H), 7.45-7.52 (m, 3H), 7.33-7.37 (m, 4H), 7.25-7.28 (m, 4H), 7.12 (dd, 1H, J = 8.8, 1.7 Hz), 6.81 (dd, 4H, J = 8.8, 1.7 Hz), 6.61 (dd, 1H, J = 8.2, 6.3 Hz), 5.77 (d, 1H, J = 16.7 Hz), 4.80-4.82 (m, 1H), 4.05-4.07 (m, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 3.56-3.58 (m, 2H), 2.89 (dt, 1H, J = 13.8, 8.2 Hz), 2.23 (ddd, 1H, J = 13.8, 6.3, 2.7 Hz), 1.98 (d, 1H, J = 3.6 Hz), HRMS (M

50

ALDI): calcd. for $C_{41}H_{36}N_2O_5Na$ [(M+ Na)⁺] 659.2522, found 659.2485.

【 0 0 4 9 】

[5' -O-(4,4' -dimethoxytrityl)-3-Cyanovinylcarbazole-1' - -deoxyriboside-3' -O-(cyano ethoxy-N,N-diisopropylamino)phosphoramidite (6)]

アセトニトリル(1.5 mL)で共沸した5 (0.11 g, 0.17 mol) にアセトニトリル(1.5 mL)を加えた。反応溶液に2-cyanoethyl-N,N,N',N' -tetraisopropylphosphorodiamidite (52 μ L, 0.17 mol) と0.45 M tetrazole のアセトニトリル溶液(0.37 mL, 0.17 mol) を加えて、反応溶液を室温で1.0 時間撹拌した。反応溶液を脱酢酸処理した酢酸エチルで2 回抽出し、Sat. $NaHCO_3$ aq. と H_2O で洗浄した。有機相を $MgSO_4$ で乾燥し、溶媒を除去した。黄色オイルの粗生成物である6 (0.12 g) をゴムシールボトルにアセトニトリルで移し3 回共沸した後、さらなる精製をせずにDNA 合成に使用した。

10

【 0 0 5 0 】

[3 -シアノビニルカルバゾール - 1' - -デオキシリボシド (^{CNV}K) を含有する ODN の合成] (Synthesis of ODN containing 3-cyanovinylcarbazole-1' - -deoxyriboside (^{CNV}K))

下記に示す^{CNV}K を含むODN を合成した。

ODN(A^{CNV}K): 5' -TGCA^{CNV}KCCGT-3'


ODN(G^{CNV}K): 5' -TGCG^{CNV}KCCGT-3'

ODN(C^{CNV}K): 5' -TGCC^{CNV}KCCGT-3'

ODN(T^{CNV}K): 5' -TGCT^{CNV}KCCGT-3'

20


【 化 1 0 】



30

次のScheme 2 に従い合成を進めた。

【化 1 1】



Scheme 2

【 0 0 5 1】

[3-Methoxycarbonylvinylcarbazole (7)]

Palladium acetate (38.0 mg, 0.17 μ mol) の DMF 溶液 (0.25 mL) に 1 (0.50 g, 1.71 mmol) と Tributylamine (0.41 μ L, 1.71 mmol) と Methyl acrylate (0.38 mL, 4.27 mmol) と H₂O (1.0 mL) を順に加えて、マイクロウェーブを用いて反応溶液を 160 °C で 10 分間反応して TLC で反応追跡したところ、1 の消失を確認した。桐山ろ過で Palladium 粉末を取り除いた後、カラムクロマトグラフィー (HexH : AcOEt = 3 : 1) で精製し、白色粉末として 7 (0.26 g, 62%) を得た。

7: ¹H NMR (CDCl₃) 8.26 (s, 1H), 8.21 (s, 1H), 8.07 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 7.89 (d, 1H, J = 15.9 Hz), 7.61 (dd, 1H, J = 1.7, 8.5 Hz), 7.39-7.44 (m, 3H), 7.23-7.29 (m, 1H), 6.47 (d, 1H, J = 15.9 Hz), 3.81 (s, 3H).

【 0 0 5 2】

[3-Methoxycarbonylcarbazole-1' - -deoxyribose-3', 5' -di-(p-toluenylester) (8)]

7 (0.55 g, 2.22 mmol) のアセトニトリル溶液 (49 mL) に室温で NaH (92.0 mg, 2.31 mmol) を加えて 10 分間攪拌した。反応溶液に Chlorosugar (1.14 g, 2.66 mmol) を加えて室温で 60 分間攪拌し、TLC (HexH : AcOEt = 4 : 1) で原料の消失を確認した。沈殿物を除

去した後、カラムクロマトグラフィー (HexH : AcOEt = 4 : 1) で精製し、白色粉末として8 (0.98 g, 71%)を得た。

【 0 0 5 3 】

[3-Methoxycarbonylcarbazole-1' - -deoxyriboside (9)]

8 (0.96 g, 1.59 mmol) のメタノール溶液 (46 mL) に 0.5 M methanolic NaOMe (9.6 mL, 4.8 mmol) とジクロロメタン (12 mL) を加えて、反応溶液を室温で1 時間攪拌した。TLC (C HCl₃ : MeOH = 9 : 1) で原料の消失を確認した。溶媒を除去した後、カラムクロマトグラフィー (CHCl₃ : MeOH = 9 : 1) で精製し、白色粉末として9 (0.28 g, 48%)を得た。
9: ¹H NMR (CDCl₃) 8.20 (s, 1H), 8.06 (d, 1H, J = 7.7 Hz), 7.86 (d, 1H, J = 15.9 Hz), 7.53-7.61 (m, 3H), 7.44 (t, 1H, J = 7.1 Hz), 7.24-7.27 (m, 1H), 6.63 (dd, 1H, J = 8.2, 7.0 Hz), 6.46 (d, 1H, J = 15.9 Hz), 4.75-4.80 (m, 1H), 3.95-4.04 (m, 3H), 3.81 (s, 1H), 2.95 (dt, 1H, J = 14.0, 8.2 Hz), 2.28 (ddd, 1H, J = 14.0, 7.0, 3.6 Hz).

10

【 0 0 5 4 】

[5' -O-(4,4' -dimethoxytrityl)-3-methoxycarbonylvinylcarbazole-1' - -deoxyriboside (10)]

ピリジン (1.0 mL × 2) で共沸した9 (0.23 g, 0.63 mmol) にピリジン (0.5 mL) を加えた。反応溶液に4,4' -dimethoxytritylchloride (0.26 g, 0.75 mmol) と4-(dimethylamino)pyridine (15.0 mg, 0.13 μmol) のピリジン溶液 (2.2 mL) を加えて、反応溶液を室温で16 時間攪拌した。TLC (CHCl₃ : MeOH = 95 : 5) で生成物を確認した後、ピリジンを除去した。カラムクロマトグラフィー (CHCl₃ : MeOH = 99 : 1) で精製し、黄色粉末として10 (0.21 g, 51%)を得た。

20

10: ¹H NMR (CDCl₃) 8.17 (s, 1H), 8.02-8.05 (m, 1H), 7.83 (d, 1H, J = 15.9 Hz), 7.62-7.66 (m, 3H), 7.46-7.49 (m, 2H), 7.34-7.38 (m, 4H), 7.25-7.28 (m, 4H), 7.15 (d, 1H, J = 8.8 Hz), 6.81 (dd, 4H, J = 8.8, 1.4 Hz), 6.61 (dd, 1H, J = 8.5, 6.3 Hz), 6.40 (d, 1H, J = 15.9 Hz), 4.76-4.80 (m, 1H), 4.05-4.09 (m, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 3.56-3.57 (m, 2H), 2.89 (dt, 1H, J = 14.0, 8.5 Hz), 2.18 (m, 1H), 2.17 (d, 1H, J = 3.8 Hz).

【 0 0 5 5 】

[5' -O-(4,4' -dimethoxytrityl)-3-methoxycarbonylvinylcarbazole-1' - -deoxyriboside-3' -O-(cyanoethoxy-N,N-diisopropylamino)phosphoramidite (11)]

30

アセトニトリル (1.0 mL) で共沸した10 (0.20 g, 0.29 μmol) にアセトニトリル (1.3 mL) を加えた。反応溶液に2-cyanoethyl-N,N,N',N' -tetraisopropylphosphorodiamidite (92 μL, 0.29 μmol) と0.45 M tetrazole のアセトニトリル溶液 (0.65 mL, 0.29 μmol) を加えて、反応溶液を室温で2 時間攪拌した。反応溶液を脱酢酸処理した酢酸エチルで2 回抽出し、Sat. NaHCO₃ aq. とH₂O で洗浄した。有機相をMgSO₄ で乾燥し、溶媒を除去した。黄色オイルの粗生成物である11 (0.25 g) をゴムシールボトルにアセトニトリルで移し3 回共沸した後、さらなる精製をせずにDNA 合成に使用した。

【 0 0 5 6 】

[修飾したODNの合成] (Synthesis of modified ODN)

40

ODN (AX) (5' -TGCA^{OHV}XCCGT-3' , X = 9) とODN (GX) (5' -TGCG^{OHV}XCCGT-3' , X = 9) はABI 3400 DNA 合成機を用いて合成した。それぞれ得られた反応混合物のCPG を二つに分けて、ひとつの反応混合物は0.4 M NaOH in H₂O : CH₃OH = 1 : 4 を用いて37 °C で17 時間インキュベートして脱保護し、2 M TEAA で中和した後凍結乾燥した。もうひとつの反応混合物は0.05 M K₂CO₃ in CH₃OH を用いて室温で17 時間インキュベートして脱保護し、2 M TEAA で中和した後凍結乾燥した。ODN (A^{OHV}K), ODN (G^{OHV}K), ODN (A^{OMeV}K), ODN (G^{OMeV}K) のDNA を逆相HPLC によって精製した。それぞれのDNA を酵素分解した。単離収率はそれぞれ5, 10, 11, 13%であった。分子量をMALDI-TOF-MS で測定した。

calcd. for ODN (A^{OHV}K), 5' -TGCA^{OHV}KCCGT-3' : [(M+H)⁺] 2801.93, found 2802.12.

calcd. for ODN (G^{OHV}K), 5' -TGCG^{OHV}KCCGT-3' : [(M+H)⁺] 2817.93, found 2818.08.

50

calcd. for ODN(A^{OMeV}K), 5' -TGCA^{OMeV}KCCGT-3' : [(M+H)⁺] 2815.95, found 2816.07.

calcd. for ODN(G^{OMeV}K), 5' -TGCG^{OMeV}KCCGT-3' : [(M+H)⁺] 2831.95, found 2831.98.


【 0 0 5 7 】

下記に示すNH₂VKを含むODNを合成した。

ODN(A^{NH₂V}K): 5' -TGCA^{NH₂V}KCCGT-3'

ODN(G^{NH₂V}K): 5' -TGCG^{NH₂V}KCCGT-3'

【 化 1 2 】



10

【 0 0 5 8 】

[2. ビニルカルバゾール塩基部位に持つヌクレオシドのNOESY スペクトル測定]

3-Iodocarbazole-1'-deoxyribose のNOESY スペクトルを測定した。そのNOESY スペクトルでは、H1' とH4' の間にクロスピークが見られた(図1)。3-iodocarbazole-1'-deoxyribose は、
体であると考えられる。

20


【 0 0 5 9 】

[3. ^{CNV}Kを含むODNを用いた光クロスリンク反応]

^{CNV}Kを含むODNを用いて光クロスリンク反応を行った(次のScheme 3参照)。ODN(A^{CNV}K) (20 μM)とODN(XT) (20 μM, X = A, G, C, T)の光クロスリンク反応を行った(sodium cacodylate 50 mM, NaCl 100 mM, total volume: 30 μL)。UV-LEDを用いて366 nm光を0 °Cで、1秒間照射した。その光反応物のHPLCの分析結果を図2に示す(elution with a solvent mixture of 50 mM ammonium formate, pH 7.0, linear gradient over 30 min from 3% to 20% acetonitrile)。ODN(XT)の存在下でODN(A^{CNV}K)に光照射を行い、
図2の(a)は照射前、(b)は366 nmで1秒間の照射後のHPLC分析を表す。

30

【 化 1 3 】




【 0 0 6 0 】

同様にして、Cが光クロスリンク部位となる^{CNV}Kを含むODNを用いて光クロスリンク反応を行った(次のScheme 4参照)。ODN(G^{CNV}K) (20 μM)とODN(XC) (20 μM, X = A, G, C, T)の光クロスリンク反応を行った(sodium cacodylate 50 mM, NaCl 100 mM, total volume: 30 μL)。UV-LEDを用いて366 nm光を0 °Cで、25秒間照射した。その光反応物のHPLCの分析結果を図3に示す。ODN(XC)の存在下でODN(G^{CNV}K)に光照射を行い、
図3の(a)は照射前、(b)は366 nmで25秒間の照射後のHPLC分析を表す。

40

【化 1 4】



【 0 0 6 1】

CNV^{K} を含むODN を用いて光クロスリンク反応では、光クロスリンク部位がT あるいはC のいずれの場合にも十分に光クロスリンク反応が進行した(図 4)。図 4 は、ODN($\text{A}^{\text{CNV}}\text{K}$) (塗りつぶした丸) とODN($\text{G}^{\text{CNV}}\text{K}$) (白抜きの丸)。との光架橋(光クロスリンク)反応の速さの比較をしたグラフである。

【 0 0 6 2】

[4. CNV^{K} を含むODN を用いた16 種類の光クロスリンク反応]

CNV^{K} を含むODN を用いて16 種類の光クロスリンク反応を行った。ODN($\text{A}^{\text{CNV}}\text{K}$), ODN($\text{G}^{\text{CNV}}\text{K}$), ODN($\text{C}^{\text{CNV}}\text{K}$), ODN($\text{T}^{\text{CNV}}\text{K}$) (10 μM) とODN(XT), ODN(XC), ODN(XG), ODN(XA) (X = A, G, C, T, 10 μM)の光クロスリンク反応を行った(sodium cacodylate 50 mM, NaCl 100 mM, total volume: 200 μL)。UV-LED を用いて366 nm 光を0 $^{\circ}\text{C}$ で、1 秒間照射してUPLC を用いて分析した(elution with a solvent mixture of 50 mM ammonium formate, pH 7.0, linear gradient over 3.4 min from 2% to 15% acetonitrile, column temperature 30 $^{\circ}\text{C}$)。その結果を図 5 に示す。

【 0 0 6 3】

16 種類の光クロスリンク反応を行った結果、以下のことが見いだされた。


光クロスリンク反応はクロスリンク相手がT とC である時に効率よく進行する。とくにT である時に1 s で定量的に反応が進行する。一方、A やG である時には反応が進行しなかった。

【 0 0 6 4】

[5. $\text{OMe}^{\text{V}}\text{K}$ または $\text{OH}^{\text{V}}\text{K}$ を含むODN を用いた光クロスリンク反応]

$\text{OMe}^{\text{V}}\text{K}$ を含むODN を用いて光クロスリンク反応を行った。ODN($\text{A}^{\text{OMe}^{\text{V}}}\text{K}$) (20 μM)とODN(GT) (20 μM)の光クロスリンク反応を行った(sodium cacodylate 50 mM, NaCl 100 mM, total volume: 105 μL)。UV-LED を用いて366 nm 光を0 $^{\circ}\text{C}$ で、0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 秒間照射した(次のScheme 5参照)。その光反応物のHPLC の分析結果を図 6 に示す(elution with a solvent mixture of 50 mM ammonium formate, pH 7.0, linear gradient over 30 min from 3% to 20% acetonitrile)。

【化 1 5】




10

【 0 0 6 5】

同様に、C が光クロスリンク部位となる^{OMeV}Kを含むODNを用いて光クロスリンク反応を行った。ODN(G^{OMeV}K) (20 μM)とODN(GC) (20 μM)の光クロスリンク反応を行った (sodium cacodylate 50 mM, NaCl 100 mM, total volume: 30 μL)。UV-LEDを用いて366 nm光を0 °Cで、180秒間照射した(Scheme 6)。その光反応物のHPLCの分析結果を図7に示す。

20

【化 1 6】




30

【 0 0 6 6】

^{OHV}Kを含むODNを用いて光クロスリンク反応を行った。ODN(A^{OHV}K) (20 μM)とODN(GT) (20 μM)の光クロスリンク反応を行った(sodium cacodylate 50 mM, NaCl 100 mM, total volume: 30 μL)。UV-LEDを用いて366 nm光を0 °Cで、1, 10, 25, 40, 60, 120, 180秒間照射した(次のScheme 7参照)。その光反応物のHPLCの分析結果を図8に示す。

40

【化 1 7】




10

【 0 0 6 7】

同様に、C が光クロスリンク部位となる^{OHV}K を含むODN を用いて光クロスリンク反応を行った。ODN(G^{OHV}K) (20 μM)とODN(GC) (20 μM)の光クロスリンク反応を行った (sodium cacodylate 50 mM, NaCl 100 mM, total volume: 30 μL)。UV-LED を用いて366 nm 光を0 °C で、180 秒間照射した (Scheme 8)。その光反応物のHPLC の分析結果を図9に示す。

20

【化 1 8】



30

【 0 0 6 8】

^{OMeV}K を含むODN を用いて光クロスリンク反応では、光クロスリンク部位がT の場合には10 秒間で光クロスリンク反応が終了した。C の場合には180 秒間で光クロスリンク反応が終了した。一方、^{OHV}K を含むODN を用いて光クロスリンク反応では、光クロスリンク部位がT の場合には180 秒間で光クロスリンク反応の収率は75%であった。C の場合には180 秒間で光クロスリンク反応が終了した。^{CNV}K と^{OMeV}K の経時変化を比較すると顕著な差が見られた (図 1 0)。図 1 0 は、ODN(A^{CNV}K) (塗りつぶした丸)、ODN(A^{OMeV}K) (白抜きの丸)、及びODN(A^{OHV}K) (塗りつぶした四角)の光クロスリンク反応の速さを比較したグラフである。

40

【 0 0 6 9】


[6. 光クロスリンク体の光開裂反応]

T またはC が光クロスリンク部位である光クロスリンク体ODN(A^{CNV}K-GT)あるいはODN(G

50

^{CNV}K-GC)を光反応によって調製してHPLC で分取した。そして、ODN(A^{CNV}K-GT) (20 μM)の光クロスリンク反応を行った(sodium cacodylate 50 mM, NaCl 100 mM, total volume: 30 μL)。トランスイルミネーターを用いて366 nm 光を70 °C で、5 分間照射した(次のScheme 9参照)。その光反応物のHPLC の分析結果を図 1 1 に示す。図 1 1 は、ODN (A^{CNV}K-GT)に0 で光照射してH P L Cで分析した結果を示しており、(a)は照射前、(b)は3 6 6 n mで5 分間の照射後である。

【化 1 9】



10


Scheme 9

【 0 0 7 0】

同様にして、ODN(G^{CNV}K-GC) の光クロスリンク反応を行った(sodium cacodylate 50 mM, NaCl 100 mM, total volume: 30 μL)。トランスイルミネーターを用いて366 nm 光を70 °C で、5 分間照射した(次のScheme 10参照)。その光反応物のHPLC の分析結果を図 1 2 に示す。光開裂反応では、光クロスリンク部位がT あるいはC の場合においてそれぞれ収率は29, 28% で進行した。^{CNV}K を含むODN を用いた光クロスリンク反応では、反応温度を変えることによって光可逆的な反応性を示した。図 1 2 は、ODN (G^{CNV}K-GC)に7 0 で光照射してH P L Cで分析した結果を示しており、(a)は照射前、(b)は3 6 6 n mで5 分間の照射後である。


20

【化 2 0】




Scheme 10


【 図 2 】




【 図 3 】




【 図 4 】




【 図 6 】




【 図 7 】




【 図 8 】




【 9 】




【 1 1 】





【 1 0 】




【 1 2 】



【 1 】



【 図 5 】



【 手続補正書 】

【 提出日 】 平成21年9月4日 (2009.9.4)

【 手続補正 1 】

【 補正対象書類名 】 特許請求の範囲

【 補正対象項目名 】 全文

【 補正方法 】 変更


【 補正の内容 】

【 特許請求の範囲 】

【 請求項 1 】

次の式 I :

【化 2 1】



(ただし、式 I 中、R a は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R 1 及び R 2 は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素である。)

で表される基と、次の式 I I :

式 I I R b -


(ただし、R b は、水素、糖 (糖は、リボース、及びデオキシリボースを含む)、多糖類 (多糖類は、核酸のポリリボース鎖、及びポリデオキシリボース鎖を含む)、ポリエーテル、ポリオール、ポリペプチド鎖 (ポリペプチド鎖は、ペプチド核酸のポリペプチド鎖を含む)、又は水溶性合成高分子である。)

で表される基とが結合してなる化合物からなる、光反応性架橋剤。


【請求項 2】

R b が、次の式 I I I 又は式 I V :

【化 2 2】



【化 2 3】



で表される基、又は水素である、請求項 1 に記載の化合物。

【請求項 3】

請求項 2 に記載の化合物からなる、光反応性架橋剤。

【請求項 4】

塩基部分として、請求項 1 に記載の式 I (ただし、式 I 中、R a は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R 1 及び R 2 は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素である。) で表される基を有するヌクレオシド。

【請求項 5】

請求項 4 に記載のヌクレオシドからなる、光反応性架橋剤。

【請求項 6】

塩基部分として、請求項 1 に記載の式 I (ただし、式 I 中、R a は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R 1 及び R 2 は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素である。) で表される基を有するヌクレオチド。

【請求項 7】

請求項 6 に記載のヌクレオチドからなる、光反応性架橋剤。

【請求項 8】

塩基部分として、請求項 1 に記載の式 I (ただし、式 I 中、R a は、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素であり、

R 1 及び R 2 は、それぞれ独立に、シアノ基、アミド基、カルボキシル基、C 2 ~ C 7 のアルコキシカルボニル基、又は水素である。) で表される基を有する核酸類 (ただし、核酸類には、核酸及びペプチド核酸が含まれる)。

【請求項 9】

請求項 8 に記載の核酸類からなる、光反応性架橋剤。

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2008/003376
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER C07H19/04(2006.01) i, C07D209/56(2006.01) i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C07H19/04, C07D209/56		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLus/REGISTRY (STN)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	LOPATSINKII V. P. et al., 3-Vinyl-9-alkylcarbazoles, Byul. Izobret. i Tovarnykh Znakov, 1963, vol.23, p.16: Chemical Abstracts, Vol.60, 1964, column11990b-c, the abstract No.68158	1
X	AOYAMA Tetsuya et al., Electro-optic effects in mono- and di-substituted carbazoles MCLC S&T, Section B: Nonlinear Optics, 1996, 15(1-4), pp.403-406	1
A	LIN L. et al., Photochemical inactivation of viruses and bacteria in platelet concentrates by use of a novel psoralen and longwavelength ultraviolet light Transfusion, 1997, 37(4), pp.423-435	1-9
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 18 December, 2008 (18.12.08)		Date of mailing of the international search report 13 January, 2009 (13.01.09)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2008/003376

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 3753938 B2 (Japan Science and Technology Agency), 08 March, 2006 (08.03.06), (Family: none)	1-9
A	JP 3753942 B2 (Japan Science and Technology Agency), 08 March, 2006 (08.03.06), & WO 2001/066556 A1	1-9
T	YOSHIMURA Yoshinaga et al., Ultrafast Reversible Photo-Cross-Linking Reaction: Toward in Situ DNA Manipulation Organic Letters, 2008, 10(15), pp.3227-3230	1-9

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2008/003376	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. C07H19/04(2006.01)i, C07D209/56(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. C07H19/04, C07D209/56			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CAPLUS/REGISTRY (STN)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X	LOPATSINKII V. P. et al., 3-Vinyl-9-alkylcarbazoles, Byul. Izobret. i Tovarnykh Znakov, 1963, vol.23, p.16; Chemical Abstracts, Vol.60, 1964, column11990b-c, the abstract No.68158	1	
X	AOYAMA Tetsuya et al., Electro-optic effects in mono- and di-substituted carbazoles MCLC S&T, Section B: Nonlinear Optics, 1996, 15(1-4), pp.403-406	1	
A	LIN L. et al., Photochemical inactivation of viruses and bacteria	1-9	
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献	
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの	
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの	
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)		「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの	
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」同一パテントファミリー文献	
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願			
国際調査を完了した日 18.12.2008		国際調査報告の発送日 13.01.2009	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 植原 克典	4 P 9840
		電話番号 03-3581-1101	内線 3492

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2008/003376
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	in platelet concentrates by use of a novel psoralen and longwavelength ultraviolet light Transfusion, 1997, 37(4), pp.423-435	
A	JP 3753938 B2 (独立行政法人科学技術振興機構) 2006.03.08 (ファミリーなし)	1-9
A	JP 3753942 B2 (独立行政法人科学技術振興機構) 2006.03.08 & WO 2001/066556 A1	1-9
T	YOSHIMURA Yoshinaga et al., Ultrafast Reversible Photo-Cross-Linking Reaction: Toward in Situ DNA Manipulation Organic Letters, 2008, 10(15), pp.3227-3230	1-9

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 鳥羽 慎也

富山県富山市高田529番地 エスシーワールド株式会社内

(72)発明者 新田 ゆかり

富山県富山市高田529番地 エスシーワールド株式会社内

Fターム(参考) 4B024 AA03 AA20 CA01

4C057 BB02 BB05 CC03 DD03 LL03

4C204 CB25 EB01 FB01 GB17 GB18 GB19 GB24

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。