

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第3718709号
(P3718709)

(45) 発行日 平成17年11月24日(2005.11.24)

(24) 登録日 平成17年9月16日(2005.9.16)

(51) Int. Cl.⁷

F I

C07C 17/278
C07C 23/06
C07C 45/69
C07C 49/21
C07C 231/12

C O 7 C 17/278
C O 7 C 23/06
C O 7 C 45/69
C O 7 C 49/21
C O 7 C 231/12

請求項の数 4 (全 13 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-229179 (P2000-229179)
(22) 出願日 平成12年7月28日(2000.7.28)
(65) 公開番号 特開2002-47215 (P2002-47215A)
(43) 公開日 平成14年2月12日(2002.2.12)
審査請求日 平成12年7月28日(2000.7.28)

特許法第30条第1項適用 平成12年3月15日 社
団法人日本化学会発行の「日本化学会第78春季年会2
000年講演予稿集▲11▼」に発表

(73) 特許権者 504157024
国立大学法人東北大学
宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号
(74) 代理人 100058479
弁理士 鈴江 武彦
(74) 代理人 100091351
弁理士 河野 哲
(74) 代理人 100088683
弁理士 中村 誠
(74) 代理人 100108855
弁理士 蔵田 昌俊
(74) 代理人 100075672
弁理士 峰 隆司
(74) 代理人 100109830
弁理士 福原 淑弘

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 新規なシクロブタン誘導体及びその合成方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式(1)で表されるシクロブタン誘導体。

【化1】



式中、Rは炭素数1~20のパーフルオロアルキル基、炭素数6~20のパーフルオロアリール基、 $\text{CON}(\text{CH}_3)\text{C}_6\text{H}_5$ 、 COC_2H_5 、 COC_6H_5 、又は $\text{SO}_2\text{C}_6\text{H}_5$ を表す。2個あるRは同一でも異なっていてもよい。


【請求項2】

Rが C_6F_{13} 、又は C_6F_5 、である、請求項1に記載のシクロブタン誘導体。

【請求項3】


一般式(2)

【化2】



[式中、Rは炭素数1～20のパーフルオロアルキル基、炭素数6～20のパーフルオロアリール基、 COOC_2H_5 、 $\text{CON}(\text{CH}_3)\text{C}_6\text{H}_5$ 、 COC_2H_5 、 COC_6H_5 、又は $\text{SO}_2\text{C}_6\text{H}_5$ を表す。]で表されるアレン誘導体を二量化することによる一般式(1)

【化3】



10

[式中、Rは一般式(2)におけるRと同義である。2個あるRは同一でも異なってもよい。]で表されるシクロブタン誘導体の合成方法。

【請求項4】

Rが C_6F_{13} 、又は C_6F_5 、である、請求項3に記載のシクロブタン誘導体の合成方法。 20

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、新規なシクロブタン誘導体およびその合成方法に係わり、特に高機能性ポリマー原料として使用できる新規なシクロブタン誘導体およびその合成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

ポリエチレンにおけるエチレン、あるいはテフロンにおけるテトラフルオロエチレンのように、不飽和炭化水素はポリマーをはじめとする新素材の合成原料として非常に重要である。一方、近年においては高機能性のポリマーを開発するにあたってポリマー化反応自体について検討する必要があるのはもちろんであるが、新規なモノマーユニットを導入することも重要になりつつある。 30

【0003】

ところで、アレンを熱的反応により二量化してジメチレンシクロブタンを得る方法は古くから知られているが、この合成方法は反応条件が厳しい上、生成物が様々な異性体の混合物となるため、合成上の有用性は低く、生成物であるジメチレンシクロブタンを機能性ポリマー原料として利用するには実情に遠く及ばないものであった。

【0004】

【発明の課題】

本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みなされたものであり、高機能性ポリマーをはじめとする新素材の合成原料として利用することができる新規なシクロブタン誘導体を提供することを目的とする。本発明はまた、この新規なシクロブタン誘導体を緩和な条件において高収率で合成し得る方法を提供することを目的とする。 40

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、様々な置換基を導入してなるシクロブタン誘導体が耐熱性、耐薬品性等の優れた特性を有する高機能性ポリマーの合成原料として有用であることを見出した。

【0006】

50

本発明者等はまた、この新規なシクロブタン誘導体を高機能性ポリマーの合成原料として実用に供すべくその合成方法について更なる検討を重ねた結果、置換基を有するアレン誘導体の環化二量化反応によれば緩和な条件において高収率で本発明のシクロブタン誘導体を合成することができることをも見出した。

【0007】


本発明は、かかる知見に基づき完成されたものであり、以下の構成を有する。

【0008】

すなわち、本発明は、一般式(1)で表される新規なシクロブタン誘導体を提供する。

【0009】

【化4】



10

【0010】


式中、Rは炭素数1～20のパーフルオロアルキル基(例えば、 C_6F_{13})、炭素数6～20のパーフルオロアリール基(例えば、 C_6F_5)、 $CON(CH_3)C_6H_5$ 、 COC_2H_5 、 COC_6H_5 、又は $SO_2C_6H_5$ を表す。2個あるRは同一でも異なってもよい。

20

また、本発明は、一般式(2)

【0011】

【化5】



30


【0012】

[式中、Rは炭素数1～20のパーフルオロアルキル基(例えば、 C_6F_{13})、炭素数6～20のパーフルオロアリール基(例えば、 C_6F_5)、 $COOC_2H_5$ 、 $CON(CH_3)C_6H_5$ 、 COC_2H_5 、 COC_6H_5 、又は $SO_2C_6H_5$ を表す。]で表されるアレン誘導体を二量化することによる

一般式(1)

【0013】

【化6】



40

【0014】

[式中、Rは一般式(2)におけるRと同義である。2個あるRは同一でも異なってもよい。]で表されるシクロブタン誘導体の合成方法を提供する。

【0015】

50


【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明の新規シクロブタン誘導体は下記一般式(1)で表される化合物である。

【0016】

【化7】



10

【0017】

一般式(1)においてRは置換基を表し、好ましくは電子求引基である。このように置換基(好ましくは電子求引基)を導入するのは、効率的にシクロブタン環を構築できるからであり、また所望される高機能性ポリマーの特性等に応じてこれらの置換基をさらに変換することができるからである。

【0018】

本発明において導入される置換基Rの具体例としては、アルキル基、アリール基、 COOR_1 、 CONR_2R_3 、 COR_4 、 SO_2R_5 ($\text{R}_1 \sim \text{R}_5$ は水素原子又は置換基を表す。)等を挙げることができる。

20

【0019】

置換基Rについて更に詳細に説明する。Rとして前記一般式(1)に導入され得るアルキル基として、好ましくは直鎖又は分岐状の炭素数1~20の置換もしくは無置換のアルキル基、例えばメチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル等を挙げることができ、アリール基として好ましくは炭素数6~20の置換もしくは無置換のアリール基、例えばフェニル、ナフチル等を挙げることができる。より好ましくは、少なくとも1個のフッ素原子を有するアルキル基、アリール基(例えば $\text{CF}_2\text{C}_5\text{H}_{11}$ 、 $\text{CF}_2\text{C}_6\text{H}_{13}$ 等)であり、これらはフッ素原子以外に更に置換基を有していてもよい。フッ素原子を導入することにより、本発明のシクロブタンを原料として合成されるポリマーに優れた機能を付与することができる。高い汎用性という観点からはパーフルオロアルキル基もしくはパーフルオロアリール基が好ましく、例えば $(\text{CF}_2)_6\text{F}$ 、 C_6F_5 が挙げられる。

30

【0020】

COOR_1 において、 R_1 は好ましくは直鎖又は分岐状の炭素数1~20の置換もしくは無置換のアルキル基、炭素数6~20の置換もしくは無置換のアリール基であり、例えば COOC_2H_5 、 COOC_6H_5 が挙げられる。

CONR_2R_3 において、 R_2 および R_3 は各々独立に、好ましくは直鎖又は分岐状の炭素数1~20の置換もしくは無置換のアルキル基、炭素数6~20の置換もしくは無置換のアリール基であり、例えば $\text{CON}(\text{CH}_3)\text{C}_6\text{H}_5$ 、 $\text{CON}(\text{CH}_3)_2$ が挙げられる。

40

【0021】

COR_4 において、 R_4 は好ましくは直鎖又は分岐状の炭素数1~20の置換もしくは無置換のアルキル基、炭素数6~20の置換もしくは無置換のアリール基であり、例えば COC_2H_5 が挙げられる。

【0022】

SO_2R_5 において、 R_5 は好ましくは直鎖又は分岐状の炭素数1~20の置換もしくは無置換のアルキル基、炭素数6~20の置換もしくは無置換のアリール基であり、例えば $\text{SO}_2\text{C}_2\text{H}_5$ 、 $\text{SO}_2\text{C}_6\text{H}_5$ が挙げられる。

また、Rとして表される2個の置換基は、同一でも異なってもよい。


50

【0023】

本発明のシクロブタン誘導体は、下記一般式(2)

【0024】

【化8】



【0025】

により表されるアレン誘導体(以下、アレン1と称する)の環化二量化反応により合成することができる。一般式(2)においてRは置換基を表し、一般式(1)におけるRと同義である。


10

【0026】

アレン1の二量化反応により本発明のシクロブタン誘導体(以下、シクロブタン2とも称する)を合成する化学プロセスを下記に示す。

【0027】

【化9】




【0028】

本発明の方法によるシクロブタン2の合成は、ニッケル触媒存在下に室温、あるいはそれ以下の温度で極めて短時間(好ましくは30分~3時間)攪拌することにより行うことができる。本発明のシクロブタン誘導体は、高分子合成における優れたモノマー原料となりうる可能性がありながら、その効率的な合成方法は知られていなかったが、本発明の方法によれば、アレン1が緩和な条件において高位置選択的に二量化し、本発明のシクロブタン誘導体を高収率で得ることができる。なお、反応機構としては、下式に示すようにメタラサイクル3を経由していると考えられる。

30

【0029】

【化10】



【0030】

【実施例】

以下に本発明の実施例を示す。


本実施例においては、下記スキームで表される本発明の方法にしたがって本発明のシクロ

50

ブタン誘導体を合成した。但し、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

【0031】

【化11】



10

【0032】

前記スキーム中、codはシクロオクタジエン、Phはフェニルを表す。

【0033】

(実施例1)

出発物質として、本明細書に取り入れるBurton, D. J.; Hartgraves, G. A.; Hsu, J. Tetrahedron Lett., 1990, 31, 3699-3702、Hung, M-H. Tetrahedron Lett., 1990, 31, 3703-3706に記載された方法に準じて合成したアレン1 (Rがn-C₆F₁₃、アレン1aと称する)を用いた。

【0034】

アルゴン雰囲気下、アレン1a (1.0 mmol)の無水トルエン溶液 (0.5 mL)をNi(cod)₂ (28 mg、0.1 mmol)及びPPh₃ (105 mg、0.4 mmol)の無水トルエン溶液 (0.5 mL)に加え、室温にて30分間攪拌した後、アルミナの短いカラムに通し、次いで溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン、あるいはヘキサン：酢酸エチル)にて精製したところ、79%の収率で無色の液体が得られた。

20


【0035】

以下に示す分析結果から、本合成例で得られた生成物は、1,2-ビス(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-トリデカフルオロ-ヘプチリデン)シクロブタン(2a)と同定した。この反応は極めて高い位置選択性を示し、位置異性体は全く生成しなかった。

30

【0036】

【化12】



40

【0037】

¹H NMR : 5.82 (t, J = 13.9 Hz, 2H), 3.03 (bs, 4H)

¹³C NMR : 107.5 - 119.6 (m), 152.2, 108.7, 28.9

IR (neat) : 2997, 2955, 1674, 1420, 1366, 1342, 1313, 1240, 1202, 1146, 1121, 1078, 1063, 978, 853, 814, 735 cm⁻¹

50

$C_{18}H_6F_{26}$ についての元素分析

計算値 : C, 30.19 ; H, 0.84

実測値 : C, 30.25 ; H, 0.92

(実施例 2)

出発物質として、本明細書に取り入れる Burton, D. J.; Hartgraves, G. A.; Hsu, J. *Tetrahedron Lett.*, 1990, 31, 3699-3702、Hung, M-H. *Tetrahedron Lett.*, 1990, 31, 3703-3706、Cairncross, A.; Sheppard, W. A.; Wonchoba, E. *Org. Syn., Coll. Vol. 6*, 1988, 875-882に記載された方法に準じて合成したアレン 1 (R が C_6F_5 、アレン 1 b と称する) を用いた。

【0038】


出発物質としてアレン 1 b を用いた以外は実施例 1 と同様の条件で合成を行った結果、81%の収率で無色の針状結晶 (Et_2O - ヘキサンより再結晶) が得られた。

【0039】

以下に示す分析結果から、本合成例で得られた生成物は、1, 2 - ビス (2, 3, 4, 5, 6 - ペンタフルオロフェニリデン) シクロブタン (2 b) と同定した。この反応は極めて高い位置選択性を示し、位置異性体は全く生成しなかった。

【0040】

【化 13】



【0041】

融点 : 133 - 135

1H NMR : 6.57 (s, 2H), 2.85 (s, 4H)

^{13}C NMR : 149.8, 144.4 (t, $J_{C-F} = 246$ Hz), 140.2 (t, $J_{C-F} = 254$ Hz), 137.7 (t, $J_{C-F} = 251$ Hz), 111.0, 104.4, 29.0

IR (KBr) : 2991, 2969, 2943, 1652, 1520, 1494, 1414, 1375, 1352, 1306, 1150, 1126, 1080, 1038, 1005, 970, 945, 929, 875, 853, 799, 722 cm^{-1}

$C_{18}H_6F_{10}$ についての元素分析

計算値 : C, 52.45 ; H, 1.47

実測値 : C, 52.41 ; H, 1.76

$C_{18}H_6F_{10}$ についての HRMS

計算値 : 412.0309

計算値 : 412.0282

(実施例 3)

出発物質として、本明細書に取り入れる Jung, M. E.; Nishimura, N. *J. Am. Chem. Soc.*, 1999, 121, 3529-3530に記載された方法に準じて合成したアレン 1 (R が $COOC_2H_5$ 、アレン 1 c と称する) を用いた。

【0042】

出発物質としてアレン 1 c を用い、攪拌時の温度を $-15 \sim -10$ とした以外は実施例 1 と同様の条件で合成を行った結果、71%の収率で無色の粉末が得られた。

【0043】

10

20

30


40

50

以下に示す分析結果から、本合成例で得られた生成物は、エチル(2-エトキシカルボニルメチレンシクロブチリデン)アセテート(2c)と同一した。この反応は極めて高い位置選択性を示し、位置異性体は全く生成しなかった。

【0044】

【化14】



10

【0045】

融点 : 66 - 68

$^1\text{H NMR}$: 5.99 (s, 2H), 4.15 (q, $J = 7.2\text{ Hz}$, 4H), 3.08 (s, 4H), 1.25 (t, $J = 7.2\text{ Hz}$, 6H)

$^{13}\text{C NMR}$: 166.0, 158.6, 112.1, 60.3, 30.6, 14.2

20

IR (KBr) : 2983, 2946, 2909, 1711, 1692, 1648, 1476, 1448, 1370, 1338, 1231, 1217, 1187, 1124, 1034, 1016, 867, 818 cm^{-1}

$\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_4$ についての元素分析

計算値 : C, 64.27; H, 7.19

実測値 : C, 64.06; H, 7.31

$\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_4$ についてのHRMS

計算値 : 224.1048

計算値 : 224.1037

(実施例4)

30

出発物質として、本明細書に取り入れるDiehl, K.; Himbert, G; Henn, L. Chem. Ber., 1986, 119, 2430-2443に記載された方法に準じて合成したアレン1 (RがCON(CH₃)Ph、アレン1dと称する)を用いた。

【0046】

出発物質としてアレン1dを用い、撹拌を0で2時間行った以外は実施例1と同様の条件で合成を行った結果、66%の収率で無色の粉末が得られた。


【0047】

以下に示す分析結果から、本合成例で得られた生成物は、N-メチル-2-{2-[(メチルフェニルカルバモイル)メチレン]シクロブチリデン}-N-フェニルアセトアミド(2d)と同一した。この反応は極めて高い位置選択性を示し、位置異性体は全く生成し

40

【0048】

【化15】



【0049】

10

融点 : 166 - 168

 $^1\text{H NMR}$: 7.14 - 7.27 (m, 6H), 7.01 (q, $J = 7.0\text{ Hz}$, 4H), 5.54 (s, 2H), 3.20 (s, 6H), 3.07 (s, 4H) $^{13}\text{C NMR}$: 165.7, 156.6, 143.5, 129.3, 127.2, 126.9, 11.0, 36.9, 30.9IR (KBr) : 2989, 2935, 1657, 1623, 1610, 1594, 1496, 1405, 1374, 1266, 1111, 834, 776, 703 cm^{-1} $\text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_2$ についてのHRMS

計算値 : 346.1680

計算値 : 346.1694

20

(実施例5)

出発物質として、本明細書に取り入れる Brandsma, L.; Verkruijsse, H. D. *Synthesis of Acetylenes, Allenes and Cumulenes*; Elsevier: Amsterdam, 1981; Chapter 4, pp. 101-102、同Chapter 8, pp.236に記載された方法に準じて合成したアレン1 (Rが COC_2H_5 、アレン1eと称する)を用いた。

【0050】

出発物質としてアレン1eを用い、撹拌を $-15 \sim -10$ で3時間行った以外は実施例1と同様の条件で合成を行った結果、34%の収率で淡黄色の粉末が得られた。


【0051】

以下に示す分析結果から、本合成例で得られた生成物は、1-[2-(2-オキソブチリデン)シクロブチリデン]-ブタン-2-オン(2e)と同一した。この反応は極めて高い位置選択性を示し、位置異性体は全く生成しなかった。

30

【0052】

【化16】



40

【0053】

融点 : 63 - 65

 $^1\text{H NMR}$: 6.21 (s, 2H), 2.98 (s, 4H), 2.37 (q, $J = 7.2\text{ Hz}$, 4H), 0.90 (t, $J = 7.2\text{ Hz}$, 6H) $^{13}\text{C NMR}$: 200.3, 156.6, 118.1, 36.2, 31.3, 7.4

IR (KBr) : 2982, 2938, 2900, 1684, 1616, 1456, 1

50

404, 1363, 1333, 1117, 1042, 847 cm^{-1} $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_2$ についてのHRMS

計算値: 192.1149

計算値: 192.1151

(実施例6)

出発物質として、本明細書に取り入れるBrandsma, L.; Verkruijsse, H. D. *Synthesis of Acetylenes, Allenes and Cumulenes*; Elsevier: Amsterdam, 1981; Chapter 4, pp. 101-102、同Chapter 8, pp.236、Brandsma, L.; *Preparative Acetylenic Chemistry*, 2nd Ed.; Elsevier: Amsterdam, 1988; Chapter 3, pp67. に記載された方法に準じて合成したアレン1 (RがCOPh、アレン1fと称する)を用いた。

10

【0054】

出発物質としてアレン1fを用い、撹拌を-15~-10で1.5時間行った以外は実施例1と同様の条件で合成を行った結果、36%の収率で黄色の針状結晶(AcOEt-ヘキサンより再結晶)が得られた。


【0055】

以下に示す分析結果から、本合成例で得られた生成物は、2-[2-(2-オキソ-2-フェニルエチリデン)シクロブチリデン]-1-フェニルエタンオン(2f)と同定した。この反応は極めて高い位置選択性を示し、位置異性体は全く生成しなかった。

【0056】

【化17】

20



【0057】

30

融点 : 138 - 140

^1H NMR : 7.97 (m, 4H), 7.53 (m, 6H), 7.29 (s, 2H), 3.31 (s, 4H)

^{13}C NMR : 190.2, 160.7, 138.4, 132.9, 128.7, 128.1, 114.2, 32.4

IR (KBr) : 2976, 2938, 1654, 1599, 1574, 1447, 1356, 1304, 1224, 1204, 1171, 1015, 989, 847, 780, 725 cm^{-1}

$\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_2$ についてのHRMS

計算値: 288.1149

計算値: 288.1169

40

(実施例7)

出発物質として、本明細書に取り入れるMa, S.; Wei, Q. *J. Org. Chem.*, 1999, 64, 1026-1028に記載された方法に準じて合成したアレン1 (RがSO₂Ph、アレン1gと称する)を用いた。

【0058】

出発物質としてアレン1gを用い、撹拌時間を1.5時間とした以外は実施例1と同様の条件で合成を行った結果、33%の収率で無色の粉末が得られた。

【0059】


以下に示す分析結果から、本合成例で得られた生成物は、1,2-ビス(フェニルスルフ

50

オニルメチリデン)シクロブタン(2g)と同定した。この反応は極めて高い位置選択性を示し、位置異性体は全く生成しなかった。

【0060】

【化18】



10

【0061】

融点 : 171 - 173

^1H NMR : 7.85 (q, $J = 7.2\text{ Hz}$, 4H), 7.50 - 7.65 (m, 6H), 6.43 (s, 2H), 3.22 (s, 4H)

^{13}C NMR : 153.6, 140.7, 133.9, 129.4, 127.5, 123.3, 29.9

IR (KBr) : 3097, 3040, 3027, 2947, 1630, 1446, 1324, 1307, 1147, 1083, 815 cm^{-1}

$\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_2$ についてのHRMS

計算値 : 360.0489

計算値 : 360.0477

各実施例における反応条件およびシクロブタン2の収率を表1にまとめて示す。

【0062】

【表1】

表 1

実施例 No.	EWG	攪拌温度・時間	シクロブタン2の収率(%)
1	$n\text{-C}_6\text{F}_{13}$ (1a)	室温、30分	79
2	C_6F_5 (1b)	室温、30分	81
3	COOC_2H_5 (1c)	$-15\sim-10^\circ\text{C}$ 、 30分	71
4	$\text{CON}(\text{CH}_3)\text{Ph}$ (1d)	0°C 、2時間	66
5	COC_2H_5 (1e)	$-15\sim-10^\circ\text{C}$ 、 3時間	34
6	COPh (1f)	$-15\sim-10^\circ\text{C}$ 、 1.5時間	36
7	SO_2Ph (1g)	室温、1.5時間	33

30

40


50

【0063】

上記実施例1～7で得られた本発明のシクロブタン誘導体は、例えば加熱して重合させることにより下記一般式で表されるようなポリマーを容易に得ることができる。

【0064】

【化19】



10

【0065】

かかるポリマーは、耐熱性、耐薬品性等の点で優れた特性を有しており、高機能性素材として好適に用いることができる。

【0066】

【発明の効果】

以上詳述したように、本発明により、高機能性ポリマーをはじめとする新素材の合成原料となり得る新規なシクロブタン誘導体が提供された。また本発明により、かかる新規なシクロブタン誘導体を緩和な条件において高収率で合成し得る方法が提供された。

20

フロントページの続き

(51) Int.Cl.⁷ F I
C 0 7 C 233/10 C 0 7 C 233/10
C 0 7 C 315/04 C 0 7 C 315/04
C 0 7 C 317/30 C 0 7 C 317/30
// C 0 7 B 61/00 C 0 7 B 61/00 3 0 0

(74)代理人 100084618

弁理士 村松 貞男

(74)代理人 100092196

弁理士 橋本 良郎

(72)発明者 山本 嘉則

宮城県仙台市青葉区一番町2丁目10-26-1003

(72)発明者 斎藤 慎一

宮城県仙台市太白区向山4-25-12-104

審査官 前田 憲彦

(56)参考文献 J. Am. Chem. Soc. , 1985年, 107(11), p.3160-3172
Tetrahedron Lett. , 1987年, 28(29), p.3391-3392
J. Org. Chem. , 1972年, 37(1), p.64-68
J. Org. Chem. , 1973年, 38(22), p.3843-3848
J. Org. Chem. , 1985年, 50(25), p.5056-5060
J. Org. Chem. , 1986年, 51(19), p.3611-3619
Journal of Organic Chemistry, 1998年, 63(24), p.8642-8643
Synthesis, 1977年, (8), p.564-565
Liebigs Annalen der Chemie, 1983年, (9), p.1496-1503
Liebigs Annalen der Chemie, 1979年, (12), p.1969-1976

(58)調査した分野(Int.Cl.⁷, D B名)

C07C 17/00
C07C 23/00
C07C 45/00
C07C 49/00
C07C231/00
C07C233/00
C07C315/00
C07C317/00
CA(STN)
REGISTRY(STN)