

(19) 日本国特許庁(JP)

## 再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02005/075384

発行日 平成19年10月11日 (2007.10.11)

(43) 国際公開日 平成17年8月18日 (2005.8.18)


| (51) Int. Cl.               | F I             | テーマコード (参考)     |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>C07C 1/32 (2006.01)</b>  | C07C 1/32       | 4C055           |
| <b>C07C 13/28 (2006.01)</b> | C07C 13/28      | 4C057           |
| <b>C07C 13/40 (2006.01)</b> | C07C 13/40      | 4C091           |
| <b>C07C 15/02 (2006.01)</b> | C07C 15/02      | 4C204           |
| <b>C07B 61/00 (2006.01)</b> | C07B 61/00 300  | 4H006           |
|                             | 審査請求 有 予備審査請求 有 | (全 63 頁) 最終頁に続く |

|              |                              |          |                 |
|--------------|------------------------------|----------|-----------------|
| 出願番号         | 特願2005-517836 (P2005-517836) | (71) 出願人 | 503360115       |
| (21) 国際出願番号  | PCT/JP2005/002529            |          | 独立行政法人科学技術振興機構  |
| (22) 国際出願日   | 平成17年2月10日 (2005.2.10)       |          | 埼玉県川口市本町4丁目1番8号 |
| (31) 優先権主張番号 | 特願2004-33941 (P2004-33941)   | (74) 代理人 | 100092783       |
| (32) 優先日     | 平成16年2月10日 (2004.2.10)       |          | 弁理士 小林 浩        |
| (33) 優先権主張国  | 日本国 (JP)                     | (74) 代理人 | 100095360       |
| (31) 優先権主張番号 | 特願2004-282578 (P2004-282578) |          | 弁理士 片山 英二       |
| (32) 優先日     | 平成16年9月28日 (2004.9.28)       | (74) 代理人 | 100093676       |
| (33) 優先権主張国  | 日本国 (JP)                     |          | 弁理士 小林 純子       |
|              |                              | (74) 代理人 | 100112726       |
|              |                              |          | 弁理士 黒田 薫        |
|              |                              | (74) 代理人 | 100128761       |
|              |                              |          | 弁理士 田村 恭子       |
|              |                              |          | 最終頁に続く          |

(54) 【発明の名称】 芳香族化合物の製造方法

## (57) 【要約】

本発明の課題は、多種多様なアルキル基等の様々な置換基を有する芳香族化合物の低毒性且つ経済的な製造方法を提供することであり、鉄触媒およびジアミン化合物存在下、下記式(2)で示される化合物と、下記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬とを反応させることを特徴とする、下記式(1)で示される芳香族化合物の製造方法により、上記課題を解決する。



[式中、Rは、置換基を有していてもよい炭化水素基又は、C<sub>3</sub>～C<sub>10</sub>飽和環基若しくは不飽和環基であり、Aは、置換基を有していてもよいC<sub>4</sub>～C<sub>20</sub>芳香族基又は置換基を有していてもよい複素芳香族基であり、Xは、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルであり、Y<sup>1</sup>は、臭素、ヨウ素、塩素、又は炭素アニオン配位子である。]

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

下記式 ( 1 ) で示される芳香族化合物の製造方法であって、



[ 式中、R は、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は、 $C_3 \sim C_{10}$  飽和環基若しくは不飽和環基であって、前記環は、酸素原子又は式 - N ( B ) - で示される基 ( 式中、B は水素原子、置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  炭化水素基、又は置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  アルコキシカルボニル基である。 ) で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していてもよく、A は、置換基を有していてもよい  $C_4 \sim C_{20}$  芳香族基又は置換基を有していてもよい複素芳香族基である。 ]

10

鉄触媒およびジアミン化合物存在下、下記式 ( 2 ) で示される化合物と、



[ 式中、R は上記の意味を有する。X は、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルである。 ]

下記式 ( 3 a ) で示される芳香族マグネシウム試薬と、



[ 式中、A は上記の意味を有する。Y<sup>1</sup> は、臭素、ヨウ素、塩素、又は炭素アニオン配位子である。 ]

を反応させることを特徴とする、芳香族化合物の製造方法。

## 【請求項 2】

20

鉄触媒が、鉄塩又は鉄錯体であることを特徴とする、請求項 1 に記載の芳香族化合物の製造方法。

## 【請求項 3】

ジアミン化合物が、2 座配位子であることを特徴とする、請求項 1 又は 2 に記載の芳香族化合物の製造方法。

## 【請求項 4】

R が、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることを特徴とする、請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

## 【請求項 5】

30

A が、置換基を有していてもよい  $C_4 \sim C_{20}$  アリール基であることを特徴とする、請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

## 【請求項 6】

下記式 ( 1 ) で示される芳香族化合物の製造方法であって、



[ 式中、R は、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は、 $C_3 \sim C_{10}$  飽和環基若しくは不飽和環基であって、前記環は、酸素原子又は式 - N ( B ) - で示される基 ( 式中、B は水素原子、置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  炭化水素基、又は置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  アルコキシカルボニル基である。 ) で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していてもよく、A は、置換基を有していてもよい  $C_4 \sim C_{20}$  芳香族基又は置換基を有していてもよい複素芳香族基である。 ]

40


ジアミン化合物存在下、

下記式 ( 3 a ) で示される芳香族マグネシウム試薬と、



[ 式中、A は上記の意味を有する。Y<sup>1</sup> は、臭素、ヨウ素、塩素、又は炭素アニオン配位子である。 ]

下記式 ( 4 b ) で示される亜鉛化合物とを反応させ、反応混合物を得る工程と、



[ 式中、Z<sup>3</sup> および Z<sup>4</sup> は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、臭素、ヨウ素、塩素、フッ素、又はトリフルオロメタンシルホニル基である。 ]

50

鉄触媒存在下、前記反応混合物と、下記式(2)で示される化合物と、



[式中、Rは上記の意味を有する。Xは、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルである。]

を反応させる工程とを含むことを特徴とする、芳香族化合物の製造方法。

【請求項7】

鉄触媒が、鉄塩又は鉄錯体であることを特徴とする、請求項6に記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項8】

ジアミン化合物が、2座配位子であることを特徴とする、請求項6又は7に記載の芳香族化合物の製造方法。 10

【請求項9】

Rが、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることを特徴とする、請求項6～8のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項10】

Aが、置換基を有していてもよいC<sub>4</sub>～C<sub>20</sub>アリール基であることを特徴とする、請求項6～9のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項11】

下記式(1)で示される芳香族化合物の製造方法であって、 20



[式中、Rは、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は、C<sub>1</sub>～C<sub>10</sub>飽和環基若しくは不飽和環基であって、前記環は、酸素原子又は式-N(B)-で示される基(式中、Bは水素原子、置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>～C<sub>10</sub>炭化水素基、又は置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>～C<sub>10</sub>アルコキシカルボニル基である。)で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していてもよく、Aは、置換基を有していてもよいC<sub>4</sub>～C<sub>20</sub>芳香族基又は置換基を有していてもよい複素芳香族基である。]


ジアミン化合物存在下、

下記式(3c)で示される芳香族リチウム試薬と、



[式中、Aは上記の意味を有する。]

下記式(4b)で示される亜鉛化合物とを反応させ、



[式中、Z<sup>3</sup>およびZ<sup>4</sup>は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、臭素、ヨウ素、又は塩素である。]

次いで、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、ガリウム及びアルミニウムからなる群より選ばれる一種以上の金属を含むルイス酸金属化合物を反応させ、反応混合物を得る工程と、

鉄触媒存在下、前記反応混合物と、下記式(2)で示される化合物と、



[式中、Rは上記の意味を有する。Xは、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルである。]

を反応させる工程とを含むことを特徴とする、芳香族化合物の製造方法。

【請求項12】

鉄触媒が、鉄塩又は鉄錯体であることを特徴とする、請求項11に記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項13】

ジアミン化合物が、2座配位子であることを特徴とする、請求項11又は12に記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項14】

R が、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることを特徴とする、請求項 11 ~ 13 のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項 15】

A が、置換基を有していてもよい  $C_4 \sim C_{20}$  アリール基であることを特徴とする、請求項 11 ~ 14 のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項 16】

ルイス酸金属化合物が、下記式 (4c) で示される金属化合物であることを特徴とする、請求項 11 ~ 15 のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。



10

[ 式中、M は、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、ガリウム、又はアルミニウムであり、 $Z^1$  は、それぞれ独立して、同一又は異なって、臭素、ヨウ素、塩素、又は炭素アニオン配位子であり、n は 2 ~ 4 の整数である。]

【請求項 17】

下記式 (1) で示される芳香族化合物の製造方法であって、



[ 式中、R は、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は、 $C_3 \sim C_{10}$  飽和環基若しくは不飽和環基であって、前記環は、酸素原子又は式 - N(B) - で示される基 (式中、B は水素原子、置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  炭化水素基、又は置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  アルコキシカルボニル基である。) で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していてもよく、A は、置換基を有していてもよい  $C_4 \sim C_{20}$  芳香族基又は置換基を有していてもよい複素芳香族基である。]


20

ジアミン化合物存在下、下記式 (3b) で示される芳香族亜鉛試薬と、



[ 式中、A は上記の意味を有する。 $Y^2$  は、臭素、ヨウ素、又は塩素である。]

下記式 (4a) で示されるマグネシウム化合物とを反応させ、反応混合物を得る工程と、



[ 式中、 $Z^1$  は、炭素アニオン配位子であり、 $Z^2$  は、臭素、ヨウ素、又は塩素である。]

鉄触媒存在下、前記反応混合物と、下記式 (2) で示される化合物と、

30



[ 式中、R は上記の意味を有する。X は、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルである。]

を反応させる工程とを含むことを特徴とする、芳香族化合物の製造方法。

【請求項 18】

鉄触媒が、鉄塩又は鉄錯体であることを特徴とする、請求項 17 に記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項 19】

ジアミン化合物が、2 座配位子であることを特徴とする、請求項 17 又は 18 に記載の芳香族化合物の製造方法。

40

【請求項 20】

R が、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることを特徴とする、請求項 17 ~ 19 のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項 21】

A が、置換基を有していてもよい  $C_4 \sim C_{20}$  アリール基であることを特徴とする、請求項 17 ~ 20 のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

本発明は、芳香族化合物の製造方法に関し、より詳しくは、鉄触媒を用いたハロゲン化

50

アルキル等の脂肪族有機化合物と、芳香族有機金属試薬のクロスカップリング反応による芳香族化合物の製造方法に関する。

【背景技術】

アルキル化芳香族化合物、特に第二級アルキル基を芳香環上に有する一群の芳香族化合物は、医薬や農薬等の化成品中間体、液晶などの原料として有用であることが知られている。

従来、第二級アルキル基を持つ芳香族化合物の位置選択的な製造方法として、ニッケル又はパラジウム触媒存在下で、アルキルマグネシウム試薬とハロゲン化アリール又はアリールスルホン酸エステルとをカップリング反応させる方法が知られていた (Hayashi, T.; Konishi, M.; Kobori, Y.; Kumada, M.; Higuchi, T.; Hirotsu, K. J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 158-163; Ogasawara, M.; Yoshida, K.; Hayashi, T. Organometallics, 2000, 19, 1567-1571; Doherty, S.; Knight, J.; Robins, E. G.; Scanlan, T. H.; Champkin, P. A. Clegg, W. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5110-5111)。

しかしながら、この方法によれば、複雑な構造を有するホスフィン配位子の添加が必須であり、かつ第二級アルキル基の構造によっては、第二級アルキル基から第一級アルキル基への異性化を伴い目的生成物を高収率で得ることができないという問題があった。また、ニッケル触媒又はパラジウム触媒という毒性の高いあるいは高価な触媒が必要であるという問題があり、医薬や農薬といった毒性の高い試薬を避ける必要がある分野で大量合成への応用ができないという問題があった。

また、ハロゲン化アルキル又はアルキルスルホン酸エステルと芳香族有機金属試薬からアルキル基を有する芳香族化合物を製造する方法として、ジエン配位子存在下パラジウムを触媒としてアルキルスルホン酸エステルあるいはハロゲン化アルキルと芳香族マグネシウム試薬をクロスカップリングさせる方法 (Terao, J.; Naitoh, Y.; Kuniyasu, H.; Kambe, N. Chem. Lett. 2003, 32, 890-901) や、ジエン配位子存在下銅やニッケルを触媒としてハロゲン化アルキルと芳香族マグネシウム試薬を触媒的にクロスカップリングする方法 (Terao, J.; Ikummi, A.; Kuniyasu, H.; Kambe, N. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 5646-5647) も知られている。

その他にも、トリシクロヘキシルホスフィンなどの嵩高いホスフィン配位子存在下、パラジウム触媒によるハロゲン化アルキルと芳香族亜鉛化合物、芳香族スズ化合物または芳香族ケイ素化合物との触媒的なクロスカップリング反応 (Zhou, J.; Fu, G. C. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 12527-12530; Tang, H.; Menzel, K.; Fu, G. C. Angew. Chem., Int. Ed. 2003, 42, 5079-5082; Lee, J.-Y.; Fu, G. C. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 5616-5617) も知られている。

しかしながらこれらの方法によって第二級アルキル基を導入する場合、脱離反応などの副反応によりアルケンが生じ、目的生成物が低収率でしか生成しないため、第二級アルキル置換基を有する芳香族化合物の合成には適用できないという問題があった。

また、第二級ハロゲン化アルキルと芳香族有機金属化合物からアルキル基を有する芳香族化合物を製造する方法として、ニッケル触媒を用いた芳香族ホウ素化合物を、第二級ハロゲン化アルキルと触媒的にクロスカップリング反応させるという方法も知られている (Zhou, J.; Fu, G. C. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 1340-1341)。この方法によれば、種々の第二級アルキル置換基を有する芳香族化合物が合成可能であるが、やはり毒性の高いニッケルを用いなければならない点などの問題点は解決されていない

また、触媒として廉価であり且つ低毒性の鉄触媒を用いた方法として、ハロゲン化アリールあるいはハロゲン化アルケニル等の不飽和有機ハロゲン化物あるいはアリルリン酸エ

ステル等の求電子剤と、芳香族あるいはアルキルマグネシウム試薬、亜鉛試薬又はマンガン試薬とをクロスカップリング反応させるという方法が知られている (Furstner, A.; Leitner, A. *Angew. Chem., Int. Ed.* 2002, 41, 609-612、Furstner, A.; Leitner, A.; Mendez, M.; Krause, H.; *J. Am. Chem. Soc.* 2002, 124, 13856-13863、米国公開公報 2003/0220498)。

この方法で第二級アルキルマグネシウム試薬とハロゲン化アリールから第二級アルキル置換基を有する芳香族化合物を合成することは可能である。しかしながら、第二級アルキルマグネシウム試薬調製時に、カルボニル基、シアノ基など多くの官能基が共存できないことに加えて、収率が50%~60%と低く、多種多様なアルキル化芳香族化合物の製造方法としては適さないという問題があった。またこの方法での反応条件下でハロゲン化アルキルと芳香族マグネシウム試薬を用いた場合、脱離反応等の副反応によりオレフィンの生成が優先し、目的生成物は低収率でしか生成しないという問題があった。

また、触媒量のN, N, N', N'-テトラメチルエチレンジアミン (TMEDA) を配位子として有する鉄錯体触媒を用いて、ハロゲン化アルキルと芳香族マグネシウム試薬とのカップリング反応を行う方法が知られている (Martin, R.; Furstner, A.; *Angew. Chem., Int. Ed.* 2004, 43, 3955-3957)。しかしながら、この方法によれば、ハロゲン化アルキルとして、塩化物、フッ化物を用いた場合には全く反応が進まないという問題があった。

更に、触媒として三価の鉄アセチルアセトナート錯体を用い、ジアミン配位子を使わず、溶媒をテトラヒドロフラン (THF) からジエチルエーテルに変えた以外は上記と同様の方法でカップリング反応を行う方法も知られている (Nagano, T.; Hayashi, T. *Org. Lett.* 2004, 6, 1297-1299)。しかしながら、この方法においても、ハロゲン化アルキルとして、塩化物、フッ化物を用いた場合には全く反応が進まないという問題があった。のみならず、収率は一般に低く、実用的でないという問題もあった。

このため、大量合成が可能であり、かつ安全性の高い方法で多種多様な第一級または第二級アルキル置換基を有する芳香族化合物を高収率で得る方法が望まれていた。

#### 【発明の開示】

本発明は、低毒性、廉価かつ入手容易な鉄触媒を使用し、多種多様なアルキル置換基を有する芳香族化合物の実践的な製造方法を提供することを目的とする。

即ち、本発明の第1態様では、下記式(1)で示される芳香族化合物の製造方法であって、



[式中、Rは、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は、C<sub>3</sub>~C<sub>10</sub>飽和環基若しくは不飽和環基であって、前記環は、酸素原子又は式-N(B)-で示される基(式中、Bは水素原子、置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>~C<sub>10</sub>炭化水素基、又は置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>~C<sub>10</sub>アルコキシカルボニル基である。)で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していてもよく、Aは、置換基を有していてもよいC<sub>4</sub>~C<sub>20</sub>芳香族基又は置換基を有していてもよい複素芳香族基である。]鉄触媒およびジアミン化合物存在下、下記式(2)で示される化合物と、



[式中、Rは上記の意味を有する。Xは、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルである。]下記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬と、



[式中、Aは上記の意味を有する。Y<sup>1</sup>は、臭素、ヨウ素、塩素、又は炭素アニオン配位子である。]を反応させることを特徴とする、芳香族化合物の製造方法が提供される。

また、本発明の第2態様では、上記式(1)で示される芳香族化合物の製造方法であって、ジアミン化合物存在下、下記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬と、



10


20

30

40

50

[ 式中、A は下記の意味を有する。Y<sup>1</sup> は、臭素、ヨウ素、塩素、又は炭素アニオン配位子である。] 下記式 (4b) で示される亜鉛化合物とを反応させ、反応混合物を得る工程と、



[ 式中、Z<sup>3</sup> および Z<sup>4</sup> は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、臭素、ヨウ素、塩素、フッ素、又はトリフルオロメタンスルホニル基である。] 鉄触媒存在下、前記反応混合物と、下記式 (2) で示される化合物と、




[ 式中、R は上記の意味を有する。X は、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルである。] を反応させる工程とを含むことを特徴とする、芳香族化合物の製造方法が提供される。

10

また、本発明の第3態様では、上記式 (1) で示される芳香族化合物の製造方法であって、ジアミン化合物存在下、下記式 (3c) で示される芳香族リチウム試薬と、



[ 式中、A は上記の意味を有する。] 下記式 (4b) で示される亜鉛化合物とを反応させ、



[ 式中、Z<sup>3</sup> および Z<sup>4</sup> は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、臭素、ヨウ素、又は塩素である。] 次いで、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、ガリウム及びアルミニウムからなる群より選ばれる一種以上の金属を含むルイス酸金属化合物を反応させ、反応混合物を得る工程と、

20

鉄触媒存在下、前記反応混合物と、下記式 (2) で示される化合物と、




[ 式中、R は上記の意味を有する。X は、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルである。] を反応させる工程とを含むことを特徴とする、芳香族化合物の製造方法が提供される。

また、本発明の第4態様では、上記式 (1) で示される芳香族化合物の製造方法であって、ジアミン化合物存在下、下記式 (3b) で示される芳香族亜鉛試薬と、



[ 式中、A は上記の意味を有する。Y<sup>2</sup> は、臭素、ヨウ素、又は塩素である。] 下記式 (4a) で示されるマグネシウム化合物とを反応させ、反応混合物を得る工程と、

30



[ 式中、Z<sup>1</sup> は、炭素アニオン配位子であり、Z<sup>2</sup> は、臭素、ヨウ素、又は塩素である。] 鉄触媒存在下、前記反応混合物と、下記式 (2) で示される化合物と、



[ 式中、R は上記の意味を有する。X は、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルである。] を反応させる工程とを含むことを特徴とする、芳香族化合物の製造方法が提供される。

本発明の第1態様～第4態様において、鉄触媒が、鉄塩又は鉄錯体であることが好ましい。

また、本発明の第1態様～第4態様において、ジアミン化合物が、2座配位子であることが好ましい。

40

また、本発明の第1態様～第4態様において、R が、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることが好ましい。

また、本発明の第1態様～第4態様において、A が、置換基を有していてもよい C<sub>4</sub>～C<sub>20</sub> アリール基であることが好ましい。

また、本発明の第3態様において、ルイス酸金属化合物が、下記式 (4c) で示される金属化合物であってもよい。



[ 式中、M は、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、ガリウム、又はアルミニウムであり、Z<sup>1</sup> は、それぞれ独立して、同一又は異なって、臭素、ヨウ素、塩素、

50

又は炭素アニオン配位子であり、 $n$ は2～4の整数である。]


本発明によれば、多種多様なアルキル基等の様々な置換基を有する芳香族化合物を、低毒性の環境下で、経済的且つ高収率で製造することができる。このため、医薬や農薬といった毒性の高い試薬を避ける必要がある分野で所望の置換基を有する芳香族化合物を大量合成することができる。

また、官能基選択性が高いため、保護された糖類に複素芳香環を効率的に導入することが可能となり、例えば、C-アリアルグリコシド類の合成にも応用することができる。

また、ポリ塩化ビニル等のポリマー中のハロゲン原子を所望の芳香族置換基に変換することができるため、ポリマー改質に応用することができる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

本発明の第1態様では、鉄触媒およびジアミン化合物存在下、下記式(2)で示される化合物と、下記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬とを反応させることを特徴とする、下記式(1)で示される芳香族化合物の製造方法が提供される。



本発明の第1態様では、下記式(2)で示される化合物が用いられる。



Rは、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は、 $C_3 \sim C_{10}$ 飽和環基若しくは不飽和環基である。

「炭化水素基」としては、 $C_{30}$ 程度までの比較的分子量の炭化水素基でもよく、またそれ以上の高分子炭化水素基であってもよい。

また、前記環は、酸素原子又は式-N(B)-で示される基(式中、Bは水素原子、置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_{10}$ 炭化水素基、又は置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシカルボニル基である。)で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していてもよい。

置換基を有していてもよい高分子炭化水素としては、例えば、ポリ塩化ビニル等のポリマーから任意の1個のハロゲン原子を除いて形成される1価基などが挙げられる。

置換基を有していてもよい分子量の炭化水素基としては、例えば、 $C_2 \sim C_{30}$ 炭化水素基を挙げることができる。

本発明の第1態様において、Rで示される「 $C_2 \sim C_{30}$ 炭化水素基」の炭化水素基は、飽和若しくは不飽和の非環式であってもよいし、飽和若しくは不飽和の環式であってもよい。 $C_2 \sim C_{30}$ 炭化水素基が非環式の場合には、線状でもよいし、枝分かれでもよい。「 $C_2 \sim C_{30}$ 炭化水素基」には、 $C_2 \sim C_{30}$ アルキル基、 $C_3 \sim C_{30}$ アルケニル基、 $C_3 \sim C_{30}$ アルキニル基、 $C_5 \sim C_{30}$ アルキルジエニル基、 $C_7 \sim C_{30}$ アリアルアルキル基、 $C_3 \sim C_{30}$ シクロアルキル基、 $C_3 \sim C_{30}$ シクロアルケニル基、( $C_3 \sim C_{15}$ シクロアルキル) $C_1 \sim C_{15}$ アルキル基、縮合多環式基などが含まれる。

本発明の第1態様において、Rで示される「 $C_2 \sim C_{30}$ アルキル基」は、 $C_2 \sim C_{15}$ アルキル基であることが好ましく、 $C_4 \sim C_{12}$ アルキル基であることが更に好ましい。アルキル基の例としては、制限するわけではないが、プロピル、イソプロピル、 $n$ -ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、ドデカニル等を挙げることができる。

本発明の第1態様において、Rで示される「 $C_3 \sim C_{30}$ アルケニル基」は、 $C_3 \sim C_{15}$ アルケニル基であることが好ましく、 $C_4 \sim C_{10}$ アルケニル基であることが更に好ましい。アルケニル基の例としては、制限するわけではないが、2-プロペニル、2-メチル-2-プロペニル、2-メチルアリル、2-ブテニル、3-ブテニル、4-ペンテニル等を挙げることができる。

本発明の第1態様において、Rで示される「 $C_3 \sim C_{30}$ アルキニル基」は、 $C_3 \sim C$

10

20

30

40

50



15 アルキニル基であることが好ましく、 $C_4 \sim C_{10}$  アルキニル基であることが更に好ましい。アルキニル基の例としては、制限するわけではないが、3 - ブチニル、4 - ペンチニル等を挙げることができる。

本発明の第1態様において、Rで示される「 $C_5 \sim C_{30}$  アルキルジエニル基」は、 $C_5 \sim C_{15}$  アルキルジエニル基であることが好ましく、 $C_6 \sim C_{10}$  アルキルジエニル基であることが更に好ましい。アルキルジエニル基の例としては、制限するわけではないが、3, 5 - ヘキサジエニル等を挙げることができる。

本発明の第1態様において、Rで示される「 $C_7 \sim C_{30}$  アリールアルキル基」は、 $C_7 \sim C_{12}$  アリールアルキル基であることが好ましい。アリールアルキル基の例としては、制限するわけではないが、ベンジル、フェネチル、ジフェニルメチル、トリフェニルメチル、1 - ナフチルメチル、2 - ナフチルメチル、2, 2 - ジフェニルエチル、3 - フェニルプロピル、4 - フェニルブチル、5 - フェニルペンチル等を挙げることができるが、2, 2 - ジフェニルエチル、3 - フェニルプロピル、4 - フェニルブチル、5 - フェニルペンチルであることが好ましい。

本発明の第1態様において、Rで示される「 $C_3 \sim C_{30}$  シクロアルキル基」は、 $C_3 \sim C_{10}$  シクロアルキル基であることが好ましい。シクロアルキル基の例としては、制限するわけではないが、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル等を挙げることができる。

本発明の第1態様において、Rで示される「 $C_3 \sim C_{30}$  シクロアルケニル基」は、 $C_3 \sim C_{10}$  シクロアルケニル基であることが好ましい。シクロアルケニル基の例としては、制限するわけではないが、シクロプロペニル、シクロブテニル、シクロペンテニル、シクロヘキセニル等を挙げることができる。

本発明の第1態様において、Rで示される「縮合多環式基」は、縮合多環式から任意の1個の水素原子を除いて形成される1価基などが挙げられる。

本発明の第1態様において、Rで示される「 $C_3 \sim C_{10}$  飽和環基若しくは不飽和環基」としては、単環式基、縮合多環式基などが挙げられる。

「単環式基」としては、例えば、3 ~ 7員環から任意の1個の水素原子を除いて形成される1価基や、このような1価基 -  $C_1 \sim C_6$  アルキル基などが挙げられる。

「縮合多環式基」としては、例えば、縮合多環式から任意の1個の水素原子を除いて形成される1価基やこのような1価基 -  $C_1 \sim C_6$  アルキル基などが挙げられる。

本発明の第1態様において、Rで示される「 $C_3 \sim C_{10}$  飽和環基若しくは不飽和環基」は、酸素原子又は式 -  $N(B) -$  で示される基(式中、Bは水素原子、置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_{10}$  炭化水素基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n* - ブチル、*sec* - ブチル、*tert* - ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等)、又は置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_{10}$  アルコキシカルボニル基である。)で中断されている5員 ~ 7員短環式基であることが好ましく、ピペリジニル、テトラヒドロピラニル、テトラヒドロピラニルメチルであることがより好ましい。

本発明の第1態様において、Rで示される「炭化水素基」、「 $C_3 \sim C_{10}$  飽和環基若しくは不飽和環基」、Rが「式 -  $N(B) -$  で示される基で中断される $C_3 \sim C_{10}$  飽和環基若しくは不飽和環基」である場合に、Bで示される「 $C_1 \sim C_{10}$  炭化水素基」及び「 $C_1 \sim C_{10}$  アルコキシカルボニル基」には、置換基が導入されていてもよい。この置換基としては、好ましくは芳香族マグネシウム試薬と反応しないものを挙げることができる。例えば、置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_{10}$  アルキル基(例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、トリフルオロメチル等)、

$C_2 \sim C_{10}$  アルケニル基(例えば、ビニル、アリル、プロペニル、イソプロペニル、2 - メチル - 1 - プロペニル、2 - メチルアリル、2 - ブテニル等)、

$C_2 \sim C_{20}$  アルキニル基(例えば、エチニル、プロピニル、ブチニル等)、

$C_2 \sim C_{20}$  アルケニル -  $C_1 \sim C_{20}$  アルキル -  $C_1 \sim C_{20}$  アルコキシ(例、1 - ビニル - 1 - メチルエトキシなど)、

保護された水酸基(-OB<sup>3</sup> : 式中、B<sup>3</sup>は、アルキル基、アリールアルキル基、エーテ

10

20

30

40

50

ル置換基を有するアリーールアルキル基、エーテル置換基を有するアルキル基、又は $C_1 \sim C_6$ 炭化水素基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等）等の置換基を有していてもよいシリル基である。保護された水酸基の例としては、メトキシ基、ベンジロキシ基、*p*-メトキシベンジロキシ基、メトキシメチル基、エトキシエチル基、トリメチルシロキシ、ジメチル*tert*-ブチルシロキシ、トリエチルシロキシ、*tert*-ブチルジフェニルシロキシ等が挙げられる）、

トリアルキルシリル基（ $-B^4$ ：式中、 $B^4$ は $C_1 \sim C_6$ 炭化水素基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等）等の置換基を有していてもよいシリル基である。トリアルキルシリル基の例としては、トリメチルシリル、ジメチル*tert*-ブチルシリル、トリエチルシリル、*tert*-ブチルジフェニルシリル等が挙げられる。）

アセタール基（ $-CB^5(OB^6)(OB^7)$ ：式中、 $B^5$ は、水素原子又は置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $B^6$ 及び $B^7$ は、それぞれ互いに独立し、同一または異なって、置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_6$ 炭化水素基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等）であり、互いに架橋していてもよい。 $B^6$ 及び $B^7$ の例としては、メチル基、エチル基等が挙げられ、互いに架橋している場合には、エチレン基、トリメチレン基等が挙げられる）、

N-インドリル、

$C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等）、

$C_6 \sim C_{10}$ アリーールオキシ基（例えば、フェニルオキシ、ナフチルオキシ、ビフェニルオキシ等）、

ハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素）、

アミド基、又は

アミノ基などを挙げるができる。

また、芳香族マグネシウム試薬との反応性が若干あるため収率が低下するが、導入可能な置換基としては、

$C_6 \sim C_{20}$ アリーール- $C_1 \sim C_{20}$ アルキルオキシカルボニル（例、ベンジルオキシカルボニルなど）、

$C_1 \sim C_{20}$ アルキル-カルボニルオキシ（例、アセトキシ、プロパノイルオキシ、ピバロイルオキシなど）、

エトキシカルボニル等を挙げるができる。

以上の置換基は、置換可能な位置に1個以上導入されていてもよく、例えば、1個~4個導入されていてもよい。置換基数が2個以上である場合、各置換基は同一であっても異なってもよい。

本発明の第1態様において、「置換基を有していてもよい縮合多環式」の例としては、制限するわけではないが、コレスタン等のステロイド骨格を有するもの等を挙げるができる。

本発明の第1態様において、Rは、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることが好ましい。

「置換基を有していてもよい第一級アルキル基」としては、好ましくは、3-N-インドリルプロピル、エトキシカルボニルペンチル、オクチル等を挙げるができる。

また、「置換基を有していてもよい第二級アルキル基」としては、好ましくは、*sec*-ブチル、シクロヘキシル、4-*tert*-ブチルシクロヘキシル、シクロヘブチル、2-ノルボルニル等を挙げるができる。

また、本発明の第1態様において、Rが取り得る「第一級アルキル基」、「第二級アルキル基」に導入される置換基としては、特に好ましくは、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、*tert*-ブトキシカルボニル基、アルケニル基、アルキニル基、3-N-インドリル基、アルキルエーテル、シリルエーテル、3級アミノ基、2級アミド基又

10

20

30

40

50

はアセタールを挙げることができる。

上記式(2)中、Xは、ハロゲン原子又はスルホン酸エステル( $R' - S(O)_2 - O -$ )である。ハロゲン原子としては、臭素、ヨウ素又は塩素であることが好ましい。スルホン酸エステルは、p-トルエンスルホン酸エステルであることが好ましい。

本発明の第1態様において、Xは、ハロゲン原子であることが好ましく、ヨウ素、臭素、塩素であることがより好ましい。

本発明の第1態様にかかる芳香族化合物の製造方法においては、下記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬が用いられる。



上記式(3a)中、Aは、置換基を有していてもよい $C_4 \sim C_{20}$ 芳香族基又は置換基を有していてもよい複素芳香族基である。 10

本明細書において、「芳香族基」としては、単環式芳香族基、多環式芳香族基を挙げることができる。

「単環式芳香族基」としては、例えば、ベンゼン環、5員又は6員芳香族複素環から任意の1個の水素原子を除いて形成される1価基などが挙げられる。

「5員又は6員芳香族複素環」としては、フラン、チオフェン、ピロール、ピラン、チオピラン、ピリジン、チアゾール、イミダゾール、ピリミジン、1,3,5-トリアジン等を挙げることができる。

「多環式芳香族基」としては、多環式芳香族炭化水素、多環式複素芳香環から任意の1個の水素原子を除いて形成される1価基などが挙げられる。 20

「多環式芳香族炭化水素」としては、ビフェニル、トリフェニル、ナフタレン、インデン、アントラセン、フェナントレン等を挙げることができる。

「多環式複素芳香環」としては、インドール、キノリン、プリン等を挙げることができる。

また、本明細書において、「複素芳香族基」としては、炭素原子以外に窒素原子、硫黄原子および酸素原子から選ばれるヘテロ原子1個以上を含む5~7員芳香族複素環などから任意の1個の水素原子を除いて形成される1価基などが挙げられる。

「複素芳香族基」としては、2-,3-または4-ピリジルなどのピリジル、2-ベンゾフラニルまたは3-ベンゾフラニルなどのベンゾフラニル、2-インドリル、3-インドリルなどのインドリル、ピリミジル基などが挙げられる。 30

本発明の第1態様において、Aで示される「 $C_4 \sim C_{20}$ 芳香族基」、「複素芳香族基」には、置換基が導入されていてもよい。この置換基としては、好ましくは、芳香族マグネシウム試薬と反応しないものを挙げることができる。例えば、置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基(例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、トリフルオロメチル等)、

$C_2 \sim C_{10}$ アルケニル基(例えば、ビニル、アリル、プロペニル、イソプロペニル、2-メチル-1-プロペニル、2-メチルアリル、2-ブテニル等)、

$C_2 \sim C_{20}$ アルキニル基(例えば、エチニル、プロピニル、ブチニル等)、

保護された水酸基( $-OB^3$ :式中、 $B^3$ は、アルキル基、アリールアルキル基、エーテル置換基を有するアリールアルキル基、エーテル基を有するアルキル基、又は $C_1 \sim C_6$ 炭化水素基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、n-ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等)等の置換基を有していてもよいシリル基である。保護された水酸基の例としては、メトキシ基、ベンジロキシ基、p-メトキシベンジロキシ基、メトキシメチル基、エトキシエチル基、トリメチルシロキシ、ジメチルtert-ブチルシロキシ、トリエチルシロキシ、tert-ブチルジフェニルシロキシ等が挙げられる)、

アセタール基( $-CB^5(OB^6)(OB^7)$ ):式中、 $B^5$ は、水素原子又は置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $B^6$ 及び $B^7$ は、それぞれ互いに独立し、同一または異なって、置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_6$ 炭化水素基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、n-ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチ 50

ル、ヘキシル、フェニル等)であり、互いに架橋していてもよい。B<sup>6</sup>及びB<sup>7</sup>の例としては、メチル基、エチル基等が挙げられ、互いに架橋している場合には、エチレン基、トリメチレン基等が挙げられる)、

N-インドリル、

C<sub>1</sub> ~ C<sub>10</sub> アルコキシ基 (例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等)、

C<sub>6</sub> ~ C<sub>10</sub> アリールオキシ基 (例えば、フェニルオキシ、ナフチルオキシ、ピフェニルオキシ等)、

ハロゲン原子 (例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)、又は、

アミノ基などを挙げることができる。この場合、置換基は、置換可能な位置に1個以上導入されていてもよく、例えば、1個~4個導入されていてもよい。置換基数が2個以上である場合、各置換基は同一であっても異なってもよい。 10

更に、互いに架橋する置換基が、置換可能な2以上の位置に環状に導入されていてもよく、このような置換基としては、例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシ、テトラメチルエチレンジオキシ、プロピレンジオキシ基などを挙げることができる。

本発明の第1態様において、Aは、置換基を有していてもよいフェニル基であることが好ましく、フェニル、2-メチルフェニル、4-メチルフェニル、4-メトキシフェニル、3,4-(メチレンジオキシ)フェニルであることがより好ましい。

上記式(3a)中、Y<sup>1</sup>は、臭素、ヨウ素、塩素、又は炭素アニオン配位子である。

本明細書において、「炭素アニオン配位子」としては、置換基を有してもよいフェニル基、プロピニル基(CH<sub>3</sub>C≡C-)、フェニルエチニル基(PhC≡C-)、トリメチルシリルメチル基(Me<sub>3</sub>SiCH<sub>2</sub>-)等を挙げることができる。 20

本発明の第1態様において、Y<sup>1</sup>が「フェニル基」の場合は、置換基が導入されていてもよい。この置換基としては、例えば、C<sub>1</sub> ~ C<sub>10</sub> アルキル基 (例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、トリフルオロメチル等)、C<sub>1</sub> ~ C<sub>10</sub> アルコキシ基 (例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等)などを挙げることができる。この場合、置換基は、置換可能な位置に1個以上導入されていてもよく、例えば、1個~4個導入されていてもよい。置換基数が2個以上である場合、各置換基は同一であっても異なってもよい。

更に、互いに架橋する置換基が、置換可能な2以上の位置に環状に導入されていてもよく、このような置換基としては、例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシ、テトラメチルエチレンジオキシ、プロピレンジオキシ基などを挙げることができる。 30

本発明の第1態様において、Y<sup>1</sup>は、臭素であることが好ましい。


本発明の第1態様において、上記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、1モル当量以上であり、好ましくは1.1モル当量~2モル当量である。

本発明の第1態様にかかる芳香族化合物の製造方法においては、廉価で且つ低毒性である鉄触媒が用いられる。

本発明の第1態様で用いられる鉄触媒は、鉄塩であってもよく、鉄錯体であってもよい。

鉄触媒が鉄塩である場合には、例えば、鉄についての塩酸、硫酸等の無機酸の塩を用いることができる。たとえば、ハロゲン化鉄(III)が好ましく、特に、FeCl<sub>3</sub>のような鉄塩(III)が好ましく用いられる。 40

鉄触媒が鉄錯体である場合には、配位子としては、カルボニル、ハロゲン原子、シッフ塩基、ポリアミン、ジメチルホルムアミド等が好ましく用いられる。中心金属は、4~6配位であることが好ましい。具体的には、一価のカルボニル錯体[FeCp(CO)<sub>2</sub>]<sub>2</sub>(下記式1)、2価の中性シッフ塩基錯体(下記式2)、3価のカチオン性テトラミン錯体(下記式3)、3価のジメチルホルムアミド錯体(下記式4)といった鉄錯体を好ましく用いることができる。



10

本発明の第1態様において、鉄触媒は、鉄塩であることが好ましく、 $\text{FeCl}_3$ であることがより好ましい。 20

本発明の第1態様において、鉄触媒の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、0.001モル当量~0.5モル当量であり、好ましくは0.01モル当量~0.1モル当量であり、更に好ましくは0.03モル当量~0.07モル当量である。

本発明の第1態様にかかる芳香族化合物の製造方法においては、ジアミン化合物が用いられる。

本発明の第1態様においてジアミン化合物を用いることにより、副反応による副生成物の発生を極力抑えることができ、目的生成物を高収率で得ることが可能となる。

ジアミン化合物は、2座配位子であることが好ましく、更に好ましくは、N, N, N', N'-テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)等の置換基を有していてもよいエチレンジアミンを挙げることができる。 30

本発明の第1態様において、ジアミン化合物の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、0.5モル当量~10モル当量であり、好ましくは1モル当量~3モル当量であり、更に好ましくは1モル当量~2モル当量である。

本発明の第1態様において、典型的には、上記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬と上記ジアミン化合物とを、上記式(2)で示される化合物と上記鉄触媒とを有する溶液に添加して攪拌する。あるいは、上記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬を、上記式(2)で示される化合物と上記鉄触媒と上記ジアミン化合物とを有する溶液に添加して攪拌する。


いずれの場合も、収率を高める観点から、添加はゆっくりと滴下することによって行うことが好ましい。滴下の速度は、反応のスケールにもよるが、例えば、上記式(2)で示される化合物の量が50mmol程度の場合には、芳香族マグネシウム試薬(3a)の溶液を1mmol/分程度の速度で加えるが好ましく、上記式(2)で示される化合物の量が1mmol程度の場合には、芳香族マグネシウム試薬(3a)で示される化合物の溶液を0.06mmol/分程度が好ましい。 40

本発明の第1態様において、反応は、好ましくは-10~50の温度範囲で行われ、特に好ましくは0~30の温度範囲で行われる。圧力は、常圧であることが好ましい。

本発明の第1態様において、溶媒としては、上記式(2)で示される化合物を溶解することができる溶媒が好ましい。溶媒は、脂肪族又は芳香族の有機溶媒が用いられる。例え 50

ば、テトラヒドロフラン又はジエチルエーテル等のエーテル系溶媒；トルエン等の芳香族炭化水素が用いられる。

本発明の第2態様では、ジアミン化合物存在下、下記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬と、下記式(4b)で示される亜鉛化合物とを反応させ、反応混合物を得る工程と、鉄触媒存在下、前記反応混合物と、下記式(2)で示される化合物とを反応させる工程とを含むことを特徴とする、下記式(1)で示される芳香族化合物の製造方法が提供される。



10

[上記式中、R、X、Y<sup>1</sup>及びAは上記の意味を有する。]

本発明の第2態様では、下記式(2)で示される化合物が用いられる。



上記式中、R、Xについての説明は、本発明の第1態様において説明したのと同様である。

本発明の第2態様において、Rで示される「炭化水素基」、「C<sub>3</sub>~C<sub>10</sub>飽和環基若しくは不飽和環基」、Rが「式-N(B)-で示される基で中断されるC<sub>3</sub>~C<sub>10</sub>飽和環基若しくは不飽和環基」である場合に、Bで示される「C<sub>1</sub>~C<sub>10</sub>炭化水素基」及び「C<sub>1</sub>~C<sub>10</sub>アルコキシカルボニル基」には、置換基が導入されていてもよい。この置換基としては、好ましくは、上記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬と、上記式(4b)で示される亜鉛化合物とを反応させて得られる有機亜鉛試薬と反応しないものを挙げる事ができる。例えば、

20

置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>~C<sub>10</sub>アルキル基(例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、トリフルオロメチル等)、

C<sub>2</sub>~C<sub>10</sub>アルケニル基(例えば、ビニル、アリル、プロペニル、イソプロペニル、2-メチル-1-プロペニル、2-メチルアリル、2-ブテニル等)、

C<sub>2</sub>~C<sub>20</sub>アルキニル基(例えば、エチニル、プロピニル、ブチニル等)、

C<sub>2</sub>~C<sub>20</sub>アルケニル-C<sub>1</sub>~C<sub>20</sub>アルキル-C<sub>1</sub>~C<sub>20</sub>アルコキシ(例、1-ビニル-1-メチルエトキシなど)、

30

C<sub>6</sub>~C<sub>20</sub>アリール-C<sub>1</sub>~C<sub>20</sub>アルキルオキシカルボニル(例、ベンジルオキシカルボニルなど)、

C<sub>1</sub>~C<sub>20</sub>アルキル-カルボニルオキシ(例、アセトキシ、プロパノイルオキシ、ピバロイルオキシなど)、

保護された水酸基(-OB<sup>3</sup>：式中、B<sup>3</sup>は、アルキル基、アリールアルキル基、エーテル置換基を有するアリールアルキル基、エーテル置換基を有するアルキル基、又はC<sub>1</sub>~C<sub>6</sub>炭化水素基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、n-ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等)等の置換基を有していてもよいシリル基である。保護された水酸基の例としては、メトキシ基、ベンジロキシ基、b-メトキシベンジロキシ基、メトキシメチル基、エトキシエチル基、トリメチルシロキシ、ジメチルト-ブチルシロキシ、トリエチルシロキシ、t-ブチルジフェニルシロキシ等が挙げられる)、

40

トリアルキルシリル基(-B<sup>4</sup>：式中、B<sup>4</sup>はC<sub>1</sub>~C<sub>6</sub>炭化水素基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、n-ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等)等の置換基を有していてもよいシリル基である。トリアルキルシリル基の例としては、トリメチルシリル、ジメチルト-ブチルシリル、トリエチルシリル、t-ブチルジフェニルシリル等が挙げられる。)、

アセタール基(-CB<sup>5</sup>(OB<sup>6</sup>)(OB<sup>7</sup>)：式中、B<sup>5</sup>は、水素原子又は置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>~C<sub>6</sub>アルキル基、B<sup>6</sup>及びB<sup>7</sup>は、それぞれ互いに独立し、同一または異なって、置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>~C<sub>6</sub>炭化水素基(例えば、メチル、エチ

50

ル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等)であり、互いに架橋していてもよい。B<sup>6</sup>及びB<sup>7</sup>の例としては、メチル基、エチル基等が挙げられ、互いに架橋している場合には、エチレン基、トリメチレン基等が挙げられる)、

N-インドリル、

C<sub>1</sub> ~ C<sub>10</sub> アルコキシ基 (例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等)、

C<sub>6</sub> ~ C<sub>10</sub> アリールオキシ基 (例えば、フェニルオキシ、ナフチルオキシ、ビフェニルオキシ等)、

ハロゲン原子 (例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)、

アミド基、又は

アミノ基などを挙げることができる。

また、芳香族マグネシウム試薬との反応性があるものの、有機亜鉛試薬を経由することで導入可能となった置換基としては、

エステル基 (-COOB<sup>2</sup>: 式中、B<sup>2</sup>はC<sub>1</sub> ~ C<sub>6</sub>炭化水素基 (例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等)である。エステル基の例としては、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、2-メトキシエトキシカルボニル、*tert*-ブトキシカルボニル、C<sub>1</sub> ~ C<sub>20</sub>アルキルカルボニル (例、ピバロイルなど)、または、

ニトリル基 (-CN)、

等を挙げることができる。

以上の置換基は、置換可能な位置に1個以上導入されていてもよく、例えば、1個 ~ 4個導入されていてもよい。置換基数が2個以上である場合、各置換基は同一であっても異なってもよい。

本発明の第2態様において、Rは、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることが好ましい。


「置換基を有していてもよい第一級アルキル基」としては、好ましくは、3-N-インドリルプロピル、エトキシカルボニルペンチル、オクチル等を挙げることができる。

また、「置換基を有していてもよい第二級アルキル基」としては、好ましくは、*sec*-ブチル、シクロヘキシル、4-t-ブチルシクロヘキシル、シクロヘブチル、2-ノルボルニル等を挙げることができる。

また、本発明の第2態様において、Rが取り得る「第一級アルキル基」、「第二級アルキル基」に導入される置換基としては、特に好ましくは、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、*tert*-ブトキシカルボニル基、シアノ基、アルケニル基、アルキニル基、3-N-インドリル基、アルキルエーテル、シリルエーテル、3級アミノ基、2級アミド基、又はアセタールを挙げることができる。

本発明の第2態様において、Xは、ハロゲン原子であることが好ましく、ヨウ素、臭素であることがより好ましい。もっとも、若干収率は落ちるがXを塩素とすることも可能である。

本発明の第2態様では、下記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬が用いられる。



上記式中、A、Y<sup>1</sup>についての説明は、本発明の第1態様において説明したのと同様である。

本発明の第2態様において、Aで示される「C<sub>4</sub> ~ C<sub>20</sub>芳香族基」、「複素芳香族基」には、置換基が導入されていてもよい。この置換基としては、好ましくは、芳香族マグネシウム試薬と反応しないものを挙げることができる。例えば、

置換基を有していてもよいC<sub>1</sub> ~ C<sub>10</sub>アルキル基 (例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、トリフルオロメチル等)、

C<sub>2</sub> ~ C<sub>10</sub>アルケニル基 (例えば、ビニル、アリル、プロペニル、イソプロペニル、2-メチル-1-プロペニル、2-メチルアリル、2-ブテニル等)、

10

20

30

40

50

$C_2 \sim C_{20}$  アルキニル基（例えば、エチニル、プロピニル、ブチニル等）、  
保護された水酸基（ $-OB^3$ ：式中、 $B^3$  は、アルキル基、アリールアルキル基、エーテル置換基を有するアリールアルキル基、エーテル置換基を有するアルキル基、又は  $C_1 \sim C_6$  炭化水素基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等）等の置換基を有していてもよいシリル基である。保護された水酸基の例としては、メトキシ基、ベンジロキシ基、*p*-メトキシベンジロキシ基、メトキシメチル基、エトキシエチル基、トリメチルシロキシ、ジメチル*t*-ブチルシロキシ、トリエチルシロキシ、*t*-ブチルジフェニルシロキシ等が挙げられる）、

アセタール基（ $-CB^5(OB^6)(OB^7)$ ：式中、 $B^5$  は、水素原子又は置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_6$  アルキル基、 $B^6$  及び  $B^7$  は、それぞれ互いに独立し、同一または異なって、置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_6$  炭化水素基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等）であり、互いに架橋していてもよい  $B^6$  及び  $B^7$  の例としては、メチル基、エチル基等が挙げられ、互いに架橋している場合には、エチレン基、トリメチレン基等が挙げられる）、

N-インドリル、

$C_1 \sim C_{10}$  アルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等）、  
 $C_6 \sim C_{10}$  アリールオキシ基（例えば、フェニルオキシ、ナフチルオキシ、ビフェニルオキシ等）、

ハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素）、又は、

アミノ基などを挙げることができる。この場合、置換基は、置換可能な位置に1個以上導入されていてもよく、例えば、1個～4個導入されていてもよい。置換基数が2個以上である場合、各置換基は同一であっても異なってもよい。


更に、互いに架橋する置換基が、置換可能な2以上の位置に環状に導入されていてもよく、このような置換基としては、例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシ、テトラメチルエチレンジオキシ、プロピレンジオキシ基などを挙げることができる。

本発明の第2態様において、Aは、置換基を有していてもよいフェニル基、ピリジル基であることが好ましく、フェニル、2-メチルフェニル、4-メチルフェニル、4-メトキシフェニル、3,4-(メチレンジオキシ)フェニルであることがより好ましい。

本発明の第2態様において、 $Y^1$  は、ヨウ素、臭素、塩素であることが好ましい。

本発明の第2態様において、上記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、1モル当量以上であり、好ましくは2モル当量～4モル当量であり、約3モル当量であることが最も好ましい。


本発明の第2態様において、任意に、下記式(4a)で示されるマグネシウム化合物を用いてもよい。



[ 式中、 $Z^1$  は、炭素アニオン配位子であり、 $Z^2$  は、臭素、ヨウ素、又は塩素である。 ]

この場合は、上記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬の量は、上記式(4a)で示されるマグネシウム化合物との合計量が、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、1モル当量以上であり、好ましくは1.5モル当量～2.5モル当量であり、2モル当量であることが最も好ましい。

本発明の第2態様では、下記式(4b)で示される亜鉛化合物が用いられる。



$Z^3$  および  $Z^4$  は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、臭素、ヨウ素、塩素、フッ素、又はトリフルオロメタンスルホニル基である。

本発明の第2態様において、 $Z^3$  および  $Z^4$  は、臭素、塩素であることが好ましく、塩素であることがさらに好ましい。

本発明の第2態様では、上記式(4b)で示される亜鉛化合物を用いるため、当該亜鉛



化合物と上記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬とが反応して得られる有機亜鉛試薬において、亜鉛上の置換基Aの求核性および塩基性がともに低いことから、置換基Rを室温でグリニャール試薬と反応するような官能基(例えば、エステル基、シアノ基、アルキルカルボニル基など)を有する置換基とすることが可能となる。もっとも、本発明の第1態様においても、置換基Rをエトキシカルボニル基を有する置換基とすることは可能であるが、収率がやや低く、副反応を起こしやすい。これに対し、本発明の第2態様では副反応が起こりにくく、収率も格段に向上する。置換基Rを以上のような置換基とすることができることは、複雑な構造を有する医薬品中間体合成の短段階合成による生産効率向上の点で好ましい。

また、本発明の第1態様では、反応に際して、上記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬とジアミン化合物とを、上記式(2)で示される化合物と鉄触媒とを有する溶液に時間をかけて滴下する、あるいは、上記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬を、上記式(2)で示される化合物と鉄触媒とジアミン化合物とを有する溶液に時間をかけて滴下する必要がある。これに対し、本発明の第2態様では、上記式(4b)で示される亜鉛化合物を用いるため、添加をするに際して時間をかけて滴下する必要がなく、反応操作が簡便になる。

本発明の第2態様において、上記式(4b)で示される亜鉛化合物の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、1モル当量以上であり好ましくは1.1モル当量~2モル当量であり、約1.5モル当量であることが最も好ましい。

本発明の第2態様では、鉄触媒が用いられる。鉄触媒についての説明は、本発明の第1態様において説明したのと同様である。

本発明の第2態様で用いられる鉄触媒は、ハロゲン化鉄(III)が好ましく、特に、 $FeCl_3$ のような鉄塩(III)が好ましく用いられる。

本発明の第2態様において、鉄触媒の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、0.001モル当量~0.5モル当量であり、好ましくは0.01モル当量~0.1モル当量であり、更に好ましくは0.03モル当量~0.07モル当量である。

本発明の第2態様にかかる芳香族化合物の製造方法においては、ジアミン化合物が用いられる。ジアミン化合物についての説明は、本発明の第1態様において説明したのと同様である。

本発明の第2態様において、ジアミン化合物は、2座配位子であることが好ましく、更に好ましくは、N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)等の置換基を有していてもよいエチレンジアミンを挙げることができる。

本発明の第2態様において、ジアミン化合物の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、0.5モル当量~10モル当量であり、好ましくは1モル当量~3モル当量であり、更に好ましくは1モル当量~2モル当量である。

本発明の第2態様において、典型的には、上記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬と上記式(4b)で示される亜鉛化合物と上記ジアミン化合物とを有する溶液に、上記式(2)で示される化合物と上記鉄触媒とを添加して攪拌する。

本発明の第2態様において、上記式(4b)で示される亜鉛化合物と上記ジアミン化合物とを別々に使用する代わりに、これらの錯体を使用することもできる。

本発明の第2態様において、反応は、好ましくは0~100の温度範囲で行われ、特に好ましくは40~60の温度範囲で行われる。圧力は、常圧であることが好ましい。

本発明の第2態様において、溶媒としては、上記式(2)で示される化合物を溶解することができる溶媒が好ましい。溶媒は、脂肪族又は芳香族の有機溶媒が用いられる。例えば、テトラヒドロフラン又はジエチルエーテル等のエーテル系溶媒;トルエン等の芳香族炭化水素が用いられる。

本発明の第3態様では、ジアミン化合物存在下、下記式(3c)で示される芳香族リチウム試薬と、下記式(4b)で示される亜鉛化合物とを反応させ、次いで、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、ガリウム及びアルミニウムからなる群より選ばれ

10


20

30

40

50

る一種以上の金属を含むルイス酸金属化合物を反応させ、反応混合物を得る工程と、鉄触媒存在下、前記反応混合物と、下記式(2)で示される化合物とを反応させる工程とを含むことを特徴とする、下記式(1)で示される芳香族化合物の製造方法が提供される。



[ 上記式中、R、X、Z<sup>3</sup>、Z<sup>4</sup>及びAは上記の意味を有する。 ]

本発明の第3態様では、下記式(2)で示される化合物が用いられる。



上記式中、R、Xについての説明は、本発明の第1態様において説明したのと同様である。

本発明の第3態様において、Rで示される「炭化水素基」、「C<sub>3</sub>~C<sub>10</sub>飽和環基若しくは不飽和環基」、Rが「式-N(B)-で示される基で中断されるC<sub>3</sub>~C<sub>10</sub>飽和環基若しくは不飽和環基」である場合に、Bで示される「C<sub>1</sub>~C<sub>10</sub>炭化水素基」及び「C<sub>1</sub>~C<sub>10</sub>アルコキシカルボニル基」には、置換基が導入されていてもよい。この置換基としては、好ましくは、上記式(3c)で示される芳香族リチウム試薬と、上記式(4b)で示される亜鉛化合物とを反応させ、次いで、上記ルイス酸金属化合物を反応させて得られる有機亜鉛試薬と反応しないものを挙げるができる。例えば、置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>~C<sub>10</sub>アルキル基(例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、トリフルオロメチル等)、

C<sub>2</sub>~C<sub>10</sub>アルケニル基(例えば、ビニル、アリル、プロペニル、イソプロペニル、2-メチル-1-プロペニル、2-メチルアリル、2-ブテニル等)、

C<sub>2</sub>~C<sub>20</sub>アルキニル基(例えば、エチニル、プロピニル、ブチニル等)、

C<sub>2</sub>~C<sub>20</sub>アルケニル-C<sub>1</sub>~C<sub>20</sub>アルキル-C<sub>1</sub>~C<sub>20</sub>アルコキシ(例、1-ビニル-1-メチルエトキシなど)、

C<sub>6</sub>~C<sub>20</sub>アリール-C<sub>1</sub>~C<sub>20</sub>アルキルオキシカルボニル(例、ベンジルオキシカルボニルなど)、

C<sub>1</sub>~C<sub>20</sub>アルキル-カルボニルオキシ(例、アセトキシ、プロパノイルオキシ、ピバロイルオキシなど)、

保護された水酸基(-OB<sup>3</sup>:式中、B<sup>3</sup>は、アルキル基、アリールアルキル基、エーテル置換基を有するアリールアルキル基、エーテル置換基を有するアルキル基、又はC<sub>1</sub>~C<sub>6</sub>炭化水素基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、n-ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等)等の置換基を有していてもよいシリル基である。保護された水酸基の例としては、メトキシ基、ベンジロキシ基、p-メトキシベンジロキシ基、メトキシメチル基、エトキシエチル基、トリメチルシロキシ、ジメチルt-ブチルシロキシ、トリエチルシロキシ、t-ブチルジフェニルシロキシ等が挙げられる)、

トリアルキルシリル基(-B<sup>4</sup>:式中、B<sup>4</sup>はC<sub>1</sub>~C<sub>6</sub>炭化水素基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、n-ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等)等の置換基を有していてもよいシリル基である。トリアルキルシリル基の例としては、トリメチルシリル、ジメチルt-ブチルシリル、トリエチルシリル、t-ブチルジフェニルシリル等が挙げられる。)

アセタール基(-CB<sup>5</sup>(OB<sup>6</sup>)(OB<sup>7</sup>):式中、B<sup>5</sup>は、水素原子又は置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>~C<sub>6</sub>アルキル基、B<sup>6</sup>及びB<sup>7</sup>は、それぞれ互いに独立し、同一または異なって、置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>~C<sub>6</sub>炭化水素基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、n-ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等)であり、互いに架橋していてもよい。B<sup>6</sup>及びB<sup>7</sup>の例としては、メチル基、エチル基等が挙げられ、互いに架橋している場合には、エチレン基、トリメチレン基等が挙げられる)、

10

20

30

40

50

N - インドリル、  
 $C_1 \sim C_{10}$  アルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等）、  
 $C_6 \sim C_{10}$  アリールオキシ基（例えば、フェニルオキシ、ナフチルオキシ、ピフェニル  
 オキシ等）、  
 ハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素）、  
 アミド基、又は  
 アミノ基などを挙げる事ができる。

また、芳香族リチウム試薬との反応性があるものの、有機亜鉛試薬を経由することで導  
 入可能となった置換基としては、  
 エステル基（ $-COOB^2$ ：式中、 $B^2$  は  $C_1 \sim C_6$  炭化水素基（例えば、メチル、エチル 10  
 ル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチ  
 ル、ヘキシル、フェニル等）である。エステル基の例としては、メトキシカルボニル、エ  
 トキシカルボニル、2-メトキシエトキシカルボニル、*t*-ブトキシカルボニル、  
 $C_1 \sim C_{20}$  アルキルカルボニル（例、ピパロイルなど）、または、  
 ニトリル基（ $-CN$ ）、  
 等を挙げる事ができる。

以上の置換基は、置換可能な位置に1個以上導入されていてもよく、例えば、1個～4  
 個導入されていてもよい。置換基数が2個以上である場合、各置換基は同一であっても異  
 なっていてもよい。

本発明の第3態様において、Rは、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は 20  
 、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることが好ましい。

「置換基を有していてもよい第一級アルキル基」としては、好ましくは、3-N-イン  
 ドリルプロピル、エトキシカルボニルペンチル、オクチル等を挙げる事ができる。

また、「置換基を有していてもよい第二級アルキル基」としては、好ましくは、*sec*  
 -ブチル、シクロヘキシル、4-*t*-ブチルシクロヘキシル、シクロヘブチル、2-ノル  
 ボルニル等を挙げる事ができる。

また、本発明の第3態様において、Rが取り得る「第一級アルキル基」、「第二級アル  
 キル基」に導入される置換基としては、特に好ましくは、メトキシカルボニル基、エトキ  
 シカルボニル基、*tert*-ブトキシカルボニル基、シアノ基、アルケニル基、アルキニ  
 ル基、3-N-インドリル基、アルキルエーテル、シリルエーテル、又はアセタールを挙 30  
 げることができる。

本発明の第3態様において、Xは、ハロゲン原子であることが好ましく、ヨウ素、臭素  
 であることがより好ましい。もっとも、若干収率は落ちるがXを塩素とすることも可能で  
 ある。

本発明の第3態様では、下記式(3c)で示される芳香族リチウム試薬が用いられる。



上記式中、Aについての説明は、本発明の第1態様において説明したのと同様である。

本発明の第3態様において、Aで示される「 $C_4 \sim C_{20}$  芳香族基」、「複素芳香族基  
 」には、置換基が導入されていてもよい。この置換基としては、好ましくは、芳香族リチ  
 ウム試薬と反応しないものを挙げる事ができる。例えば、 40  
 置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  アルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル  
 、ブチル、トリフルオロメチル等）、

$C_2 \sim C_{10}$  アルケニル基（例えば、ビニル、アリル、プロペニル、イソプロペニル、2  
 -メチル-1-プロペニル、2-メチルアリル、2-ブテニル等）、

$C_2 \sim C_{20}$  アルキニル基（例えば、エチニル、プロピニル、ブチニル等）、

保護された水酸基（ $-OB^3$ ：式中、 $B^3$  は、アルキル基、アリールアルキル基、エーテ  
 ル置換基を有するアリールアルキル基、エーテル置換基を有するアルキル基、又は  $C_1 \sim$   
 $C_6$  炭化水素基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*  
*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等）等の置換基を有して 50  
 いてもよいシリル基である。保護された水酸基の例としては、メトキシ基、ベンジロキシ

基、p-メトキシベンジロキシ基、メトキシメチル基、エトキシエチル基、トリメチルシロキシ、ジメチルt-ブチルシロキシ、トリエチルシロキシ、tert-ブチルジフェニルシロキシ等が挙げられる)、

アセタール基(-CB<sup>5</sup>(OB<sup>6</sup>)(OB<sup>7</sup>)):式中、B<sup>5</sup>は、水素原子又は置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>~C<sub>6</sub>アルキル基、B<sup>6</sup>及びB<sup>7</sup>は、それぞれ互いに独立し、同一または異なって、置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>~C<sub>6</sub>炭化水素基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、n-ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等)であり、互いに架橋していてもよい。B<sup>6</sup>及びB<sup>7</sup>の例としては、メチル基、エチル基等が挙げられ、互いに架橋している場合には、エチレン基、トリメチレン基等が挙げられる)、

10

N-インドリル、

C<sub>1</sub>~C<sub>10</sub>アルコキシ基(例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等)、

C<sub>6</sub>~C<sub>10</sub>アリーロキシ基(例えば、フェニロキシ、ナフチロキシ、ピフェニロキシ等)、

ハロゲン原子(例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)、又は、

アミノ基などを挙げることができる。この場合、置換基は、置換可能な位置に1個以上導入されていてもよく、例えば、1個~4個導入されていてもよい。置換基数が2個以上である場合、各置換基は同一であっても異なってもよい。

なお、置換基Aにハロゲン原子を導入する際には、ベンザイン類の生成による副反応を防ぐため、-78以下という低温で、芳香族リチウム試薬を調製する操作が必要になり、また、このような芳香族リチウム試薬を使用する場合には、低温下で亜鉛化合物と混合し、有機亜鉛試薬を調製するといった操作が必要になる。

20

更に、互いに架橋する置換基が、置換可能な2以上の位置に環状に導入されていてもよく、このような置換基としては、例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシ、テトラメチルエチレンジオキシ、プロピレンジオキシ基などを挙げることができる。

本発明の第3態様において、Aは、置換基を有していてもよいフェニル基、ナフチル基などの芳香族基、または、ピリジル基、ベンゾフリル基等の複素芳香族基であることが好ましく、フェニル、2-メチルフェニル、4-メチルフェニル、4-メトキシフェニル、3,4-(メチレンジオキシ)フェニル、2-ピリジルであることがより好ましい。

本発明の第3態様において、上記式(3c)で示される芳香族リチウム試薬の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、1モル当量以上であり、好ましくは1.1モル当量~3モル当量であり、約2モル当量であることが最も好ましい。

30

本発明の第3態様では、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、ガリウム及びアルミニウムからなる群より選ばれる一種以上の金属を含むルイス酸金属化合物が用いられる。

本発明の第3態様で用いられるルイス酸金属化合物としては、たとえば、下記式(4c)で示される金属化合物が用いられる。



上記式中、Mは、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、ガリウム、又はアルミニウムである。

40


Z<sup>1</sup>は、それぞれ独立して、同一又は異なって、臭素、ヨウ素、塩素、又は炭素アニオン配位子であり、nは2~4の整数である。

本発明の第3態様において、Mがマグネシウムの場合は、nが2で、一方のZ<sup>1</sup>がトリメチルシリルメチル基であり、他方のZ<sup>1</sup>が臭素、塩素であることが好ましく、一方のZ<sup>1</sup>がトリメチルシリルメチル基であり、他方のZ<sup>1</sup>が塩素であることがさらに好ましい。

また、本発明の第3態様において用いられる他の金属化合物の例としては、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、ガリウム及びアルミニウムからなる群より選ばれる一種以上の金属についての塩酸、硫酸等の無機酸の塩を挙げることができ、ハロゲン化金属であることが好ましく、特に、MgBr<sub>2</sub>、TiCl<sub>4</sub>、ZrCl<sub>4</sub>、HfCl<sub>4</sub>、Ga<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>、AlCl<sub>3</sub>であることが好ましい。

50

本発明の第3態様では、下記式(4b)で示される亜鉛化合物が用いられる。



上記式中、 $Z^3$  および  $Z^4$  についての説明は、本発明の第2態様において説明したのと同様である。

本発明の第3態様において、 $Z^3$  および  $Z^4$  は、臭素、塩素であることが好ましく、塩素であることがさらに好ましい。

本発明の第3態様では、上記式(3c)で示される芳香族リチウム試薬及び上記式(4b)で示される亜鉛化合物を用いるため、両者から生成する有機亜鉛試薬の求核性および塩基性が低いという理由から、置換基Rを室温で芳香族リチウム試薬と反応するような官能基(例えば、エステル基、シアノ基、アルキルカルボニル基など)を有する置換基とすることが可能となる。もっとも、本発明の第1態様においても、置換基Rをエトキシカルボニル基を有する置換基とすることは可能であるが、収率がやや低く、副反応を起こしやすい。これに対し、本発明の第3態様では、本発明の第2態様の場合と同様に、副反応が起こりにくく、収率も格段に向上する。

また、芳香族リチウム試薬(3c)はさまざまな複素環化合物から調製することが可能になることから、多様な芳香環Aをカップリング反応で導入できるようになる。置換基Rおよび置換基Aをこのような置換基とすることができることは、より複雑な構造を有する医薬中間体、有機発光材料などの短段階合成によるプロセス効率化の点で好ましい。

本発明の第3態様において、ルイス酸金属化合物の量は、上記式(3c)で示される化合物1モルに対し、1モル当量以上であり、好ましくは1モル当量~2モル当量であり、さらに好ましくは約1.0モル当量である。

本発明の第3態様において、上記式(4b)で示される亜鉛化合物の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、1モル当量以上であり、好ましくは1.1モル当量~2モル当量であり、約1.5モル当量であることが最も好ましい。

本発明の第3態様において、芳香族リチウム試薬(3c)と亜鉛化合物(4b)とをモル比2:1で混合することによって有機亜鉛試薬 $[A_2Z_n]$ を生じさせる場合には、ルイス酸金属化合物は無機塩であってもよく(例えば、 $MgBr_2$ 、 $TiCl_4$ 、 $ZrCl_4$ 、 $HfCl_4$ 、 $Ga_2Cl_4$ 、 $AlCl_3$ )、また、使用量は亜鉛に対して1モル当量以下であってもよく、0.1モル当量まで減らすことも可能である。

また、本発明の第3態様において、芳香族リチウム試薬(3c)と亜鉛化合物(4b)とをモル比1:1で混合することによって有機亜鉛試薬 $[A-Z_n-Z^3]$ あるいは $[A-Z_n-Z^4]$ を生じさせる場合には、ルイス酸金属化合物がマグネシウム化合物(4a)であり、かつ、 $Z^1$ がトリメチルシリルメチル基であり、かつ亜鉛にたいして約1モル当量使用する必要がある。

本発明の第3態様では、鉄触媒が用いられる。鉄触媒についての説明は、本発明の第1態様において説明したのと同様である。

本発明の第3態様で用いられる鉄触媒は、ハロゲン化鉄(III)が好ましく、特に、 $FeCl_3$ のような鉄塩(III)が好ましく用いられる。

本発明の第3態様において、鉄触媒の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、0.001モル当量~0.5モル当量であり、好ましくは0.01モル当量~0.1モル当量であり、更に好ましくは0.3モル当量~0.07モル当量である。

本発明の第3態様にかかる芳香族化合物の製造方法においては、ジアミン化合物が用いられる。ジアミン化合物についての説明は、本発明の第1態様において説明したのと同様である。

本発明の第3態様において、ジアミン化合物は、2座配位子であることが好ましく、更に好ましくは、N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)等の置換基を有していてもよいエチレンジアミンを挙げることができる。

本発明の第3態様において、ジアミン化合物の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、0.5モル当量~10モル当量であり、好ましくは1モル当量~3モル当量であり、更に好ましくは1モル当量~2モル当量である。

10

20

30

40

50


本発明の第3態様において、典型的には、上記式(3c)で示される芳香族リチウム試薬と上記式(4b)で示されるマグネシウム化合物と上記式(4b)で示される亜鉛化合物と上記ジアミン化合物との溶液に、上記式(2)で示される化合物と上記鉄触媒とを添加して攪拌する。

本発明の第3態様において、上記式(4b)で示される亜鉛化合物と上記ジアミン化合物とを別々に使用する代わりに、これらの錯体を使用することもできる。

本発明の第3態様において、反応は、好ましくは0 ~ 100 の温度範囲で行われ、特に好ましくは40 ~ 60 の温度範囲で行われる。圧力は、常圧であることが好ましい。

本発明の第3態様において、溶媒としては、上記式(2)で示される化合物を溶解することができる溶媒が好ましい。溶媒は、脂肪族又は芳香族の有機溶媒が用いられる。例えば、テトラヒドロフラン又はジエチルエーテル等のエーテル系溶媒；トルエン等の芳香族炭化水素が用いられる。また、芳香族リチウム試薬由来のヘキサンなどの炭化水素が混合してもよい。

本発明の第4態様では、ジアミン化合物存在下、下記式(3b)で示される芳香族亜鉛試薬と、下記式(4a)で示されるマグネシウム化合物とを反応させ、反応混合物を得る工程と、鉄触媒存在下、前記反応混合物と、下記式(2)で示される化合物とを反応させる工程とを含むことを特徴とする、下記式(1)で示される芳香族化合物の製造方法が提供される。



[上記式中、R、X、Z<sup>1</sup>、Z<sup>2</sup>及びAは上記の意味を有する。]

本発明の第4態様では、下記式(2)で示される化合物が用いられる。



上記式中、R、Xについての説明は、本発明の第1態様において説明したのと同様である。

本発明の第4態様において、Rで示される「炭化水素基」、「C<sub>3</sub> ~ C<sub>10</sub> 飽和環基若しくは不飽和環基」、Rが「式-N(B)-で示される基で中断されるC<sub>3</sub> ~ C<sub>10</sub> 飽和環基若しくは不飽和環基」である場合に、Bで示される「C<sub>1</sub> ~ C<sub>10</sub> 炭化水素基」及び「C<sub>1</sub> ~ C<sub>10</sub> アルコキシカルボニル基」には、置換基が導入されていてもよい。この置換基としては、好ましくは、上記式(3b)で示される芳香族亜鉛試薬と、上記式(4a)で示されるマグネシウム化合物とを反応させて得られる有機亜鉛試薬と反応しないものを挙げることができる。例えば、

置換基を有していてもよいC<sub>1</sub> ~ C<sub>10</sub> アルキル基(例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、トリフルオロメチル等)、

C<sub>2</sub> ~ C<sub>10</sub> アルケニル基(例えば、ビニル、アリル、プロペニル、イソプロペニル、2-メチル-1-プロペニル、2-メチルアリル、2-ブテニル等)、

C<sub>2</sub> ~ C<sub>20</sub> アルキニル基(例えば、エチニル、プロピニル、ブチニル等)、

エステル基(-COOB<sup>2</sup>；式中、B<sup>2</sup>はC<sub>1</sub> ~ C<sub>6</sub> 炭化水素基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、n-ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等)である。エステル基の例としては、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、2-メトキシエトキシカルボニル、tert-ブトキシカルボニル、

C<sub>1</sub> ~ C<sub>20</sub> アルキルカルボニル(例、ピパロイルなど)、または、ニトリル基(-CN)

C<sub>2</sub> ~ C<sub>20</sub> アルケニル-C<sub>1</sub> ~ C<sub>20</sub> アルキル-C<sub>1</sub> ~ C<sub>20</sub> アルコキシ(例、1-ビニル-1-メチルエトキシなど)、

C<sub>6</sub> ~ C<sub>20</sub> アリール-C<sub>1</sub> ~ C<sub>20</sub> アルキルオキシカルボニル(例、ベンジルオキシカルボニルなど)、

10

20

30

40

50

$C_1 \sim C_{20}$  アルキル - カルボニルオキシ (例、アセトキシ、プロパノイルオキシ、ピバロイルオキシなど)、

保護された水酸基 ( $-OB^3$  : 式中、 $B^3$  は、アルキル基、アリアルアルキル基、エーテル置換基を有するアリアルアルキル基、エーテル置換基を有するアルキル基、又は  $C_1 \sim C_6$  炭化水素基 (例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等) 等の置換基を有していてもよいシリル基である。保護された水酸基の例としては、メトキシ基、ベンジロキシ基、*p*-メトキシベンジロキシ基、メトキシメチル基、エトキシエチル基、トリメチルシロキシ、ジメチル *t*-ブチルシロキシ、トリエチルシロキシ、*tert*-ブチルジフェニルシロキシ等が挙げられる)、

トリアルキルシリル基 ( $-B^4$  : 式中、 $B^4$  は  $C_1 \sim C_6$  炭化水素基 (例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等) 等の置換基を有していてもよいシリル基である。トリアルキルシリル基の例としては、トリメチルシリル、ジメチル *t*-ブチルシリル、トリエチルシリル、*tert*-ブチルジフェニルシリル等が挙げられる。)

アセタール基 ( $-CB^5(OB^6)(OB^7)$  : 式中、 $B^5$  は、水素原子又は置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_6$  アルキル基、 $B^6$  及び  $B^7$  は、それぞれ互いに独立し、同一または異なって、置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_6$  炭化水素基 (例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等) であり、互いに架橋していてもよい。 $B^6$  及び  $B^7$  の例としては、メチル基、エチル基等が挙げられ、互いに架橋している場合には、エチレン基、トリメチレン基等が挙げられる)、

N-インドリル、

$C_1 \sim C_{10}$  アルコキシ基 (例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等)、

$C_6 \sim C_{10}$  アリアルオキシ基 (例えば、フェニルオキシ、ナフチルオキシ、ピフェニルオキシ等)、

ハロゲン原子 (例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)、

アミド基、又は

アミノ基などを挙げることができる。

以上の置換基は、置換可能な位置に 1 個以上導入されていてもよく、例えば、1 個 ~ 4 個導入されていてもよい。置換基数が 2 個以上である場合、各置換基は同一であっても異なってもよい。

本発明の第 4 態様において、R は、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることが好ましい。

「置換基を有していてもよい第一級アルキル基」としては、好ましくは、3-N-インドリルプロピル、エトキシカルボニルペンチル、オクチル等を挙げることができる。

また、「置換基を有していてもよい第二級アルキル基」としては、好ましくは、*sec*-ブチル、シクロヘキシル、4-*t*-ブチルシクロヘキシル、シクロヘブチル、2-ノルボルニル等を挙げることができる。

また、本発明の第 4 態様において、R が取り得る「第一級アルキル基」、「第二級アルキル基」に導入される置換基としては、特に好ましくは、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、*tert*-ブトキシカルボニル基、シアノ基、アルケニル基、アルキニル基、3-N-インドリル基、アルキルエーテル、シリルエーテル、又はアセタールを挙げることができる。

本発明の第 4 態様において、X は、ハロゲン原子であることが好ましく、ヨウ素又は臭素であることがより好ましい。もっとも、若干収率は落ちるが X を塩素とすることも可能である。

本発明の第 4 態様では、下記式 (3b) で示される芳香族亜鉛試薬が用いられる。



上記式中、A についての説明は、本発明の第 1 態様において説明したのと同様である。

10

20

30

40

50

本発明の第4態様において、Aで示される「 $C_4 \sim C_{20}$ 芳香族基」、「複素芳香族基」には、置換基が導入されていてもよい。この置換基としては、例えば、置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、トリフルオロメチル等）、

$C_2 \sim C_{10}$ アルケニル基（例えば、ビニル、アリル、プロペニル、イソプロペニル、2-メチル-1-プロペニル、2-メチルアリル、2-ブテニル等）、

$C_2 \sim C_{20}$ アルキニル基（例えば、エチニル、プロピニル、ブチニル等）、

エステル基（ $-COOB^2$ ：式中、 $B^2$ は $C_1 \sim C_6$ 炭化水素基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等）である。エステル基の例としては、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、2-メトキシエトキシカルボニル、*tert*-ブトキシカルボニル等が挙げられる）、

ニトリル基（ $-CN$ ）、

$C_1 \sim C_{20}$ アルキルカルボニル（例、ピバロイルなど）、

保護された水酸基（ $-OB^3$ ：式中、 $B^3$ は、アルキル基、アリールアルキル基、エーテル置換基を有するアリールアルキル基、エーテル置換基を有するアルキル基、又は $C_1 \sim C_6$ 炭化水素基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等）等の置換基を有していてもよいシリル基である。保護された水酸基の例としては、メトキシ基、ベンジロキシ基、*p*-メトキシベンジロキシ基、メトキシメチル基、エトキシエチル基、トリメチルシロキシ、ジメチル*t*-ブチルシロキシ、トリエチルシロキシ、*tert*-ブチルジフェニルシロキシ等が挙げられる）、

アセタール基（ $-CB^5(OB^6)(OB^7)$ ：式中、 $B^5$ は、水素原子又は置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_6$ アルキル基、 $B^6$ 及び $B^7$ は、それぞれ互いに独立し、同一または異なって、置換基を有していてもよい $C_1 \sim C_6$ 炭化水素基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、ペンチル、ヘキシル、フェニル等）であり、互いに架橋していてもよい。 $B^6$ 及び $B^7$ の例としては、メチル基、エチル基等が挙げられ、互いに架橋している場合には、エチレン基、トリメチレン基等が挙げられる）、

N-インドリル、

$C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等）、

$C_6 \sim C_{10}$ アリールオキシ基（例えば、フェニルオキシ、ナフチルオキシ、ピフェニルオキシ等）、

ハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素）、又は、

アミノ基などを挙げることができる。この場合、置換基は、置換可能な位置に1個以上導入されていてもよく、例えば、1個～4個導入されていてもよい。置換基数が2個以上である場合、各置換基は同一であっても異なってもよい。

更に、互いに架橋する置換基が、置換可能な2以上の位置に環状に導入されていてもよく、このような置換基としては、例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシ、テトラメチルエチレンジオキシ、プロピレンジオキシ基などを挙げることができる。


本発明の第4態様において、Aは、置換基を有していてもよいフェニル基、ピリジル基等の各種複素芳香族基であることが好ましく、フェニル、2-メチルフェニル、4-メチルフェニル、4-メトキシフェニル、3,4-(メチレンジオキシ)フェニル、3-(エトキシカルボニル)フェニル、4-シアノフェニル、2-ピリジルであることがより好ましい。

上記式(3b)中、 $Y^2$ は、臭素、ヨウ素、又は塩素である。

本発明の第4態様において、上記式(3b)で示される芳香族亜鉛試薬の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、1モル当量以上であり、好ましくは1.1モル当量～2モル当量であり、約1.5モル当量であることが最も好ましい。

本発明の第4態様では、下記式(4a)で示されるマグネシウム化合物が用いられる。





上記式中、 $Z^1$  は、炭素アニオン配位子であり、 $Z^2$  は、臭素、ヨウ素、又は塩素である。

本発明の第4態様において、 $Z^1$  は、置換基Aと同じ芳香族基であるか、トリメチルシリルメチル基であることがより好ましく、 $Z^2$  は、臭素、塩素であることが好ましく、臭素であることがさらに好ましい。

本発明の第4態様では、上記式(3b)で示される芳香族亜鉛試薬を用いるため、置換基Rおよび置換基Aを多様な官能基を有する置換基とすることができる。このような官能基としては、芳香族マグネシウム試薬や芳香族リチウム試薬に不安定なエステル基、シアノ基、アルキルカルボニル基などを挙げるができる。

本発明の第4態様において、上記式(4a)で示されるマグネシウム化合物の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、1モル当量以上であり、好ましくは1.1モル当量~2モル当量であり、約1.5モル当量であることが最も好ましい。

本発明の第4態様では、鉄触媒が用いられる。鉄触媒についての説明は、本発明の第1態様において説明したのと同様である。

本発明の第4態様で用いられる鉄触媒は、ハロゲン化鉄(III)が好ましく、特に、 $FeCl_3$ のような鉄塩(III)が好ましく用いられる。

本発明の第4態様において、鉄触媒の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、0.001モル当量~0.5モル当量であり、好ましくは0.01モル当量~0.1モル当量であり、更に好ましくは0.03モル当量~0.07モル当量である。

本発明の第4態様にかかる芳香族化合物の製造方法においては、ジアミン化合物が用いられる。ジアミン化合物についての説明は、本発明の第1態様において説明したのと同様である。

本発明の第4態様において、ジアミン化合物は、2座配位子であることが好ましく、更に好ましくは、N, N, N', N'-テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)等の置換基を有していてもよいエチレンジアミンを挙げるができる。

本発明の第4態様において、ジアミン化合物の量は、上記式(2)で示される化合物1モルに対し、0.5モル当量~10モル当量であり、好ましくは1モル当量~3モル当量であり、更に好ましくは1モル当量~2モル当量である。

本発明の第4態様において、典型的には、ジアミン化合物存在下、上記式(3b)で示される芳香族亜鉛試薬と上記式(4b)で示されるマグネシウム化合物と上記ジアミン化合物との混合物を調製する。次いで、この溶液に、上記式(2)で示される化合物と上記鉄触媒とを添加して攪拌する。

本発明の第4態様において、反応は、好ましくは0 ~ 100 の温度範囲で行われ、特に好ましくは40 ~ 60 の温度範囲で行われる。圧力は、常圧であることが好ましい。

本発明の第4態様において、溶媒としては、上記式(2)で示される化合物を溶解することができる溶媒が好ましい。溶媒は、脂肪族又は芳香族の有機溶媒が用いられる。例えば、テトラヒドロフラン又はジエチルエーテル等のエーテル系溶媒；トルエン等の芳香族炭化水素が用いられる。

#### 【実施例】

以下、本発明を実施例に基づいて説明する。ただし、本発明は、下記の実施例に制限されるものではない。

空気や湿度に敏感な化合物を扱うすべての反応は、アルゴン又は窒素の陽圧下で、乾燥反応器中で行った。空気及び湿度に敏感な液体及び溶液の移し換えは、注射器又はステンレススチールカニューレを用いて行った。分析薄膜クロマトグラフィーは、蛍光指示薬(254nm)を含浸させた25- $\mu$ m、230-400メッシュのシリカゲルで予め被覆したガラスプレートを用いて行った。薄層クロマトグラフィーは、紫外線(UV)に曝す、及び/又は、p-アニスアルデヒドに浸し、次いで、ホットプレート上で加熱することにより、着色検知をおこなった。有機溶液は、ダイアフラムポンプを接続したロータリー

10

20

30

40

50

エバポレーターを～15トールで操作することにより濃縮した。フラッシュカラムクロマトグラフィーは、関東シリカゲル60（球形、中性、140-325メッシュ）を用いて、Still, W. C.; Klahn, M.; Mitra, A. J. Org. Chem. 1978, 43, 2923-2924に記載されたように行った。

材料：試薬は、東京化成、アルドリッチ及び他の会社から市販のものを購入し、蒸留し又は再結晶して用いた。無水テトラヒドロフラン（THF）は、関東化学から購入し、アルゴン雰囲気下、760トールでベンゾフェノンケチルから蒸留し、直ちに用いた。溶媒中の水分は、カールフィッシャー水分計で20ppm未満であることを確認した。FeCl<sub>3</sub>は、関東化学から購入し、塩化チオニルで脱水し、過剰の塩化チオニルを減圧下で完全に除去し、アルゴン雰囲気下で得られた無水FeCl<sub>3</sub>を保管した。FeCl<sub>3</sub>の0.1M THF溶液は、室温で何日間か保管することによりポリエーテル化合物を形成し触媒活性が低下するため、調製後直ちに使用した。

機器：JEOL AL-400（400MHz）、JEOL ECX-400（400MHz）又はJEOL ECA-500（500MHz）NMR分光計を用いて、プロトン核磁気共鳴（<sup>1</sup>H NMR）及び炭素核磁気共鳴（<sup>13</sup>C NMR）を記録した。水素原子の化学シフトは、テトラメチルシランから低磁場側（downfield）での100万分の1（ppm、スケール）として記録し、NMR溶媒（CDCl<sub>3</sub>：7.26）中の残留プロトンを参照とした。炭素核磁気共鳴スペクトル（<sup>13</sup>C NMR）は、125又は100MHzで記録した。炭素の化学シフトは、テトラメチルシランから低磁場側での100万分の1（ppm、スケール）として記録し、NMR溶媒（CDCl<sub>3</sub>：77.0）中の炭素共鳴を参照した。データは、下記のように示した：化学シフト、多重性（s = 一重線、d = 二重線、t = 三重線、q = 四重線、m = 多重線及び/又は多重共鳴、br = 広帯）、カップリング定数（ヘルツ：Hz）、及び積分。


ガスクロマトグラフィー（GC）分析は、FID検出器及びキャピラリーカラム、HR-1（25m×0.25mm i.d., 0.25µmフィルム）又はCYCLOSIL B（アジレント社（Agilent）, 30m×0.25mm i.d., 0.25µmフィルム）又はCHIRALDEX G-TA（アステック社（ASTEC）, 20m×0.25mm i.d., 0.125µmフィルム）を備えたShimadzu GC-14Bで測定した。赤外線スペクトルは、DuraSample IR（ASIアプライドシステム社（ASI Applied System））を備えたReact IR 1000反応分析システムで記録し、cm<sup>-1</sup>で示した。質量分析は、JEOL GC-mate IIで測定した。

#### [実施例1]

下記の要領に従って、添加剤が生成物の選択性及び収率に与える影響を調べた。

まず、磁気攪拌子を備えた50-mLガラスチューブに、フェニルマグネシウムプロマイドの0.96-M THF溶液（1.25mL, 1.2mmol）、下記表1に示される各種添加剤（1.2mmol）及びプロモシクロヘプタン（下記表1中、「1」で示される）（177mg, 1.0mmol）を-78℃に冷却した。FeCl<sub>3</sub>の0.1-M THF溶液（0.5mL, 5mol%）をこの温度で添加した。得られた溶液を氷水浴に浸し、0℃で30分間攪拌した。NH<sub>4</sub>Clの飽和水溶液（0.5mL）を加えて反応を終了させた。通常の処理を行った後、プロモシクロヘプタンの消費量、生成した化合物（下記表1中、「2」、「3」、「4」で示される）及びピフェニルの収率をガスクロマトグラフィー（内部水準（n-デカン、71mg, 0.5mmol））で決定した。結果を表1に示す。

表1



| 試験例 | 添加剤   | % 収率 |    |    |    |       |
|-----|---|------|----|----|----|-------|
|     |   | 2    | 3  | 4  | 1  | Ph-Ph |
| 1   | 無し  | 5    | 79 | 0  | 4  | 6     |
| 2   | $\text{Et}_3\text{N}$ (1.2 当量)                                      | 3    | 78 | 0  | 11 | 5     |
| 3   | <i>N</i> -メチルモルホリン (1.2 当量)   | 8    | 72 | 0  | 4  | 5     |
| 4   | DABCO (1.2 当量)  | 20   | 2  | 0  | 75 | 3     |
| 5   | TMEDA (1.2 当量)  | 71   | 19 | 3  | 微量 | 10    |
| 6   | $\text{Et}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NEt}_2$ (1.2 当量) | 23   | 48 | 1  | 11 | 9     |
| 7   | NMP (1.2 当量)  | 15   | 3  | 微量 | 79 | 4     |
| 8   | $\text{PPh}_3$ (0.1 当量)   | 6    | 70 | 微量 | 6  | 7     |
| 9   | dppe (0.05 当量)  | 4    | 8  | 0  | 81 | 8     |

10

20

表1中、「DABCO」とは、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタンの略であり、「NMP」とは、1-メチル-2-ピロリジノンの略であり、「dppe」とは、1,2-ビスジフェニルホスフィノエタンの略である。

表1から、*N,N,N',N'*-テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)を添加剤として用いたときに、アルキル化芳香族化合物を最も効率よく製造できることがわかる。

30

#### [実施例2]



















次に、触媒前駆体としての各種鉄化合物の選別を行った。

具体的には、実施例1と同様の操作を行った。ただし、鉄触媒としては、下記表2に示される各種鉄触媒を用い、添加剤としては、TMEDAを用いた。結果を表2に示す。

表2



表 3

| 試験例             | ハロゲン化アルキル   | ArMgBr   | 生成物   | % 収率                                |
|-----------------|---|--|---|-------------------------------------|
| 15              |                  | Ar = Ph  |                  | 96 (90%) <sup>e,f</sup>             |
| 16              |                  | Ar = Ph  |                  | 99 (X = I)                          |
| 17              |   |  |   | 99 (X = Br) <sup>e</sup>            |
| 18              |   |  |   | 99 (X = Cl) <sup>g</sup>            |
| 19              |                  | Ar = 4-MeOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub>              |                  | 99 <sup>e</sup>                     |
| 20              |   | Ar = 4-MeC <sub>6</sub> H <sub>4</sub>               |   | 98 (96) <sup>e</sup>                |
| 21              |   | Ar = 4-CF <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> |   | 67 <sup>e,h</sup>                   |
| 22 <sup>i</sup> |   | Ar = 2-ナフチル  |   | 96                                  |
| 23 <sup>i</sup> |   | Ar = 1-ナフチル  |   | 97 <sup>i</sup>                     |
| 24              |   | Ar = 2-MeC <sub>6</sub> H <sub>4</sub>               |   | 99 (98) <sup>e</sup>                |
| 25              |                  | Ar = Ph  |                  | 95 (X = I)                          |
| 26              |   |  |   | 94 (X = Br)                         |
| 27              |   |  |   | 84 (X = Cl) <sup>g,h</sup>          |
| 28              | <i>n</i> -C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> -X   | Ar = Ph  | <i>n</i> -C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> -Ph  | 97 (X = I)                          |
| 29              |   |  |   | 91 (X = Br)                         |
| 30              |   |  |   | 45 (X = Cl) <sup>g,k</sup>          |
| 31              |                | Ar = 4-MeOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub>              |                | 91<br>(エキソ:エンド = 95:5)              |
| 32 <sup>j</sup> | <i>t</i> -Bu-  | Ar = 4-MeOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub>              | <i>t</i> -Bu-  | 96 <sup>e</sup><br>(トランス:シス = 96:4) |
| 33 <sup>j</sup> | <i>t</i> -Bu-  | Ar = 4-MeOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub>              | <i>t</i> -Bu-  | 98<br>(トランス:シス = 96:4)              |
| 34              |                | Ar = 4-MeOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub>              |                | 88 <sup>e</sup>                     |
| 35              |                | Ar = 4-MeOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub>              |                | 87 <sup>e</sup>                     |

<sup>e</sup> 単離収率<sup>f</sup> より大きな 50 - mmol スケールでの実験<sup>g</sup> グリニヤール試薬を 1.5 当量用いた。<sup>h</sup> グリニヤール試薬を 2.0 当量用いた。<sup>i</sup> グリニヤール試薬を、プロモクロロヘキサン、FeCl<sub>3</sub> 及び TMEDA の混合物に添加した。<sup>j</sup> グリニヤール試薬を 1.8 当量用いた。<sup>k</sup> 反応温度を 40 とした。<sup>l</sup> 0.5 - mmol スケール

下記に、表 3 中のいくつかの試験例の調製法、測定法等を具体的に示す。

試験例 15

10

20

30

40

50

シクロヘプチルベンゼン (50 - mmol スケールの場合)

ブロモシクロヘプタン (8.85 g, 50 mmol)、FeCl<sub>3</sub> (0.1 - M THF 溶液を 25 mL、5 mol%) の混合物に、PhMgBr (0.93 - M THF 溶液を 72 mL、67 mmol) 及び TMEDA (7.78 g, 67 mmol) の混合物を 0 にて、反応混合物を淡黄色溶液に保つような速度で (本試験例の場合は、1.36 mL / 分)、注射ポンプを經由して添加した。PhMgBr / TMEDA の添加が終了した後、反応混合物をこの温度で 10 分間攪拌した。飽和塩化アンモニウム水による通常処理をして、生成混合物を蒸留して、シクロヘプチルベンゼンを無色油として得た (8.18 g。ただし、ピフェニル 0.37 g を含む、単離収率 90%)。

フーリエ変換赤外分光 (FTIR) (液膜法): cm<sup>-1</sup> 3062, 3027, 2923 (s), 2854 (s), 1602, 1492, 1461, 1451, 1073, 1032, 753 (m), 737 (m), 698 (m);

<sup>1</sup>H NMR (500 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 7.28-7.24 (m, 2H), 7.19-7.12 (m, 3H), 2.68-2.63 (m, 1H), 1.93-1.90 (m, 2H), 1.81-1.78 (m, 2H), 1.67-1.51 (m, 8H); <sup>13</sup>C NMR (125 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 150.0, 128.2 (2C), 126.6 (2C), 125.5, 47.1, 36.8 (2C), 27.9 (2C), 27.2 (2C); 高分解能質量分析 (HRMS) (EI, 70 eV) m/z [M]<sup>+</sup> 計算値 C<sub>13</sub>H<sub>18</sub>, 174.1409; 実測値 174.1418。

#### 試験例 17

シクロヘキシルベンゼン (1 - mmol スケールの場合)

ブロモシクロヘキサン (163.1 mg, 1.0 mmol)、FeCl<sub>3</sub> (0.1 - M THF 溶液を 0.5 mL、5 mol%) の混合物に、フェニルマグネシウムブロマイド (0.96 - M THF 溶液を 1.25 mL、1.2 mmol) 及び TMEDA (181.1 μL, 1.2 mmol) の混合物を、20 分間かけて、0 にて、注射ポンプを經由して添加した。グリニャール試薬と TMEDA の混合物の添加が終了した後、反応混合物をその温度で 10 分間攪拌した。飽和塩化アンモニウム水による通常処理をして、反応混合物をフロリジル (Florisil: 登録商標) のパッドを通して濾過し、真空下で濃縮させた。内部標準 (テトラクロロエタン、79 mg, 0.47 mmol) との比較のうえで示された粗生成物の <sup>1</sup>H NMR 分析によると、シクロヘキシルベンゼンは 99% の収率で得られた。GC 分析によると、シクロヘキシルベンゼンは 99% の収率で得られた。

#### 試験例 19

1 - シクロヘキシル - 4 - メトキシベンゼン

表題化合物を、内部標準 (テトラクロロエタン、79 mg, 0.47 mmol) との比較のうえで示された <sup>1</sup>H NMR 分析にて収率 99% で得た。シリカゲルクロマトグラフィーを用いた精製により、淡黄色固体 (190 mg, 99% 収率) の表題化合物を得た。

FTIR (液膜法):  $\text{cm}^{-1}$  3010 (w), 2919 (s), 2850 (m), 1513 (s), 1449 (m), 1248 (s), 1177 (s), 1032 (s), 814 (s);

$^1\text{H}$  NMR (500 MHz;  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.12 (d,  $J = 8.5$  Hz, 2H), 6.83 (d,  $J = 8.5$  Hz, 2H), 3.78 (s, 3H), 2.50-2.38 (m, 1H), 1.92-1.79 (m, 4H), 1.78-1.65 (m, 1H), 1.45-1.30 (m, 4H), 1.28-1.15 (m, 1H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ): 157.6, 140.3, 127.6 (2C), 113.6 (2C), 55.2, 43.6, 34.7 (2C), 26.9 (2C), 26.1; 高分解能質量分析 (EI, 70 eV)  $m/z$   $[\text{M}]^+$  計算値  $\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_1$ , 190.1358; 実測値 190.1381; 元素分析 計算値  $\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}$ : C, 82.06; H, 9.53. 実測値 C, 81.80; H, 9.80.

10

すべての分析データは、文献 (Singh et al, Tetrahedron 2001, 57, 241-247) で報告されているものと良い一致を示した。

#### 試験例 20

##### 1 - シクロヘキシル - 4 - メチルベンゼン

表題化合物を、内部標準 (テトラクロロエタン、79 mg、0.47 mmol) との比較のうえで示された  $^1\text{H}$  NMR 分析にて収率 98% で得た。シリカゲルクロマトグラフィーを用いた精製により、無色油 (167 mg, 96% 収率) の表題化合物を得た。

20

FTIR (液膜法):  $\text{cm}^{-1}$  3020 (w), 2923 (s), 2852 (m), 1515 (m), 1447 (m), 809 (s);

$^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.10 (s, 4H), 2.50-2.40 (m, 1H), 2.30 (s, 3H), 1.90-1.79 (m, 4H), 1.78-1.67 (m, 1H), 1.45-1.32 (m, 4H), 1.29-1.17 (m, 1H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  146.0, 136.0, 129.7 (2C), 127.4 (2C), 44.4, 34.8 (2C), 27.1 (2C), 26.3, 21.1; 高分解能質量分析 (EI, 70 eV)  $m/z$   $[\text{M}]^+$  計算値  $\text{C}_{13}\text{H}_{18}$ , 147.1409; 実測値 147.1388; 元素分析 計算値  $\text{C}_{13}\text{H}_{18}$ : C, 89.59; H, 10.41. 実測値 C, 89.34; H, 10.64.

30

すべての分析データは、文献 (Yonehara et al, F.; Kido, Y.; Sugimoto, H.; Morita, S.; Yamaguchi, M. J. Org. Chem. 2001, 68, 241-247.) で報告されているものと良い一致を示した。

#### 試験例 21

##### 1 - シクロヘキシル - 4 - トリフルオロメチルベンゼン

表題化合物を、内部標準 (テトラクロロエタン、79 mg、0.47 mmol) との比較のうえで示された  $^1\text{H}$  NMR 分析にて収率 70% で得た。シリカゲルクロマトグラフィーを用いた精製により、無色油 (153 mg, 67% 収率) の表題化合物を得た。

40

FTIR (液膜法):  $\text{cm}^{-1}$  2927 (m), 2856, 1619, 1451, 1420, 1324 (s), 1162, 1119 (s), 1069 (s), 1017, 830 (s), 656;

$^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.53 (d,  $J = 8.0$  Hz, 2H), 7.31 (d,  $J = 8.0$  Hz, 2H), 2.61–2.51 (m, 1H), 1.94–1.74 (m, 5H), 1.48–1.34 (m, 4H), 1.33–1.19 (m, 1H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  152.1, 128.2 (q,  $J = 32.4$  Hz), 127.2 (2C), 124.5 (q,  $J = 270.8$  Hz), 125.2 (q,  $J = 3.8$  Hz, 2C), 44.5, 34.2 (2C), 26.7 (2C), 26.0; 高分解能質量分析(EI, 70 eV)  $m/z$   $[\text{M}]^+$

10

計算値  $\text{C}_{13}\text{H}_{15}\text{F}_3$ : 228.1126; 実測値 228.1144; 元素分析 計算値  $\text{C}_{13}\text{H}_{15}\text{F}_3$ : C, 68.41; H, 6.62. 実測値 C, 68.49; H, 6.83.

#### 試験例 2 2

##### 2 - シクロヘキシルナフタレン

プロモシクロヘキサン (163.1 mg, 1.0 mmol)、 $\text{FeCl}_3$  (0.1 M - THF 溶液 0.5 mL, 5 mol%) 及び TMEDA (181.1  $\mu\text{L}$ , 1.2 mmol) の混合物に、2 - ナフチルマグネシウムブロマイド (0.82 M - THF 溶液 1.46 mL, 1.2 mmol) を注射ポンプを経由して、25 で 20 分間かけて添加した。グリニヤール試薬の混合物の添加が終了した後、反応混合物をこの温度で 10 分間攪拌した。飽和塩化アンモニウム水による通常の処理をして、反応混合物をフロリジル (Florisil: 登録商標) のパッドを通して濾過し、真空下で濃縮させた。内部標準 (テトラクロロエタン、79 mg, 0.47 mmol) を用い、粗生成物の  $^1\text{H}$  NMR 分析を行なったところ、2 - シクロヘキシルナフタレンが 96% 収率で得られた。

20

#### 試験例 2 3

##### 1 - シクロヘキシルナフタレン

内部標準 (テトラクロロエタン、79 mg, 0.47 mmol) を用いた  $^1\text{H}$  NMR 分析から表題化合物を収率 97% で得た。

30

$^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  8.11 (br d,  $J = 8.3$  Hz, 1H), 7.84–7.81 (m, 1H), 7.67 (br d,  $J = 8.3$  Hz, 1H), 7.50–7.36 (m, 4H), 3.35–3.27 (m, 1H), 2.06–1.98 (m, 2H), 1.95–1.86 (m, 2H), 1.86–1.80 (m, 1H), 1.58–1.50 (m, 4H), 1.38–1.27 (m, 1H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  143.7, 133.9, 131.3, 128.9, 126.2, 125.6, 125.5, 125.2, 123.2, 122.2, 39.2, 34.15 (2C), 27.2 (2C), 26.5; 高分解能質量分析(EI, 70 eV)  $m/z$   $[\text{M}]^+$  計算値  $\text{C}_{16}\text{H}_{18}$ , 210.1409; 実測値 210.1433.

40

#### 試験例 2 4

##### 1 - シクロヘキシル - 2 - メチルベンゼン

表題化合物を、内部標準 (テトラクロロエタン、79 mg, 0.47 mmol) との比較のうえで示された  $^1\text{H}$  NMR 分析にて収率 98% で得た。シリカゲルクロマトグラフィーを用いた精製により、無色油 (171 mg, 98% 収率) の表題化合物を得た。



FTIR (液膜法):  $\text{cm}^{-1}$  3064, 3022, 2925 (s), 2852 (m), 1492, 1448 (m), 741 (s), 723 (s);

$^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.22-7.05 (m, 4H), 2.75-2.63 (m, 1H), 2.33 (s, 3H), 1.91-1.73 (m, 5H), 1.47-1.34 (m, 4H), 1.33-1.23 (m, 1H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  145.9, 135.1, 130.1, 126.1, 125.4, 125.3, 40.0, 33.6 (2C), 27.1 (2C), 26.3, 19.3; 高分解能質量分析 (EI, 70 eV)  $m/z$   $[\text{M}]^+$  計算値  $\text{C}_{13}\text{H}_{18}$ , 147.1409; 実測値 147.1427. 元素分析 計算値  $\text{C}_{13}\text{H}_{18}$ : C, 89.59; H, 10.41. 実測値 C, 89.56; H, 10.69.

すべての分析データは、文献で報告されているものと良い一致を示した。

#### 試験例 3 1

1 - (エキソ - 2 - ノルボルニル) - 4 - メトキシベンゼン

表題化合物を、内部標準 (テトラクロロエタン、79 mg、0.47 mmol) との比較のうえで示された  $^1\text{H}$  NMR 分析にて収率 91% で得た。キャピラリー GC 分析 (CHIRALDEX G-TA, アステック社製, 20 m  $\times$  0.25 mm, 0.125  $\mu\text{m}$  フィルム、140) で測定した生成物のジアステレオマー組成は、95:5 であった (主生成物のエキソ異性体及びエンド異性体に相当するピークが保持時間 27.9 分及び 30.4 分にそれぞれ観測された)。

化合物の分析データは、文献 (Wu, X. - Y.; Xu, H. - D.; Tang, F. - Y.; Zhou, Q. - L. *Tetrahedron Asymmetry* 2001, 12, 2565 - 2567) で報告されているものと良い一致を示した。

#### 試験例 3 2

1 - (4 - tert - ブチルシクロヘキシル) - 4 - メトキシベンゼン

表題化合物を白色固体として得た (118.6 mg、96% 単離収率)。キャピラリー GC 分析 (CHIRALDEX G-TA, アステック社製, 20 m  $\times$  0.25 mm, 0.125  $\mu\text{m}$  フィルム、150) で、トランス体とシス体の比率は 96:4 であった (保持時間; それぞれ、67.4 分及び 56.2 分)。

FTIR (液膜法):  $\text{cm}^{-1}$  2925 (s), 2854 (s), 1611, 1582, 1513 (s), 1486, 1465, 1451, 1393, 1366, 1248 (s), 1181 (m), 1038 (s), 1034 (s), 824 (m), 801 (m);

$^1\text{H}$  NMR (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.12 (d,  $J = 8.8$  Hz, 2H), 6.83 (d,  $J = 8.8$  Hz, 2H), 3.78 (s, 3H), 2.42-2.35 (m, 1H), 1.93-1.86 (m, 4H), 1.43-1.35 (m, 2H), 1.18-1.03 (m, 3H), 0.83 (s, 9H);  $^{13}\text{C}$  NMR (100 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  157.7, 140.1, 127.7 (2C), 113.7 (2C), 55.2, 47.7, 35.02, 34.4 (2C), 32.6, 27.7 (2C), 27.6 (3C); 高分解能質量分析 (EI, 70 eV)  $m/z$   $[\text{M}]^+$  計算値  $\text{C}_{17}\text{H}_{26}\text{O}$ , 246.1984; 実測値 246.1985.

#### 試験例 3 4

エチル 6 - (4 - メトキシフェニル) ヘキサノエート

表題化合物を、内部標準 (テトラクロロエタン、99 mg, 0.57 mmol) との比較のうえで示された  $^1\text{H}$  NMR 分析にて収率 91% で得た。シリカゲルクロマトグラフ

イーを用いた精製により、無色液体 (220 mg, 88% 収率) の表題化合物を得た。

化合物の分析データは、文献 (Lee, J.-Y.; Fu, G.C. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 5616-5617) で報告されているものと良い一致を示した。

#### 試験例 35

N-[3-(4-メトキシフェニル)プロピル]インドール

表題化合物を、内部標準 (テトラクロロエタン、99 mg, 0.57 mmol) との比較のうえで示された <sup>1</sup>H NMR 分析にて収率 93% で得た。シリカゲルクロマトグラフィーを用いた精製により、無色油 (231 mg, 87% 収率) の表題化合物を得た。

<sup>1</sup>H NMR (500 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 7.63 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.28 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.19 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.12-7.06 (m, 4H), 6.83 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 6.49 (d, J = 3.5 Hz, 1H), 4.10 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 3.79 (s, 3H), 2.57 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.15 (distorted tt, J = 7.5, 7.0 Hz, 2H);  
<sup>13</sup>C NMR (125 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 157.9, 135.9, 132.9, 129.3, 128.5, 127.8, 127.7, 121.3, 120.9, 119.1, 114.1, 113.8, 109.3, 100.96, 55.2, 45.5, 32.0, 31.6; 高分解能質量分析 (EI, 70 eV) m/z [M]<sup>+</sup> 計算値 C<sub>18</sub>H<sub>19</sub>N<sub>1</sub>O<sub>1</sub> 265.1467; 実測値 265.1478.

#### [ 実施例 4 ]

光学活性な (S)-2-プロモオクタンからの 2-オクチルベンゼンの調製

試験例 15 と同様の操作をした。ただし、プロモシクロヘプタンの代わりに、(S)-2-プロモオクタンを用いた。表題化合物をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製して無色油として得た (84.0 mg, 88% 収率)。キャピラリー GC 分析 (CYCLO SILB、アジレント社製, 30 m × 0.25 mm i.d., 0.25 μm フィルム、80 で 120 分、及びオープン温度の昇温速度は 1 / 分) によれば、化合物のエナンチオマー (鏡像体) 過剰率は、0% ee であった。保持時間が 125.2 及び 129:1 でのピークは、光学異性体にそれぞれ相当し、50:50 の比率で観測された。

以下の要領で実施例 5 ~ 実施例 8 までを実施した。

材料: 無水テトラヒドロフラン (THF) は、関東化学から購入し、アルゴン雰囲気下、760 トールでベンゾフェノンケチルから蒸留し、直ちに用いた。溶媒中の水分は、カルフィッシャー水分計で 20 ppm 未満であることを確認した。FeCl<sub>3</sub> は、関東化学から購入し、塩化チオニルで脱水し、減圧下で完全に乾燥させ、アルゴン雰囲気下で得られた無水 FeCl<sub>3</sub> を保管した。FeCl<sub>3</sub> の 0.1 M THF 溶液は、室温で何日間か保管することによりポリエーテル化合物を形成するため、調製後直ちに使用した。ZnCl<sub>2</sub> はアルドリッチ (無水、ビーズ、99.99%) から購入し、減圧下で加熱して乾燥し、直ちに用いた。

以下の試薬は、文献の記載に従って調製した。

ZnCl<sub>2</sub> · TMEDA: Isobe, M.; Kondo, S.; Nagasawa, N.; Goto, T. Chem. Lett. 1977, 679-682

3-クロロ-コレスタン: Shoppee, C.W. J. Chem. Soc. 1946, 1138

1-(トリメチルシリル)-5-ヨード-ペンタ-1-イン: Koft, E.R.; Smith III, A.B. J. Org. Chem. 1984, 49, 832-836

エチル 6-ヨードヘキサノエート: Leonard, N.J.; Goode, W.E. J. Am. Chem. Soc. 1954, 72, 5404-5407

4-ヨードブチロニトリル: Newman, M.S.; Closson; R.D. J.

10

20

30

40

50

Am. Chem. Soc. 1944, 66, 1553-1555

メチル 2, 3, 4 - トリ - O - アセチル - デオキシ - 6 - ヨード - D - グルコピラノシド: Classon, B.; Liu, Z. J. Org. Chem. 1988, 53, 6126-6130

2 - ヨードエタナール ブチル 1, 1 - ジメチル - 2 - プロペニル アセタール: Fujioaka, T.; Nakamura, T.; Yorimistu, H.; Oshima, K. Org. Lett. 2002, 4, 2257-2259

下記の試薬は、市販のものを購入し、蒸留又は再結晶して用いた:

TMEDA (アクロス (Across)), プロモシクロヘプタン (アクロス)、ヨードシクロヘキサン (東京化成工業 (TCI)), プロモシクロヘキサン (関東化学)、クロシクロヘキサン (東京化成工業)、エチル 6 - プロモヘキサノエート (アルドリッチ)、5 - プロモペンチル アセテート (アルドリッチ)、ヨードデカン (東京化成工業)、4 - プロモ - N - (ベンジルオキシカルボニル) - ピペリジン (アルドリッチ)。


下記の試薬は、滴定後、精製することなく用いた:

4 - シアノフェニル亜鉛ブロマイド (0.5 M の THF 溶液、アルドリッチ)、3 - (エトキシカルボニル) フェニル亜鉛ヨーダイド (0.5 M THF 溶液、アルドリッチ)、2 - ピリジル亜鉛ブロマイド (0.5 M THF 溶液、アルドリッチ)、トリメチルシリルメチルマグネシウムクロライド (1.0 M Et<sub>2</sub>O 溶液、アルドリッチ)。

機器: JEOL ECA-500 (500 MHz) NMR 分光計を用いて、プロトン核磁気共鳴 (<sup>1</sup>H NMR) 及び炭素核磁気共鳴 (<sup>13</sup>C NMR) を記録した。水素原子の化学シフトは、テトラメチルシランから低磁場側 (downfield) での 100 万分の 1 (ppm、スケール) として記録し、NMR 溶媒 (CDCl<sub>3</sub>: 7.26) 中の残留プロトンを参照した。炭素核磁気共鳴スペクトル (<sup>13</sup>C NMR) は、125 又は 100 MHz で記録した。炭素の化学シフトは、テトラメチルシランから低磁場側での 100 万分の 1 (ppm、スケール) として記録し、NMR 溶媒 (CDCl<sub>3</sub>: 77.0) 中の炭素共鳴を参照した。データは、下記のように示した: 化学シフト、多重性 (s = 一重線、d = 二重線、t = 三重線、q = 四重線、m = 多重線及び / 又は多重共鳴、br = 広帯)、カップリング定数 (ヘルツ: Hz)、及び積分。

ガスクロマトグラフィー (GC) 分析は、FID 検出器及びキャピラリーカラム、HR-1 (25 m x 0.25 mm i.d., 0.25 µm フィルム) を備えた Shimadzu GC-14B で測定した。赤外線スペクトルは、DuraSample IR (ASI アプライドシステム社 (ASI Applied System)) を備えた React IR 1000 反応分析システムで記録し、cm<sup>-1</sup> で示した。質量分析は、JEOL GC-mate II で測定した。

参考例 1 (3 - プロモシクロヘキシル ピバロエート及び 4 - プロモシクロヘキシル ピバロエート)



3 - 及び 4 - プロモシクロヘキサノールの混合物 (3.6 g, 20 mmol) (還流条件下で、1, 4 - シクロヘキサジオールを臭化水素酸 (水中、48 重量%) で処理し、通常の処理を行い、3 - 及び 4 - プロモシクロヘキサノールの混合物を得る) をピリジン (50 mL) 中で、塩化ピバロイル (3.7 mL, 30 mmol) によって処理し、室温で 4 時間攪拌した。減圧下で蒸発させた後、粗混合物をシリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン / 酢酸エチル = 20 / 1) で精製し、3 - プロモシクロヘキシル ピバロエート (トランス / シス = 33 / 67, 0.63 g, 12%) 及びトランス - 4 - プロモシクロヘキシル ピバロエート (0.79 g, 15%) を無色油状物質として得る。

10

20

30

40

3-プロモシクロヘキシル ピバロエート: FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  2956 (m), 2867 (m), 1725 (s), 1480 (w), 1451 (w), 1397 (w), 1366 (w), 1281 (m), 1214 (w), 1152 (s), 1102 (w), 1032 (m), 1011 (w), 951 (w), 888 (w), 772 (w), 702 (w);

$^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ) トランス異性体:  $\delta$  5.11-5.06 (m, 1H), 4.41-3.32 (m, 1H), 2.32-2.22 (m, 1H), 2.22-2.13 (m, 1H), 2.12-2.04 (m, 1H), 1.90-1.62 (m, 3H), 1.40-1.25 (m, 2H), 1.20 (s, 9H), シス異性体:  $\delta$  4.68-4.60 (m, 1H), 4.00-3.92 (m, 1H), 2.61-2.54 (m, 1H), 2.30-2.22 (m, 1H), 2.00-1.94 (m, 1H), 1.90-1.62 (m, 3H), 1.40-1.25 (m, 2H), 1.18 (s, 9H);

10

$^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ) トランス異性体:  $\delta$  177.5, 70.1, 48.5, 41.0, 38.8, 36.5, 29.3, 27.1 (3C), 21.3, シス異性体:  $\delta$  177.7, 70.8, 46.5, 42.9, 38.6, 36.9, 30.2, 27.0 (3C), 23.4; 元素分析 計算値  $\text{C}_{11}\text{H}_{19}\text{BrO}_2$ : C, 50.20; H, 7.28. 実測値: C, 50.00; H, 7.28

トランス-4-プロモシクロヘキシル ピバロエート: FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  2958 (m), 2871 (m), 1723 (s), 1480 (w), 1445 (w), 1397 (w), 1368 (w), 1281 (m), 1245 (m), 1152 (s), 1098 (w), 1032 (m), 990 (w), 934 (w), 888 (w); 864 (w), 772 (w), 722 (w), 697 (w), 645 (w);  $^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  4.90-4.83 (m, 1H), 4.31-4.24 (m, 1H), 2.15-2.00 (m, 4H), 1.97-1.87 (m, 2H), 1.73-1.65 (m, 2H), 1.22 (s, 9H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  177.8, 68.7, 51.1, 38.8, 32.9 (2C), 28.9 (2C), 27.1 (3C). 元素分析 計算値  $\text{C}_{11}\text{H}_{19}\text{BrO}_2$ : C, 50.20; H, 7.28. 実測値: C, 49.96; H, 7.32.

20

30


#### [ 実施例 5 ]

試験例 5 - 1 ~ 試験例 5 - 8

下記の要領に従って、各種金属試薬が生成物の選択性及び収率に与える影響を調べた。

まず、特に断らない限り、 $\text{FeCl}_3$  (5 mol%) の THF 溶液を、プロモシクロヘプタン (1.0 mmol)、有機亜鉛試薬 (1.5 当量) 及び TME DA (1.5 当量) の混合物の THF 溶液に加えることで反応を進行させた。

表 4



| 試験例              | 有機金属試薬  | 収率(%) <sup>b</sup> |    |    |     |
|------------------|---|--------------------|----|----|-----|
|                  |   | 2                  | 3  | 4  | 1   |
| 5-1 <sup>c</sup> | PhMgBr  | 96                 | 3  | 微量 | 0   |
| 5-2              | ZnCl <sub>2</sub> + 2PhMgBr   | 96                 | 3  | 微量 | 0   |
| 5-3              | ZnCl <sub>2</sub> + PhMgBr  | 0                  | 微量 | 微量 | >95 |
| 5-4              | PhZnBr (Mg free)  | 0                  | 微量 | 微量 | >95 |
| 5-5 <sup>d</sup> | ZnCl <sub>2</sub> + PhLi  | 0                  | 微量 | 微量 | >95 |
| 5-6 <sup>d</sup> | ZnCl <sub>2</sub> + 2PhLi   | 0                  | 微量 | 微量 | >95 |
| 5-7 <sup>e</sup> | ZnCl <sub>2</sub> + PhMgBr + Me <sub>3</sub> SiCH <sub>2</sub> MgCl | 95                 | 4  | 微量 | 0   |
| 5-8 <sup>f</sup> | ZnCl <sub>2</sub> + PhLi + Me <sub>3</sub> SiCH <sub>2</sub> MgCl   | 92                 | 7  | 0  | 0   |

表中b: 収率は、内部標準(デカン)で修正したGC収率である。

表中c: 反応は、フェニルマグネシウムブロマイドとTMEDAのTHF溶液を、FeCl<sub>3</sub> (5 mol%)とブロモシクロヘキサンの混合物のTHF溶液に0°Cにてゆっくりと加えることにより行った。

表中d: THF/Bu<sub>2</sub>O (2/1)の溶媒

表中e: THF/Et<sub>2</sub>O/Bu<sub>2</sub>O (2/2/1)の溶媒

表中f: THF/ペンタン/Bu<sub>2</sub>O (2/2/1)の溶媒

#### [ 実施例 6 ]

##### 試験例 6 - 1 ~ 試験例 6 - 1 1

下記の要領に従って、各種金属試薬およびハロゲン化物が生成物の収率に与える影響を調べた。

乾燥した反応容器に、ZnCl<sub>2</sub> · TMEDA (1.5 mmol) と、芳香族マグネシウム試薬 ArMgBr (0.8 - 1.0 M の THF 溶液, 3.0 mmol) の混合物を 0.5 - 1 時間攪拌し、下記表 5 で示される有機亜鉛試薬を得た。得られた懸濁液に、下記表 5 で示されるハロゲン化物 (表 5 中、「(FG) R<sub>alkyl</sub>-X」で示す) (1.0 mmol)、及び、次いで FeCl<sub>3</sub> (0.1 M の THF 溶液, 0.5 mL, 0.05 mmol) を 0 にて加えた。反応混合物を 50 で 0.5 時間攪拌した。MH<sub>4</sub>Cl 飽和水溶液で反応を終了させ、混合物をフロリジル (Florisil: 登録商標) のパッドを通して濾過し、真空下で濃縮させた。残渣をシリカゲルクロマトグラフィーで精製した。その他の条件は下記のとおりである。

##### 試験例 6 - 1 ~ 試験例 6 - 3 (フェニルシクロヘキサン)

##### 試験例 6 - 1

ハロゲン化物: ヨードシクロヘキサン (1.0 mmol)

有機亜鉛試薬: ジフェニル亜鉛 (1.5 mmol)

反応時間: 0.5 時間

無色油状物質 (157 mg, 98%)。

## 試験例 6 - 2

ハロゲン化物：プロモシクロヘキサン ( 1 . 0 m m o l )

有機亜鉛試薬：ジフェニル亜鉛 ( 1 . 5 m m o l )

反応時間：0 . 5 時間

無色油状物質 ( 1 5 5 m g , 9 7 % ) 。

## 試験例 6 - 3

ハロゲン化物：クロロシクロヘキサン ( 1 . 0 m m o l )

有機亜鉛試薬：ジフェニル亜鉛 ( 1 . 5 m m o l )

反応時間：3 時間

無色油状物質 ( 1 4 1 m g , 8 8 % )

表題化合物の分析データは、N a k a m u r a , M . ; M a t s u o , K . ; I t o , S . ; N a k a m u r a , E . J . A m . C h e m . S o c . 2 0 0 4 , 1 2 6 , 3 6 8 6 - 3 6 8 7 に報告されている。

## 試験例 6 - 4 ( 3 - フェニル - コレスタン )

ハロゲン化物：3 - クロロコレスタン ( 1 . 0 m m o l )

有機亜鉛試薬：ジフェニル亜鉛 ( 1 . 5 m m o l )

反応時間：1 2 時間

白色固体 ( / = 1 4 / 8 6 , 3 9 9 m g , 8 9 % ) ;

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  3025 (w), 2925 (s), 2867 (m), 1466 (m), 1447 (m), 1382 (w), 758

(w), 681 (s);  $^1\text{H NMR}$  (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.39-7.13 (m, 5H), 3.11-3.05 (m, 0.14H),

2.59-2.49 (m, 0.86H), 2.09-0.64 (m, 46H);  $^{13}\text{C NMR}$  (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ )  $\beta$ -異性体 (主成

分):  $\delta$  147.7, 128.2 (2C), 126.8 (2C), 125.6, 56.6, 56.3, 54.6, 47.0, 44.9, 42.6,

40.1, 39.5, 38.9, 36.6, 36.2, 35.9, 35.7, 35.6, 32.2, 29.9, 28.9, 28.3, 28.0, 24.2,

23.9, 22.9, 22.6, 21.0, 18.7, 12.5, 12.1; 元素分析 計算値  $\text{C}_{33}\text{H}_{52}$ : C, 88.32; H, 11.68.

実測値: C, 88.12; H, 11.73

## 試験例 6 - 5 ( 5 - フェニル - 1 - (トリメチルシリル) - ペンタ - 1 - イン )

ハロゲン化物：5 - ヨード - 1 - (トリメチルシリル) - ペンタ - 1 - イン ( 1 . 0 m m o l )

有機亜鉛試薬：ジフェニル亜鉛 ( 1 . 5 m m o l )

反応時間：0 . 5 時間

無色油状物質 ( 2 0 1 m g , 9 3 % ) ;

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  2958 (w), 2902 (w), 2175 (w), 1478 (w), 1451 (s), 1395 (w), 1366

(s), 1268 (w), 1167 (w), 997 (s);  $^1\text{H NMR}$  (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.31-7.25 (m, 3H),

7.21-7.17 (m, 2H), 2.72 (t,  $J = 7.6$  Hz, 2H), 2.24 (t,  $J = 7.1$  Hz, 2H), 1.84 (tt,

$J = 7.6, 7.1$  Hz, 2H), 0.16 (s, 9H);  $^{13}\text{C NMR}$  (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  141.3, 128.2 (2C),

128.0 (2C), 125.5, 106.8, 87.4, 34.5, 30.0, 19.1, 0.0 (3C); HRMS (EI, 70 eV)  $m/z$

$[\text{M}]^+$  計算値  $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{Si}$ , 216.1334; 実測値, 216.1305. 元素分析 計算値  $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{Si}$ : C, 77.71;

H, 9.32. 実測値: C, 77.53; H, 9.13.

## 試験例 6 - 6 ~ 試験例 6 - 7 ( エチル 6 - フェニルヘキサノエート )

## 試験例 6 - 6

10

20

30

40

50

ハロゲン化物：エチル 6 - ヨードヘキサノエート ( 1 . 0 m m o l )

有機亜鉛試薬：ジフェニル亜鉛 ( 1 . 5 1 m m o l )

反応時間：0 . 5 時間

無色油状物質 ( 2 1 8 m g , 9 9 % )

試験例 6 - 7

ハロゲン化物：エチル 6 - プロモヘキサノエート ( 1 . 0 m m o l )

有機亜鉛試薬：ジフェニル亜鉛 ( 1 . 5 m m o l )

反応時間：0 . 5 時間

無色油状物質 ( 2 0 0 m g , 9 1 % )

表題化合物の分析データは、Zhou, J.; Fu, G. C. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 1340-1341 に報告されている。 10

試験例 6 - 8 ( 5 - ( 4 - メチルフェニル ) ベンチルアセテート )

ハロゲン化物：5 - プロモベンチルアセテート ( 1 . 0 m m o l )

有機亜鉛試薬：ジ ( 4 - メチルフェニル ) 亜鉛 ( 1 . 5 m m o l )

反応時間：0 . 5 時間

無色油状物質 ( 1 8 3 m g , 8 3 % ) ;

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  3020 (w), 2933 (m), 2866 (w), 1739 (s), 1517 (w), 1463 (w), 1366 (m), 1236 (s), 1044 (m), 805 (m);  $^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.12-7.03 (m, 4H), 4.04 (t,  $J = 6.1$  Hz, 2H), 2.57 (t,  $J = 7.8$  Hz, 2H), 2.31 (s, 3H), 2.03 (s, 3H), 1.68-1.58 (m, 4H), 1.43-1.34 (m, 2H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  171.2, 139.3, 135.1, 128.9 (2C), 128.2 (2C), 64.5, 35.3, 31.1, 28.4, 25.5, 21.0 20.9; 元素分析 計算値  $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_2$ : C, 76.33; H, 9.15. 実測値: C, 76.33; H, 9.19. 20

試験例 6 - 9 ( 4 - ( 2 - メチルフェニル ) シクロヘキシル ピバロエート )

ハロゲン化物：参考例 1 で得られたトランス - 4 - プロモ - シクロヘキシルピバロエート ( 1 . 0 m m o l )

有機亜鉛試薬：ジ ( 2 - メチルフェニル ) 亜鉛 ( 1 . 5 m m o l ) 30

反応時間：0 . 5 時間

無色油状物質 ( 2 6 8 m g , 9 8 % , トランス / シス = 5 5 / 4 5 ) ;

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  3022 (w), 2937 (m), 2863 (w), 1723 (s), 1480 (w), 1461 (w), 1283 (m), 1162 (s), 1034 (m), 1015 (m), 751 (m), 726 (w);  $^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ) トランス異性体:  $\delta$  7.21-7.07 (m, 4H), 4.80-4.73 (m, 1H), 2.76-2.70 (m, 1H); 2.33 (s, 3H), 2.12-2.07 (m, 2H), 1.91-1.85 (m, 2H), 1.63-1.41 (m, 4H), 1.20 (s, 9H), シス異性体:  $\delta$  7.24-7.08 (m, 4H), 5.11-5.08 (m, 1H), 2.82-2.74 (m, 1H), 2.35 (s, 3H), 2.05-1.98 (m, 2H), 1.84-1.74 (m, 2H), 1.71-1.62 (m, 4H), 1.26 (s, 9H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ) トランス異性体:  $\delta$  178.1, 144.1, 135.2, 130.3, 126.2, 125.8, 125.1, 72.5, 38.9, 38.6, 32.1 (2C), 31.3 (2C), 27.1 (3C), 19.3, シス異性体:  $\delta$  177.8, 145.0, 135.1, 120.3, 126.2, 125.7, 125.2, 68.4, 39.1, 39.0, 30.5 (2C), 27.6 (2C), 27.3 (3C), 19.4; 元素分析 計算値  $\text{C}_{18}\text{H}_{26}\text{O}_2$ : C, 78.79; H, 9.55. 実測値: C, 78.64; H, 9.54. 40

試験例 6 - 10 ( 3 - ( 4 - メトキシフェニル ) プロピオニトリル )

ハロゲン化物：3 - ヨードプロピオニトリル ( 1 . 0 m m o l ) 50

有機亜鉛試薬：ジ(4-メトキシフェニル)亜鉛(1.5 mmol)

反応時間：0.5時間

無色油状物質(151 mg, 86%) ;

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  3004 (w), 2937 (w), 2836 (w), 2240 (m), 1611 (w), 1509 (s), 1459 (w), 1301 (w), 1245 (s), 1177 (m), 1109 (w), 832 (m), 809 (m), 700 (w);  $^1\text{H NMR}$  (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.09 (d,  $J = 8.5$  Hz, 2H), 6.84 (d,  $J = 8.5$  Hz, 2H), 3.77 (s, 3H), 2.70 (t,  $J = 7.5$  Hz, 2H), 2.28 (t,  $J = 6.8$  Hz, 2H), 1.92 (tt,  $J = 7.5, 6.8$  Hz, 2H);  $^{13}\text{C NMR}$  (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  158.0, 131.5, 129.2 (2C), 119.5, 113.8 (2C), 55.1, 33.2, 26.9, 16.1; 元素分析 計算値  $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{NO}$ : C, 75.40; H, 7.48; N, 7.99. 実測値: C, 75.29; H, 7.67, N, 7.72

10

試験例 6-11 (メチル 2, 3, 4-トリ-O-アセチル-6-デオキシ-6-[3, 4-(メチレンジオキシ)フェニル]-D-グルコピラノシド)

ハロゲン化物：メチル 2, 3, 4-トリ-O-アセチル-6-デオキシ-6-ヨード-D-グルコピラノシド(1.0 mmol)

有機亜鉛試薬：ジ[3, 4-(メチレンジオキシ)フェニル]亜鉛(2.0 mmol) (ZnCl<sub>2</sub>・TMEDA(2.0 mmol)とArMgBr(0.8-1.0 MのTHF溶液, 4.0 mmol)を使用した。)

20

反応時間：0.5時間


無色油状物質(382 mg, 90%) ;

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  1746 (s), 1492 (m), 1443 (m), 1366 (m), 1216 (s), 1030 (s), 928 (m), 809 (w);  $^1\text{H NMR}$  (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  6.75-6.71 (m, 2H), 6.66-6.62 (m, 1H), 5.93 (s, 2H), 5.44 (t,  $J = 9.5$  Hz, 1H), 4.94-4.85 (m, 3H), 3.91 (dt,  $J = 9.5, 2.9$  Hz, 1H), 3.11 (s, 3H), 2.78-2.72 (m, 1H), 2.66-2.60 (m, 1H), 2.06 (s, 3H), 2.04 (s, 3H), 2.00 (s, 3H);  $^{13}\text{C NMR}$  (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  170.1 (2C), 169.8, 147.4, 146.1, 130.1, 122.2, 110.0, 108.0, 101.2, 100.8, 96.2, 72.3, 71.0, 70.3, 69.4, 54.9, 37.1, 20.7 (2C), 20.6; 元素分析 計算値  $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{O}_{10}$ : C, 56.60; H, 9.70. 実測値: C, 56.54; H, 5.97.

30

表 5





| 試験例  | (FG)R <sub>alkyl</sub> -X | 有機亜鉛試薬             | 収率 (%)      |
|------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 6-1  |                           |                    | 98 (X = I)  |
| 6-2  |                           | Ph <sub>2</sub> Zn | 97 (X = Br) |
| 6-3  |                           |                    | 88 (X = Cl) |
| 6-4  |                           | Ph <sub>2</sub> Zn | 89          |
| 6-5  |                           | Ph <sub>2</sub> Zn | 93          |
| 6-6  |                           | Ph <sub>2</sub> Zn | 99 (X = I)  |
| 6-7  |                           |                    | 91 (X = Br) |
| 6-8  |                           |                    | 83          |
| 6-9  |                           |                    | 98          |
| 6-10 |                           |                    | 86          |
| 6-11 |                           |                    | 90          |

10

20

30

50

表中、収率は単離収率を示す。

### [ 実施例 7 ]

試験例 7 - 1 ~ 試験例 7 - 6

下記の要領に従って、各種金属試薬およびハロゲン化物が生成物の収率に与える影響を調べた。

乾燥した反応容器に、各種芳香族亜鉛試薬 Ar<sub>2</sub>ZnX (X = Br, I) (0.5 M THF 溶液, 4.0 mL, 2.0 mmol) 及びマグネシウム化合物 Me<sub>3</sub>SiCH<sub>2</sub>MgCl (1.1 M Et<sub>2</sub>O, 溶液 1.8 mL, 2.0 mmol) の混合物を、0 で 0.5 - 1 時間攪拌した。得られた溶液に、TMEDA (0.30 mL, 2.0 mmol)、各種ハロゲン化物 (表 6 中、「(FG)R<sub>alkyl</sub>-X」で示す) (1.0 mmol)、及び、次いで、FeCl<sub>3</sub> (0.1 M THF 溶液, 0.5 mL, 0.05 mmol) を 0 で加えた。反応混合物を 30 で 6 時間攪拌した。飽和 NH<sub>4</sub>Cl 水溶液で反応を終了させ、混合物をフロリジル (Florisil: 登録商標のパッドを通して濾過し、真空下で濃縮させた。残渣をシリカゲルクロマトグラフィーで精製した。

試験例 7 - 1 (エチル 3 - [ 5 - (トリメチルシリル) ペンタ - 4 - イル ] ベンゾエー

ト)

ハロゲン化物：5 - ヨード - 1 - (トリメチルシリル) - ペンタ - 1 - イン (1.0 mmol)

芳香族垂鉛試薬：3 - (エトキシカルボニル) フェニル垂鉛ヨーダイド (2.0 mmol)

反応時間：6 時間

無色油状物質 (262 mg, 91%)

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  2955 (w), 2904 (w), 2175 (m), 1717 (s), 1447 (w), 1365 (w), 1275 (s), 1195 (w), 1105 (m), 1025 (w), 841 (s), 750 (m), 712 (m);  $^1\text{H NMR}$  (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.91-7.86 (m, 2H), 7.41-7.33 (m, 2H), 4.38 (q,  $J = 7.1$  Hz, 2H), 2.78 (t,  $J = 7.5$  Hz, 2H), 2.24 (t,  $J = 7.1$  Hz, 2H), 1.86 (tt,  $J = 7.5, 7.1$  Hz, 2H), 1.40 (t,  $J = 6.9$  Hz, 3H), 0.18 (s, 9H);  $^{13}\text{C NMR}$  (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  166.7, 141.8, 133.0, 132.7, 130.5, 129.5, 127.1, 106.7, 85.2, 60.9, 34.4, 30.0, 19.2, 14.3, 0.1 (3C); 元素分析 計算値  $\text{C}_{17}\text{H}_{24}\text{O}_2\text{Si}$ : C, 70.78; H, 8.39. 実測値: C, 70.64; H, 8.52

10

試験例 7 - 2 (エチル 3 - (3 - シアノプロピル) ベンゾエート)

20

ハロゲン化物：4 - ヨードブチロニトリル (1.0 mmol)

芳香族垂鉛試薬：3 - (エトキシカルボニルフェニル) ヨーダイド (2.0 mmol)

反応時間：6 時間

無色油状物質 (156 mg, 72%)

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  2981 (w), 2937 (w), 2871 (w), 1713 (s), 1445 (w), 1368 (w), 1277 (s), 1196 (s), 1106 (s), 1084 (m), 1023 (m), 861 (w), 751 (s), 695 (m);  $^1\text{H NMR}$  (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.92-7.84 (m, 2H), 7.38-7.35 (m, 2H); 4.36 (q,  $J = 7.1$  Hz, 2H), 2.81 (t,  $J = 7.5$  Hz, 2H), 2.32 (t,  $J = 6.9$  Hz, 2H), 1.99 (tt,  $J = 7.5, 6.9$  Hz, 2H), 1.38 (t,  $J = 7.2$  Hz, 3H);  $^{13}\text{C NMR}$  (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  166.4, 139.9, 132.8, 130.8, 129.2, 128.6, 127.7, 119.2, 60.9, 34.1, 26.7, 16.3, 14.1; 元素分析 計算値  $\text{C}_{13}\text{H}_{15}\text{NO}_2$ : C, 71.78; H, 6.96, N, 6.45.

30

試験例 7 - 3 (エチル 3 - (3 - ピバロキシシクロヘキシル) ベンゾエート)

ハロゲン化物：参考例 1 で得られた 3 - プロモシクロヘキシル ピバロエート (トランス / シス = 33 / 67, 1.0 mmol)

40

芳香族垂鉛試薬：3 - (エトキシカルボニル) フェニル垂鉛 ヨーダイド (2.0 mmol)

反応時間：24 時間

無色油状物質 (260 mg, 78%, トランス / シス = 47 / 53)

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  2977 (w), 2937 (w), 2867 (w), 1721 (s), 1283 (m), 1162 (m), 1109 (m), 1028 (w), 754 (w), 654 (w);  $^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ) トランス異性体:  $\delta$  7.92–7.86 (m, 2H), 7.42–7.33 (m, 2H), 5.21–5.16 (m, 1H), 4.38 (q,  $J = 7.1$  Hz, 2H), 3.01–2.92 (m, 1H), 2.08–2.02 (m, 1H), 1.98–1.90 (m, 2H), 1.77–1.67 (m, 3H), 1.58–1.47 (m, 2H), 1.40 (t,  $J = 7.2$  Hz, 3H), 1.26 (s, 9H), シス異性体:  $\delta$  7.92–7.87 (m, 2H), 7.43–7.34 (m, 2H), 4.87–4.79 (m, 1H), 4.38 (q,  $J = 7.2$  Hz, 2H), 2.77–2.68 (m, 1H), 2.19–2.13 (m, 1H), 2.08–2.01 (m, 1H), 1.97–1.90 (m, 1H), 1.90–1.83 (m, 1H), 1.58–1.33 (m, 4H), 1.40 (t,  $J = 7.2$  Hz, 3H), 1.18 (s, 9H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ) トランス異性体:  $\delta$  177.7, 166.8, 146.8, 131.4, 130.6, 128.4, 127.9, 127.3, 69.3, 60.9, 39.0, 38.4, 37.2, 33.4, 29.3, 27.2 (3C), 21.1, 14.3, シス異性体:  $\delta$  177.9, 166.7, 146.1, 131.4, 130.6, 128.4, 127.8, 127.4, 72.5, 60.9, 42.4, 39.1, 38.6, 32.9, 31.2, 27.1 (3C), 24.1, 14.3; 元素分析 計算値  $\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{O}_4$ : C, 72.26; H, 8.49.

10

20

試験例 7 - 4 ( 4 - シクロヘキシルベンゾニトリル )

ハロゲン化物 : 3 - プロモシクロヘキサン ( 1 . 0 mmol )

芳香族亜鉛試薬 : 4 - シアノフェニル亜鉛 プロマイド ( 2 . 0 mmol )

反応時間 : 6 時間

無色油状物質 ( 167 mg , 90% )

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  2925 (s), 2852 (m), 2227 (m), 1607 (m), 1505 (m), 1449 (m), 1415 (w), 1177 (w), 1000 (w), 823 (s);  $^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.56 (d,  $J = 8.6$  Hz, 2H), 7.30 (d,  $J = 8.6$  Hz, 2H), 2.12–2.00 (m, 1H), 1.92–1.80 (m, 4H), 1.80–1.69 (m, 1H), 1.47–1.33 (m, 4H), 1.33–1.20 (m, 1H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  153.4, 132.1 (2C), 127.6 (2C), 119.1, 109.5, 44.7, 33.9 (2C), 26.6 (2C), 25.9; 元素分析 計算値  $\text{C}_{13}\text{H}_{15}\text{N}$ : C, 84.28; H, 8.16; N, 7.56. 実測値: C, 84.12; H, 8.36; N, 7.36.

30

試験例 7 - 5 ( 4 - ( 4 - シアノフェニル ) - N - ( ベンジルオキシカルボニル ) ピペリジン )

ハロゲン化物 : 4 - プロモ - N - ( ベンジルオキシカルボニル ) ピペリジン ( 1 . 0 mmol )

芳香族亜鉛試薬 : 4 - シアノフェニル亜鉛 プロマイド ( 2 . 0 mmol )

反応時間 : 6 時間

淡黄色固体 ( 253 mg , 79% )

40

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  3014 (w), 2943 (w), 2923 (w), 2856 (w), 2227 (m), 1688 (s), 1466 (m), 1455 (m), 1436 (m), 1273 (w), 1218 (s), 1125 (m), 1057 (m), 1009 (m), 917 (w), 838 (m), 760 (s), 702 (s);  $^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.59 (d,  $J = 8.6$  Hz, 2H), 7.39–7.26 (m, 7H), 5.16 (br s, 2H), 4.35 (br s, 2H), 2.89 (br s, 2H), 1.90–1.78 (m, 2H), 1.70–1.58 (m, 2H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  155.2, 150.8, 136.7, 132.4 (2C), 128.5 (2C), 128.0, 127.9 (2C), 127.6 (2C), 118.8, 110.3, 67.2, 44.3 (2C), 42.7, 32.6 (2C); 元素分析 計算値  $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_2$ : C, 74.98; H, 6.29. N, 8.74. 実測値: C, 74.80; H, 6.42, N, 8.54.

10

試験例 7 - 6 ( 2 - ピリジルデカン )

ハロゲン化物 : ヨードデカン ( 1 . 0 m m o l )

芳香族垂鉛試薬 : 2 - ピリジル垂鉛 プロマイド ( 1 . 5 m m o l )

反応時間 : 0 . 5 時間

無色油状物質 ( 2 1 5 m g , 9 8 % )

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  2923 (s), 2854 (s), 1590 (m), 1569 (w) 1468 (m), 1434 (m), 1148 (w), 1050 (w), 994 (w), 747 (s);  $^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  8.52 (d,  $J = 4.6$  Hz, 1H) 7.58 (td,  $J = 7.6, 1.8$  Hz, 1H) 7.14 (d,  $J = 7.5$  Hz, 1H) 7.09 (dd,  $J = 6.9, 4.9$  Hz, 3H), 2.78 (t,  $J = 7.7$  Hz, 2H), 1.75–1.68 (m, 2H), 1.40–1.25 (m, 14H), 0.89 (t,  $J = 6.9$  Hz, 3H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  162.5, 149.2, 136.2, 122.7, 120.8, 38.4, 31.9, 29.9, 29.6, 29.5 (2C), 29.4, 29.3, 22.7, 14.1; 元素分析 計算値  $\text{C}_{15}\text{H}_{25}\text{N}$ : C, 82.13; H, 11.49; N, 6.38. 実測値: C, 82.01; H, 11.39; 6.19.

20

30

表 6

| $\begin{array}{c} \text{(FG)ArZnCH}_2\text{SiMe}_3 \text{ (2.0 eq)} \\ \text{FeCl}_3 \text{ (5 mol\%)} \\ \text{TMEDA (2.0 eq)} \\ \text{(FG)R}_{\text{alkyl}}\text{-X} \xrightarrow{\text{THF, 30 }^\circ\text{C, 6 h}} \text{(FG)R}_{\text{alkyl}}\text{-Ar(FG)} \end{array}$ |   |               |
|---|---|---------------|
| 試験例   | (FG)R <sub>alkyl</sub> -X               | 有機亜鉛試薬 収率 (%) |
| 7-1   |   | 91            |
| 7-2   |   | 72            |
| 7-3   |   | 78            |
| 7-4   |   | 90            |
| 7-5   |   | 79            |
| 7-6   | $n\text{-C}_{10}\text{H}_{21}\text{-I}$ | 98            |

表中、Lは  $\text{CH}_2\text{SiMe}_3$  を示す。

表中、収率は単離収率を示す。

[ 実施例 8 ]

試験例 8 - 1 ( 5 - ブトキシ - 2 , 2 - ジメチル - 3 - ( フェニルメチル ) テトラヒドロフラン ) 30

有機亜鉛試薬として、ジフェニル亜鉛 ( 1 . 5 m m o l ) を使用し、ハロゲン化物として、2 - ヨードエタナール プチル 1 , 1 - ジメチル - プロベニルアセテート ( 1 . 0 m m o l ) を使用した以外は試験例 6 - 1 と同様の手法で表題化合物を得た ( 手法 A ) 。無色油状物質 ( 1 9 8 m g , 7 6 % ) 。

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  3008 (w), 2962 (m), 2933 (m), 2873 (m), 1455 (w), 1366 (w), 1328 (w), 1246 (w), 1096 (s), 1034 (s), 980 (s), 911 (w), 836 (w), 726 (m), 699 (s);  $^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ) トランス異性体:  $\delta$  7.30-7.26 (m, 2H), 7.21-7.15 (m, 3H), 4.97 (d,  $J = 4.6$  Hz, 1H), 3.65 (dt,  $J = 9.7, 6.9$  Hz, 1H), 3.30 (dt,  $J = 9.7, 6.9$  Hz, 1H), 2.74-2.66 (m, 1H), 2.50-2.40 (m, 2H), 1.94-1.87 (m, 1H), 1.82-1.72 (m, 1H),

1.55-1.45 (m, 2H), 1.38-1.26 (m, 2H), 1.30 (s, 3H), 1.13 (s, 3H), 0.89 (t,  $J = 7.2$  Hz, 3H), シス異性体  $\delta$  7.31-7.25 (m, 2H), 7.22-7.14 (m, 3H), 5.03-4.99 (m, 1H), 3.71 (dt,  $J = 9.7, 6.9$  Hz, 1H), 3.34 (dt,  $J = 9.7, 6.9$  Hz, 1H), 2.75-2.68 (m, 1H), 2.57-2.49 (m, 1H), 2.27-2.18 (m, 1H), 2.12-2.04 (m, 1H), 1.78-1.65 (m, 1H), 1.60-1.48 (m, 2H), 1.44-1.32 (m, 2H), 1.26 (s, 3H), 1.23 (s, 3H), 0.92 (t,  $J = 7.2$  Hz, 3H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ) トランス異性体:  $\delta$  140.8, 128.7 (2C), 128.3 (2C), 126.0, 101.7, 83.4, 66.6, 47.6, 40.0, 36.4, 31.8, 29.7, 23.8, 19.4, 13.9, シス異性体:  $\delta$  140.9, 128.6 (2C), 128.4 (2C), 126.0, 103.0, 82.7, 67.7, 50.3, 39.0, 36.6, 31.9, 28.0, 23.2, 19.4, 13.9; 元素分析 計算値  $\text{C}_{17}\text{H}_{26}\text{O}_2$ : C, 77.82; H, 9.99. 実測値: C, 77.69; H, 10.02.

10

試験例 8 - 2 (5 - ブトキシ - 2, 2 - ジメチル - 3 - [3, 4 - (メチレンジオキシ) フェニルメチル] テトラヒドロフラン)

有機亜鉛試薬として、ジ [3, 4 - (メチレンジオキシ) フェニル] 亜鉛 (1.5 mmol) を使用し、ハロゲン化物として、2 - ヨードエタナール プチル 1, 1 - ジメチル - 2 - プロペニルアセテート (1.0 mmol) を使用した以外は試験例 6 - 1 と同様の手法で表題化合物を得た (手法 A)。無色油状物質 (264 mg, 86%) ;

20

30

40

FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  2964 (m), 2935 (m), 2875 (m), 1505 (m), 1490 (s), 1441 (m), 1366 (w), 1245 (s), 1191 (w), 1096 (s), 1036 (s), 980 (s), 924 (m), 812 (w);  $^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ) トランス異性体:  $\delta$  6.71 (d,  $J = 8.0$  Hz, 1H), 6.69 (s, 1H), 6.61 (d,  $J = 8.0$  Hz, 1H), 5.92 (s, 2H), 4.96 (d,  $J = 5.2$  Hz, 1H), 3.65 (dt,  $J = 9.2, 6.6$  Hz, 1H), 3.30 (dt,  $J = 9.2, 6.6$  Hz, 1H), 2.68-2.59 (m, 1H), 2.43-2.34 (m, 2H), 1.94-1.87 (m, 1H), 1.80-1.69 (m, 1H), 1.56-1.46 (m, 2H), 1.38-1.27 (m, 2H), 1.30 (s, 3H), 1.11 (s, 3H), 0.89 (t,  $J = 7.4$  Hz, 3H), シス異性体  $\delta$  6.72 (d,  $J = 8.0$  Hz, 1H), 6.66 (s, 1H), 6.61 (d,  $J = 8.0$  Hz, 1H), 5.92 (s, 2H), 5.03-4.98 (m, 1H), 3.71 (dt,  $J = 9.7, 6.9$  Hz, 1H), 3.34 (dt,  $J = 9.7, 6.9$  Hz, 1H), 2.66-2.57 (m, 1H), 2.48-2.40 (m, 1H), 2.27-2.18 (m, 1H), 2.07-1.97 (m, 1H), 1.78-1.67 (m, 1H), 1.60-1.47 (m, 2H), 1.43-1.30 (m, 2H), 1.24 (s, 3H), 1.23 (s, 3H), 0.92 (t,  $J = 7.2$  Hz, 3H);  $^{13}\text{C}$  NMR (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ) トランス異性体:  $\delta$  147.5, 145.7, 134.6, 121.5, 109.1, 108.1, 101.7, 100.8, 83.3, 66.6, 47.8, 38.9, 36.1, 31.8, 29.7, 23.8, 19.4, 13.9, シス異性体:  $\delta$  147.5, 145.7, 134.7, 121.4, 109.0, 108.1, 103.0, 100.8, 82.6, 67.7, 50.4, 39.0, 36.2, 31.9, 28.0, 23.2, 19.4, 13.8; 元素分析 計算値  $\text{C}_{18}\text{H}_{26}\text{O}_4$ : C, 70.56; H, 8.55. 実測値: C, 70.28; H, 8.60

50

試験例 8 - 3 ( 5 - ブトキシ - 2 , 2 - ジメチル - 3 - ( 4 - シアノフェニルメチル )  
テトラヒドロフラン )

芳香族亜鉛試薬として、4 - シアノフェニル亜鉛 ブロマイド ( 2 . 0 m m o l ) を使  
用し、ハロゲン化物として、2 - ヨードエタナール プチル 1 , 1 - ジメチル - 2 - プロ  
ペニルアセテート ( 1 . 0 m m o l ) を使用し、反応時間を 2 4 時間とした以外は、試験  
例 7 - 1 と同様の手法で表題化合物を得た ( 手法 B ) 。無色油状物質 ( 2 1 0 m g , 7 3  
% ) ;


FTIR (neat):  $\text{cm}^{-1}$  2962 (m), 2933 (m), 2871 (w), 2229 (m), 1609 (m), 1451 (w), 1366  
(w), 1328 (w), 1246 (w), 1094 (s), 1034 (s), 978 (s), 911 (w), 854 (m), 822 (m),  
764 (w);  $^1\text{H NMR}$  (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ) トランス異性体:  $\delta$  7.58 (d,  $J = 8.2$  Hz, 2H), 7.29  
(d,  $J = 8.6$  Hz, 2H), 4.97 (d,  $J = 4.6$  Hz, 1H), 3.65 (dt,  $J = 9.2$ ; 6.6 Hz, 1H), 3.30  
(dt,  $J = 9.2$ , 6.6 Hz, 1H), 2.82-2.74 (m, 1H), 2.55-2.39 (m, 2H), 1.87-1.83 (m, 1H),  
1.80-1.72 (m, 1H), 1.56-1.46 (m, 2H), 1.38-1.27 (m, 2H), 1.32 (s, 3H), 1.13 (s,  
3H), 0.89 (t,  $J = 7.4$  Hz, 3H), シス異性体  $\delta$  7.58 (d,  $J = 8.0$  Hz, 2H), 7.29 (d,  $J$   
 $= 8.6$  Hz, 2H), 5.04-4.98 (m, 1H), 3.71 (dt,  $J = 9.2$ , 6.9 Hz, 1H), 3.34 (dt,  $J =$   
9.2, 6.9 Hz, 1H), 2.82-2.74 (m, 1H), 2.66-2.58 (m, 1H), 2.22-2.13 (m, 1H), 2.12-2.04  
(m, 1H), 1.75-1.68 (m, 1H), 1.65-1.45 (m, 2H), 1.43-1.25 (m, 2H), 1.25 (s, 3H),  
1.22 (s, 3H), 0.92 (t,  $J = 7.2$  Hz, 3H);  $^{13}\text{C NMR}$  (125 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ) トランス異性体:  
 $\delta$  146.4, 132.2 (2C), 129.5 (2C), 118.9, 110.0, 101.6, 83.2, 66.6, 47.3, 38.7, 36.6,  
31.7, 29.6, 23.8, 19.3, 13.8, シス異性体:  $\delta$  146.5, 132.1 (2C), 129.4 (2C), 118.8,  
109.8, 102.7, 82.5, 67.5, 49.5, 38.5, 36.6, 31.7, 28.0, 23.2, 19.2, 13.7; 元素分  
析計算値  $\text{C}_{18}\text{H}_{25}\text{NO}_2$ : C, 75.22; H, 8.77; N, 4.87. 実測値: C, 75.04; H, 8.84; N, 4.72.

10

20

30

表 7



| 試験例 | Ar | 手法 | 収率 (%)      |
|-----|----|----|-------------|
| 8-1 |    | A  | 76% (63/37) |
| 8-2 |    | A  | 86% (64/36) |
| 8-3 |    | B  | 73% (63/37) |

表中、収率は単離収率を示す。

[ 実施例 9 ]

試験例 9 - 1 ~ 試験例 9 - 1 5


下記の要領に従って、ルイス酸金属塩がクロスカップリング反応に与える影響を調べた 20

まず、塩化亜鉛 - T M E D A 錯体とそれに対して 2 当量のフェニルリチウムから調製したジフェニル亜鉛試薬に対し、臭化シクロヘプタン 1 と 2 0 m o l % の下記表 8 に示されるルイス酸金属塩を加えた。そこに 5 m o l % の塩化鉄を 0 で加えてから 5 0 で 1 時間攪拌し、飽和塩化アンモニウム水溶液で反応を停止した。解析は G C によって行い、収率は内部標準 n - デカンとの比較により算出した ( 表 8 ) 。

表 8







2,4-ジクロロペンタン (70.5 mg, 0.5 mmol) と  $\text{FeCl}_3$  (0.5 mL の 0.1 M THF 溶液, 0.05 mmol) の混合物の THF (0.5 mL) 溶液に、50 で、1 時間にわたって、シリンジポンプを介して、フェニルマグネシウムブロマイド (1.25 mL の 0.96 M THF 溶液, 1.2 mmol) 及び TMEDA (181.1  $\mu\text{L}$ , 1.2 mmol) の混合物を加えた。得られた混合物をその温度で 20 分間攪拌し、飽和塩化アンモニウム水溶液で反応を停止させ、3 mL の酢酸エチルで希釈した。充填シリカゲル (溶離液; 酢酸エチル) を通して濾過し、減圧下で濃縮させた。 $^1\text{H NMR}$  から所望とする生成物がほぼ定量的な収率で得られたことが示された。循環型 GPC による生成で純粋な化合物が 71% の収率で得られた。

10


ジアステレオマー 1:1 混合物の  $^1\text{H NMR}$  (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  1.16 (d,  $J = 6.9$  Hz, 3H, 一方のジアステレオマーの  $\text{CH}_3$ ), 1.23 (d,  $J = 6.9$  Hz, 3H, もう一方のジアステレオマーの  $\text{CH}_3$ ), 1.76 (distorted dt,  $J = 13.2, 7.4$  Hz, 0.5H, 一方のジアステレオマーの  $\text{CHH}$ ), 1.87 (t,  $J = 7.4$  Hz, 1H, もう一方のジアステレオマーの  $\text{CH}_2$ ), 1.94 (distorted dt,  $J = 13.2, 7.4$  Hz, 0.5H, 一方のジアステレオマーの  $-\text{CHH}-$ ), 2.48 (sextet,  $J = 7.4$  Hz, 1H, もう一方のジアステレオマーの  $\text{CPh}$ ), 2.64 (sextet,  $J = 7.4$  Hz, 1H, 一方のジアステレオマーの  $\text{CPh}$ ), 7.10-7.21 (m, 6H, 両ジアステレオマーの芳香族プロトン), 7.26-7.31 (m, 4H, 両ジアステレオマーの芳香族プロトン). EI-MS (70 eV)  $m/z$   $[\text{M}]^+$  計算値  $\text{C}_{17}\text{H}_{20}$ , 224.2, 実測値 224.0

20

30

## [ 実施例 11 ]

## 2,4,6-トリフェニルヘプタン



2,4,6-トリクロロヘプタン (67 mg, 0.33 mmol) 及び  $\text{FeCl}_3$  (0.5 mL of a 0.1-M THF solution, 0.05 mmol) の混合物の THF 溶液に、50 にて、5 時間にわたって、シリンジポンプを介して、フェニルマグネシウムブロマイド (1.25 mL of a 0.96-M THF solution, 1.2 mL) 及び TMEDA (181.1  $\mu\text{L}$ , 1.2 mmol) の混合物を加えた。得られた混合物をその温度で 20 分間攪拌し、飽和塩化アンモニウム水溶液で反応を停止させ、3 mL の酢酸エチルで希釈した。充填シリカゲル (溶離液; 酢酸エチル) を通して濾過し、減圧下で濃縮させた。純粋な生成物が 65% の収率で得られた (フラッシュクロマトグラフィー、溶離液: ヘキサン)

40

3種のジアステレオマー混合物の<sup>1</sup>H NMR (500 MHz, CDCl<sub>3</sub>) δ 1.04 (d, *J* = 6.9 Hz, 1.0 H) 1.05 (d, *J* = 6.9 Hz, 1.4H), 1.12 (d, *J* = 6.9 Hz, 1.8H), 1.15 (d, *J* = 6.9 Hz, 1.8H), 1.69- 2.01 (m, 4H), 2.30- 2.62 (m, 3H), 6.96- 7.31 (m, 15H, 芳香族プロトン), EI-MS (70 eV) 72m/z [M]<sup>+</sup> 計算値 C<sub>25</sub>H<sub>28</sub>, 328.2, 実測値 327.9。

【手続補正書】

【提出日】平成19年6月19日(2007.6.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文


【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記式(1)で示される芳香族化合物の製造方法であって、



[式中、Rは、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は、C<sub>3</sub>~C<sub>10</sub>飽和環基若しくは不飽和環基であって、前記環は、酸素原子又は式-N(B)-で示される基(式中、Bは水素原子、置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>~C<sub>10</sub>炭化水素基、又は置換基を有していてもよいC<sub>1</sub>~C<sub>10</sub>アルコキシカルボニル基である。)で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していてもよく、

但し、Rが芳香族基又は複素芳香族基である場合を除く。

Aは、置換基を有していてもよいC<sub>4</sub>~C<sub>20</sub>芳香族基又は置換基を有していてもよい複素芳香族基である。]

鉄触媒およびジアミン化合物存在下、下記式(2)で示される化合物と、



[式中、Rは上記の意味を有する。Xは、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルである。]

下記式(3a)で示される芳香族マグネシウム試薬と、



[式中、Aは上記の意味を有する。Y<sup>1</sup>は、臭素、ヨウ素、塩素、又は炭素アニオン配位子である。]

を反応させることを特徴とする、芳香族化合物の製造方法。

【請求項2】

鉄触媒が、鉄塩又は鉄錯体であることを特徴とする、請求項1に記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項3】

ジアミン化合物が、2座配位子であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項4】

Rが、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることを特徴とする、請求項1~3のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項5】

Aが、置換基を有していてもよいC<sub>4</sub>~C<sub>20</sub>アリール基であることを特徴とする、請求項1~4のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

## 【請求項 6】

下記式 ( 1 ) で示される芳香族化合物の製造方法であって、



[ 式中、R は、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は、 $C_3 \sim C_{10}$  飽和環基若しくは不飽和環基であって、前記環は、酸素原子又は式 - N ( B ) - で示される基 ( 式中、B は水素原子、置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  炭化水素基、又は置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  アルコキシカルボニル基である。 ) で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していてもよく、

但し、R が芳香族基又は複素芳香族基である場合を除く。

A は、置換基を有していてもよい  $C_4 \sim C_{20}$  芳香族基又は置換基を有していてもよい複素芳香族基である。 ]


ジアミン化合物存在下、

下記式 ( 3 a ) で示される芳香族マグネシウム試薬と、



[ 式中、A は上記の意味を有する。  $Y^1$  は、臭素、ヨウ素、塩素、又は炭素アニオン配位子である。 ]

下記式 ( 4 b ) で示される亜鉛化合物とを反応させ、反応混合物を得る工程と、



[ 式中、 $Z^3$  および  $Z^4$  は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、臭素、ヨウ素、塩素、フッ素、又はトリフルオロメタンシルホニル基である。 ]

鉄触媒存在下、前記反応混合物と、下記式 ( 2 ) で示される化合物と、



[ 式中、R は上記の意味を有する。X は、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルである。 ]

を反応させる工程とを含むことを特徴とする、芳香族化合物の製造方法。

## 【請求項 7】

鉄触媒が、鉄塩又は鉄錯体であることを特徴とする、請求項 6 に記載の芳香族化合物の製造方法。

## 【請求項 8】

ジアミン化合物が、2 座配位子であることを特徴とする、請求項 6 又は 7 に記載の芳香族化合物の製造方法。

## 【請求項 9】

R が、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることを特徴とする、請求項 6 ~ 8 のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

## 【請求項 10】

A が、置換基を有していてもよい  $C_4 \sim C_{20}$  アリール基であることを特徴とする、請求項 6 ~ 9 のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

## 【請求項 11】

下記式 ( 1 ) で示される芳香族化合物の製造方法であって、



[ 式中、R は、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は、 $C_3 \sim C_{10}$  飽和環基若しくは不飽和環基であって、前記環は、酸素原子又は式 - N ( B ) - で示される基 ( 式中、B は水素原子、置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  炭化水素基、又は置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  アルコキシカルボニル基である。 ) で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していてもよく、

但し、R が芳香族基又は複素芳香族基である場合を除く。

A は、置換基を有していてもよい  $C_4 \sim C_{20}$  芳香族基又は置換基を有していてもよい複素芳香族基である。 ]


ジアミン化合物存在下、

下記式 ( 3 c ) で示される芳香族リチウム試薬と、



[ 式中、A は上記の意味を有する。 ]

下記式 ( 4 b ) で示される亜鉛化合物とを反応させ、



[ 式中、 $Z^3$  および  $Z^4$  は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、臭素、ヨウ素、又は塩素である。 ]

次いで、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、ガリウム及びアルミニウムからなる群より選ばれる一種以上の金属を含むルイス酸金属化合物を反応させ、反応混合物を得る工程と、

鉄触媒存在下、前記反応混合物と、下記式 ( 2 ) で示される化合物と、



[ 式中、R は上記の意味を有する。X は、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルである。 ]

を反応させる工程とを含むことを特徴とする、芳香族化合物の製造方法。

【請求項 1 2】

鉄触媒が、鉄塩又は鉄錯体であることを特徴とする、請求項 1 1 に記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項 1 3】

ジアミン化合物が、2 座配位子であることを特徴とする、請求項 1 1 又は 1 2 に記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項 1 4】

R が、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることを特徴とする、請求項 1 1 ~ 1 3 のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項 1 5】

A が、置換基を有していてもよい  $C_4 \sim C_{20}$  アリール基であることを特徴とする、請求項 1 1 ~ 1 4 のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項 1 6】

ルイス酸金属化合物が、下記式 ( 4 c ) で示される金属化合物であることを特徴とする、請求項 1 1 ~ 1 5 のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。



[ 式中、M は、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、ガリウム、又はアルミニウムであり、 $Z^1$  は、それぞれ独立して、同一又は異なって、臭素、ヨウ素、塩素、又は炭素アニオン配位子であり、n は 2 ~ 4 の整数である。 ]

【請求項 1 7】

下記式 ( 1 ) で示される芳香族化合物の製造方法であって、



[ 式中、R は、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は、 $C_3 \sim C_{10}$  飽和環基若しくは不飽和環基であって、前記環は、酸素原子又は式 - N ( B ) - で示される基 ( 式中、B は水素原子、置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  炭化水素基、又は置換基を有していてもよい  $C_1 \sim C_{10}$  アルコキシカルボニル基である。 ) で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していてもよく、

但し、R が芳香族基又は複素芳香族基である場合を除く。

A は、置換基を有していてもよい  $C_4 \sim C_{20}$  芳香族基又は置換基を有していてもよい複素芳香族基である。 ]

ジアミン化合物存在下、下記式 ( 3 b ) で示される芳香族亜鉛試薬と、



[ 式中、A は上記の意味を有する。 $Y^2$  は、臭素、ヨウ素、又は塩素である。 ]

下記式 ( 4 a ) で示されるマグネシウム化合物とを反応させ、反応混合物を得る工程と、



[ 式中、 $Z^1$ は、炭素アニオン配位子であり、 $Z^2$ は、臭素、ヨウ素、又は塩素である。]  
鉄触媒存在下、前記反応混合物と、下記式(2)で示される化合物と、



[ 式中、Rは上記の意味を有する。Xは、ハロゲン原子又はスルホン酸エステルである。]

を反応させる工程とを含むことを特徴とする、芳香族化合物の製造方法。

【請求項18】

鉄触媒が、鉄塩又は鉄錯体であることを特徴とする、請求項17に記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項19】

ジアミン化合物が、2座配位子であることを特徴とする、請求項17又は18に記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項20】

Rが、置換基を有していてもよい第一級アルキル基、又は、置換基を有していてもよい第二級アルキル基であることを特徴とする、請求項17～19のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

【請求項21】

Aが、置換基を有していてもよい $C_4 \sim C_{20}$ アリール基であることを特徴とする、請求項17～20のいずれかに記載の芳香族化合物の製造方法。

## 【 国際調査報告 】

| INTERNATIONAL SEARCH REPORT   |  | International application No.<br>PCT/JP2005/002529  |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |
|---|--|---|-----------|--|-----------------------|--------|--|-------------|--------|--|-------------|---|---|------|---|--|------|
| <p>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER<br/>           Int.Cl<sup>7</sup> C07B37/04, 49/00, C07C1/32, 13/28, 13/40, 15/02, 15/107, 15/12, 17/263, 22/08, 41/30, 43/21, 67/293, 67/343, 69/157, 69/24, 69/612, 69/76, 253/30, 255/37, 255/41, 255/50, C07D209/08, 211/34,<br/>           According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC</p>  |  |   |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |
| <p>B. FIELDS SEARCHED<br/>           Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)<br/>           Int.Cl<sup>7</sup> C07B37/04, 49/00, 61/00, C07C1/32, 13/28, 13/40, 15/02, 15/107, 15/12, 17/263, 22/08, 41/30, 43/21, 67/293, 67/343, 69/157, 69/24, 69/612, 69/76, 253/30, 255/37, 255/41, 255/50,</p> <p>Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched<br/>           Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005<br/>           Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005</p> <p>Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)</p>   |  |   |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |
| <p>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Category*</th> <th style="width: 60%;">Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th style="width: 30%;">Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X<br/>Y</td> <td>JP 2000-229243 A (Tosoh Corp.),<br/>22 August, 2000 (22.08.00),<br/>(Family: none)</td> <td>1-5<br/>6-21</td> </tr> <tr> <td>X<br/>Y</td> <td>US 2003/0220498 A1 (FURSTNER et al.),<br/>27 November, 2003 (27.11.03),<br/>(Family: none)</td> <td>1-5<br/>6-21</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>JP 2001-293375 A (Tosoh Corp.),<br/>23 October, 2001 (23.10.01),<br/>(Family: none)</td> <td>6-21</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>JP 2000-344727 A (Tosoh Corp.),<br/>12 December, 2000 (12.12.00),<br/>(Family: none)</td> <td>6-10</td> </tr> </tbody> </table> |  |   | Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. | X<br>Y | JP 2000-229243 A (Tosoh Corp.),<br>22 August, 2000 (22.08.00),<br>(Family: none) | 1-5<br>6-21 | X<br>Y | US 2003/0220498 A1 (FURSTNER et al.),<br>27 November, 2003 (27.11.03),<br>(Family: none) | 1-5<br>6-21 | Y | JP 2001-293375 A (Tosoh Corp.),<br>23 October, 2001 (23.10.01),<br>(Family: none) | 6-21 | Y | JP 2000-344727 A (Tosoh Corp.),<br>12 December, 2000 (12.12.00),<br>(Family: none) | 6-10 |
| Category*   | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages       | Relevant to claim No.   |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |
| X<br>Y  | JP 2000-229243 A (Tosoh Corp.),<br>22 August, 2000 (22.08.00),<br>(Family: none)         | 1-5<br>6-21   |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |
| X<br>Y  | US 2003/0220498 A1 (FURSTNER et al.),<br>27 November, 2003 (27.11.03),<br>(Family: none) | 1-5<br>6-21   |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |
| Y   | JP 2001-293375 A (Tosoh Corp.),<br>23 October, 2001 (23.10.01),<br>(Family: none)        | 6-21  |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |
| Y   | JP 2000-344727 A (Tosoh Corp.),<br>12 December, 2000 (12.12.00),<br>(Family: none)       | 6-10  |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C.      <input type="checkbox"/> See patent family annex.</p>  |  |   |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |
| <p>* Special categories of cited documents:<br/>           "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance<br/>           "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date<br/>           "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)<br/>           "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means<br/>           "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p>   |  | <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention<br/>           "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone<br/>           "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art<br/>           "&amp;" document member of the same patent family</p> |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |
| <p>Date of the actual completion of the international search<br/>16 May, 2005 (16.05.05)</p>  |  | <p>Date of mailing of the international search report<br/>31 May, 2005 (31.05.05)</p>   |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |
| <p>Name and mailing address of the ISA/<br/>Japanese Patent Office</p>  |  | <p>Authorized officer</p>   |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |
| <p>Facsimile No.</p>  |  | <p>Telephone No.</p>  |           |  |                       |        |  |             |        |  |             |   |   |      |   |  |      |

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/002529

| C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| Category*   | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  | Relevant to claim No. |
| P, X<br>P, Y  | MARTIN, Rubén et al., Cross-Coupling Alkyl Halides with Aryl Grignard Reagents Catalyzed by a Low-Valent Iron Complex, <i>Angewandte Chemie International Edition</i> , 26 July, 2004 (26.07.04), Vol.43, No.30, pages 3955 to 3957 | 1-5<br>6-21           |



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/002529

## Box No. II

## Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1.  Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
  
2.  Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
  
3.  Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

## Box No. III

## Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

The matter common to a group of inventions of claims 1-5, a group of inventions of claims 6-10, a group of inventions of claims 11-16, and a group of inventions of claims 17-21 is a process for the production of aromatic compounds which comprises reacting a specific halide or sulfonic ester compound with an aromatic metal compound in the presence of an iron catalyst and a diamine, but this process is publicly known as disclosed in Document A-B cited in the later Box and is thus still at the level of prior art. Therefore, the process is not a special technical feature as provided for in PCT Rule 13.2.

Such being the case, there is no technical relationship among the four (continued to extra sheet)

1.  As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.  As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.  As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
  
4.  No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

## Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2005/002529

Continuation of A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
(International Patent Classification (IPC))

Int.Cl<sup>7</sup> 213/127, 213/16, 307/20, 407/06, C07F7/08, C07J9/00//  
B01J31/20, 31/22, 31/30, C07B61/00

(According to International Patent Classification (IPC) or to both national  
classification and IPC)

Continuation of B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (International Patent Classification (IPC))

Int.Cl<sup>7</sup> C07D209/08, 211/34, 213/127, 123/16, 307/20, 407/06,  
C07F7/08, C07J9/00, B01J31/20, 13/22, 31/30

Minimum documentation searched (classification system followed by  
classification symbols)

Continuation of Box No.III of continuation of first sheet(2)

groups of inventions involving one or more of the same or corresponding  
special technical features. This international application includes  
four groups of inventions which are not so linked as to form a single  
general inventive concept.

Document A: JP 2000-229243 A (Tosoh Corp.),  
22 August, 2000 (22.08.00)

Document B: US 2003/0220498 A1 (FURSTNER et al.),  
27 November, 2003 (27.11.03)

| 国際調査報告   |  | 国際出願番号 PCT/JP2005/002529    |                 |                                   |                  |   |   |     |   |           |      |   |   |     |   |           |      |
|--|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---|---|-----|---|-----------|------|---|---|-----|---|-----------|------|
| <p>A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))</p> <p>Int.Cl.<sup>7</sup> C07B 37/04, 49/00, C07C 1/32, 13/28, 13/40, 15/02, 15/107, 15/12, 17/263, 22/08, 41/30, 43/21, 67/293, 67/343, 69/157, 69/24, 69/612, 69/76, 253/30, 255/37, 255/41, 255/50, C07D 209/08, 211/34, 213/127, 213/16, 307/20, 407/06, C07F 7/08, C07J 9/00 // B01J 31/20, 31/22, 31/30, C07B 61/00</p>  |  |                             |                 |                                   |                  |   |   |     |   |           |      |   |   |     |   |           |      |
| <p>B. 調査を行った分野</p> <p>調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))</p> <p>Int.Cl.<sup>7</sup> C07B 37/04, 49/00, 61/00, C07C 1/32, 13/28, 13/40, 15/02, 15/107, 15/12, 17/263, 22/08, 41/30, 43/21, 67/293, 67/343, 69/157, 69/24, 69/612, 69/76, 253/30, 255/37, 255/41, 255/50, C07D 209/08, 211/34, 213/127, 213/16, 307/20, 407/06, C07F 7/08, C07J 9/00, B01J 31/20, 31/22, 31/30</p> <p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの</p> <p>日本国実用新案公報 1922-1996年<br/>         日本国公開実用新案公報 1971-2004年<br/>         日本国実用新案登録公報 1996-2005年<br/>         日本国登録実用新案公報 1994-2005年</p> <p>国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)</p>  |  |                             |                 |                                   |                  |   |   |     |   |           |      |   |   |     |   |           |      |
| <p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">引用文献の<br/>カテゴリー*</th> <th style="width: 70%;">引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th style="width: 20%;">関連する<br/>請求の範囲の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>JP 2000-229243 A (東ソー株式会社),<br/>2000.08.22</td> <td>1-5</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>(ファミリーなし)</td> <td>6-21</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>US 2003/0220498 A1 (FURSTNER et al.),<br/>2003.11.27</td> <td>1-5</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>(ファミリーなし)</td> <td>6-21</td> </tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</p> <p>* 引用文献のカテゴリー</p> <p>「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの<br/>         「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの<br/>         「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)<br/>         「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献<br/>         「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献<br/>         「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの<br/>         「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの<br/>         「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの<br/>         「&amp;」 同一パテントファミリー文献</p> |  |                             | 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する<br>請求の範囲の番号 | X | JP 2000-229243 A (東ソー株式会社),<br>2000.08.22 | 1-5 | Y | (ファミリーなし) | 6-21 | X | US 2003/0220498 A1 (FURSTNER et al.),<br>2003.11.27 | 1-5 | Y | (ファミリーなし) | 6-21 |
| 引用文献の<br>カテゴリー*  | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                      | 関連する<br>請求の範囲の番号            |                 |                                   |                  |   |   |     |   |           |      |   |   |     |   |           |      |
| X  | JP 2000-229243 A (東ソー株式会社),<br>2000.08.22              | 1-5                         |                 |                                   |                  |   |   |     |   |           |      |   |   |     |   |           |      |
| Y  | (ファミリーなし)  | 6-21                        |                 |                                   |                  |   |   |     |   |           |      |   |   |     |   |           |      |
| X  | US 2003/0220498 A1 (FURSTNER et al.),<br>2003.11.27    | 1-5                         |                 |                                   |                  |   |   |     |   |           |      |   |   |     |   |           |      |
| Y  | (ファミリーなし)  | 6-21                        |                 |                                   |                  |   |   |     |   |           |      |   |   |     |   |           |      |
| 国際調査を完了した日   | 16.05.2005   | 国際調査報告の発送日 <b>31.5.2005</b> |                 |                                   |                  |   |   |     |   |           |      |   |   |     |   |           |      |
| 国際調査機関の名称及びあて先<br>日本国特許庁 (ISA/JP)<br>郵便番号100-8915<br>東京都千代田区霞が関三丁目4番3号   | 特許庁審査官 (権限のある職員)<br>山本 昌広<br>電話番号 03-3581-1101 内線 3483 | 4V 9280                     |                 |                                   |                  |   |   |     |   |           |      |   |   |     |   |           |      |

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2005/002529

| C (続き) 関連すると認められる文献 |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| 引用文献の<br>カテゴリー*     | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示  | 関連する<br>請求の範囲の番号 |
| Y                   | JP 2001-293375 A (東ソー株式会社),<br>2001.10.23<br>(ファミリーなし)   | 6-21             |
| Y                   | JP 2000-344727 A (東ソー株式会社),<br>2000.12.12<br>(ファミリーなし)   | 6-10             |
| P, X                | MARTIN, Rubén et al., Cross-Coupling of Alkyl Halides with Aryl<br>Grignard Reagents Catalyzed by a Low-Valent Iron Complex, | 1-5              |
| P, Y                | Angewandte Chemie International Edition, 2004.07.26,<br>Vol. 43, No. 30, p. 3955-3957  | 6-21             |

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (2004年1月)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2005/002529

## 第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1.  請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、この国際調査機関が調査することを要しない対象に係るものである。つまり、 \_\_\_\_\_
2.  請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、 \_\_\_\_\_
3.  請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

## 第III欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲1-5に記載された発明、請求の範囲6-10に記載された発明、請求の範囲11-16に記載された発明、請求の範囲17-21に記載された発明に共通する事項である、鉄触媒及びジアミン化合物の存在下、本願所定のハロゲン又はスルホン酸エステル化合物と芳香族金属化合物とを反応させることからなる芳香族化合物の製造方法は、下記文献A-Bに記載されているように公知であり、先行技術の域を出ないから、PCT規則13.2に規定する特別な技術的特徴に該当しない。

したがって、上記の4の発明群の間には、同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係は存在しないから、この国際出願は、単一の一般的発明概念を形成するように連関していない4の発明群を含むものである。

1.  出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2.  追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3.  出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4.  出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

## 追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。  
 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

様式PCT/ISA/210 (第1ページの続葉(2)) (2004年1月)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2005/002529

## 第III欄の続き

文献A: JP 2000-229243 A (東ソー株式会社),  
2000.08.22

文献B: US 2003/0220498 A1 (FURSTNER et al.),  
2003.11.27

## フロントページの続き

| (51) Int.Cl.                    | F I            | テーマコード(参考) |
|---------------------------------|----------------|------------|
| <b>C 0 7 D 209/08 (2006.01)</b> | C 0 7 D 209/08 | 4 H 0 3 9  |
| <b>C 0 7 J 9/00 (2006.01)</b>   | C 0 7 J 9/00   | 4 H 0 4 9  |
| <b>C 0 7 H 17/04 (2006.01)</b>  | C 0 7 H 17/04  |            |
| <b>C 0 7 H 7/06 (2006.01)</b>   | C 0 7 H 7/06   |            |
| <b>C 0 7 D 213/16 (2006.01)</b> | C 0 7 D 213/16 |            |
| <b>C 0 7 C 13/66 (2006.01)</b>  | C 0 7 C 13/66  |            |
| <b>C 0 7 C 15/107 (2006.01)</b> | C 0 7 C 15/107 |            |
| <b>C 0 7 C 67/347 (2006.01)</b> | C 0 7 C 67/347 |            |
| <b>C 0 7 C 69/612 (2006.01)</b> | C 0 7 C 69/612 |            |
| <b>C 0 7 C 69/157 (2006.01)</b> | C 0 7 C 69/157 |            |
| <b>C 0 7 C 69/24 (2006.01)</b>  | C 0 7 C 69/24  |            |
| <b>C 0 7 F 7/08 (2006.01)</b>   | C 0 7 F 7/08   | C          |
| <b>C 0 7 C 253/30 (2006.01)</b> | C 0 7 C 253/30 |            |
| <b>C 0 7 C 255/37 (2006.01)</b> | C 0 7 C 255/37 |            |
| <b>C 0 7 B 49/00 (2006.01)</b>  | C 0 7 B 49/00  |            |

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72) 発明者 中村 正治

京都府宇治市五ヶ庄京都大学職員宿舎 3 - 3 3 5

(72) 発明者 中村 栄一

東京都文京区本駒込 5 - 3 - 3 - 1 0 0 1

(72) 発明者 松尾 敬子

東京都江東区青梅 2 丁目 7 9 番 東京国際交流館 C棟 8 0 8

(72) 発明者 伊藤 慎庫

京都府宇治市五ヶ庄平野 5 6 - 2 グレース 1 6 - 3 0 5 号

F ターム(参考) 4C055 AA01 BA02 BA06 CA01 DA01 FA03

4C057 AA18 AA19 BB02 DD03 EE05 KK02

4C091 AA02 CC01 DD01 EE02 FF01 GG01 HH01 JJ03 KK01 LL01

MM03 NN01 PA05 PB05 QQ01 RR01

4C204 AB01 BB04 CB03 DB01 EB01 FB10 GB01

4H006 AA02 AC29 BA19

4H039 CA40 CA41 CD20 CD90

4H049 VN01 VP01 VQ02 VQ04 VR24 VS02 VS04

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。