

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02013/031704

発行日 平成27年3月23日 (2015. 3. 23)

(43) 国際公開日 **平成25年3月7日 (2013. 3. 7)**

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C 1 2 N 15/09 (2006.01)	C 1 2 N 15/00	Z N A A 4 B O 2 4
A 6 1 K 31/7105 (2006.01)	A 6 1 K 31/7105	4 C O 8 6
A 6 1 P 35/02 (2006.01)	A 6 1 P 35/02	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 21 頁)

出願番号	特願2013-531291 (P2013-531291)	(71) 出願人	505111982 学校法人 新潟科学技術学園 新潟薬科大学
(21) 国際出願番号	PCT/JP2012/071503		
(22) 国際出願日	平成24年8月24日 (2012. 8. 24)		
(31) 優先権主張番号	特願2011-185594 (P2011-185594)		新潟県新潟市秋葉区東島字山居2 6 5 番地 1
(32) 優先日	平成23年8月29日 (2011. 8. 29)	(71) 出願人	304027279 国立大学法人 新潟大学
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		新潟県新潟市西区五十嵐2 の町 8 0 5 0 番地
		(74) 代理人	100093230 弁理士 西澤 利夫
		(72) 発明者	梨本 正之 新潟県新潟市秋葉区東島字山居2 6 5 番1 学校法人新潟科学技術学園新潟薬科大学 内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ヒト白血病細胞のアポトーシスを誘導するヘプタマー型スモールガイド核酸

(57) 【要約】

ヒト白血病細胞のアポトーシスを誘導する、配列番号1から15のいずれかの7塩基配列からなるヘプタマー型スモールガイド核酸と、このヘプタマー型スモールガイド核酸を有効成分として含有する白血病治療薬で、ヒト白血病細胞のアポトーシスを誘導することができる新規なヘプタマー型sg核酸を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ヒト白血病細胞のアポトーシスを誘導する、配列番号 1 から 15 のいずれかの 7 塩基配列からなるヘプタマー型スモールガイド核酸。

【請求項 2】

ヒト白血病細胞のアポトーシスが、3 日間で 85% 以上の細胞死である請求項 1 のヘプタマー型スモールガイド核酸。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載のヘプタマー型スモールガイド核酸の 1 種または 2 種以上を有効成分として含有する白血病治療薬。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、TRUE ジーンサイレンシングによってヒト白血病細胞のアポトーシスを効率よく誘導するヘプタマー型スモールガイド核酸に関するものである。

【背景技術】

【0002】

本発明の発明者らは、TRUE ジーンサイレンシング (*tRNase Z^L-utilizing efficacious gene silencing*) と名付けた新しい遺伝子発現抑制技術を開発している (特許文献 1、非特許文献 1 - 4)。tRNase Z^L は、tRNA の 3' 末端部をプロセシングするエンドリボヌクレアーゼ (tRNase Z または 3' tRNase) の分子量の大きい種類の酵素であり、前駆体 tRNA の 3' 末端部を切除する (特許文献 1、非特許文献 5、6)。この TRUE ジーンサイレンシングは、標的 RNA と合成スモールガイド核酸とによって形成される pre-tRNA 様またはマイクロ pre-tRNA 様複合体を認識することによって、いかなる RNA の任意箇所をも切断することができるという哺乳動物 tRNase Z^L のユニークな酵素的特性に基づいている (非特許文献 7 - 13)。スモールガイド核酸 (特にスモールガイド RNA) は、5' -half tRNA (非特許文献 8)、12~16-nt 直鎖 RNA (非特許文献 13)、ヘプタマー型 RNA (非特許文献 9) およびフック型 RNA (非特許文献 12) の 4 種に分けられる。

【0003】

発明者らは、様々な mRNA を標的とするスモールガイド核酸 (以下、sg 核酸と記載することがある) を、その発現プラスミドまたは 2' -O-methyl RNAs を導入することによって、様々な哺乳動物細胞における TRUE ジーンサイレンシングの有効性を実証している (非特許文献 1 - 4)。例えば、Jurkat 細胞における HIV-1 発現は、5' -half tRNA 型 sgRNA によって 18 日間以上抑制され (非特許文献 2)、マウス肝臓におけるルシフェラーゼ発現はヘプタマー型 sg 核酸によって抑制された (非特許文献 3)。さらに、TRUE ジーンサイレンシングの効果は、RNA 干渉 (RNA interference: RNAi) と同等であり (非特許文献 3、14)、幾つかの場合では RNAi の効果を凌ぐことも確認されている (非特許文献 4)。

【0004】

また最近、発明者らは、tRNase Z^L が核内だけでなくサイトゾルにも存在すること、そして sg 核酸として使用していたのと同じ 5' -half tRNA が細胞質に存在することを見出している (非特許文献 15)。また、発明者らは、ヒトサイトゾル tRNase Z^L が、5' -half tRNA の指揮のもとで mRNA を切断することによって遺伝子発現を調節すること、そして PP1F mRNA が tRNase Z^L の真の標的の一つであることを見出している (非特許文献 15)。さらにまた、発明者らは、miR-103 を含むマイクロ RNA の一部がフック型 sg 核酸として働き、サイトゾル tRNase Z^L による mRNA 切断を介して遺伝子発現を下方調節しえることを証明している (非特許文献 16)。以上のことから、TRUE ジーンサイレンシングは、細胞内の小さな非コード RNA によって作動されるサイトゾル tRNase Z^L の新たに解明された生理学的役割を基礎として機能していることは明らかである。

【0005】

TRUE ジーンサイレンシングの最終的な目的の一つは、特定遺伝子の発現を原因とする疾

10

20

30

40

50

患治療剤または予防剤としてのsg核酸の使用である。例えば、発明者らは既に、がん治療の分子標的として有望視されているBcl-2およびVEGFをコードする細胞内mRNAレベルが、5'-half tRNA型sg核酸、14-nt直鎖型sg核酸またはヘプタマー型sg核酸によって発現抑制されることを見出している（非特許文献1、4、17）。

【0006】

sg核酸を薬剤成分とする場合、薬理的な視点からは、ヘプタマー型sg核酸が最も好ましい。何故ならば、ヘプタマー（7塩基核酸）は長鎖のsg核酸よりも遙かに簡便かつ安価に合成することができる。また、ヘプタマー型sg核酸は、刺激剤（トランスフェクション試薬等）を用いることなく容易に細胞内に取込ませることができる（非特許文献18）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献1】特許第3660718号公報

【非特許文献】

【0008】

【非特許文献1】Tamura,M., Nashimoto,C., Miyake,N., Daikuhara,Y., Ochi,K. and Nashimoto,M.(2003) Intracellular mRNA cleavage by 3' tRNase under the direction of 2'-O-methylRNA heptamers. *Nucleic Acids Res.*, 31, 4354-4360.

【非特許文献2】Habu,Y., Miyano-Kurosaki,N., Kitano,M., Endo,Y., Yukita,M., Ohira,S., Takaku,H., Nashimoto,M. and Takaku,H. (2005) Inhibition of HIV-1 gene expression by retroviral vector-mediated small-guide RNAs that direct specific RNA cleavage by tRNase ZL. *Nucleic Acids Res.*, 33, 235-243.

【非特許文献3】Nakashima,A., Takaku,H., Shibata,H.S., Negishi,Y., Takagi,M., Tamura,M. and Nashimoto,M. (2007) Gene-silencing by the tRNA maturase tRNase ZL under the direction of small guide RNA. *Gene Therapy*, 14, 78-85.

【非特許文献4】Elbarbary,R.A., Takaku,H., Tamura,M. and Nashimoto,M. (2009) Inhibition of vascular endothelial growth factor expression by TRUE gene silencing. *Biochem.and Biophys. Res. Commun.*, 379, 924-927.

【非特許文献5】Nashimoto,M. (1997) Distribution of both lengths and 5' terminal nucleotides of mammalian pre-tRNA 3' trailers reflects properties of 3' processing endoribonuclease. *Nucleic Acids Res.*, 25, 1148-1155.

【非特許文献6】Takaku,H., Minagawa,A., Masamichi,T. and Nashimoto,M. (2003) A candidate prostate cancer susceptibility gene encodes tRNA 3' processing endoribonuclease. *Nucleic Acids Res.*, 31, 2272-2278.

【非特許文献7】Nashimoto,M. (1995) Conversion of mammalian tRNA 3' processing endoribonuclease to four-base-recognizing RNA cutters. *Nucleic Acids Res.*, 23, 3642-3647.

【非特許文献8】Nashimoto,M. (1996) Specific cleavage of target RNAs from HIV-1 with 5' half tRNA by mammalian tRNA 3' processing endoribonuclease. *RNA*, 2, 2523-2524.

【非特許文献9】Nashimoto,M., Geary,S., Tamura,M. and Kasper,R. (1998) RNA heptamers that directs RNA cleavage by mammalian tRNA 3' processing endoribonuclease. *Nucleic Acids Res.*, 26, 2565-2571.

【非特許文献10】Nashimoto,M. (2000) Anomalous RNA substrates for mammalian tRNA 3' processing endoribonuclease. *FEBS Letters*, 472, 179-186.

【非特許文献11】Takaku,H., Minagawa,A., Takagi,M. and Nashimoto,M. (2004) The N-terminal half-domain of the long form of tRNase Z is required for the RNase 65 activity. *Nucleic Acids Res.*, 32, 4429-4438.

【非特許文献12】Takaku,H., Minagawa,A., Takagi,M. and Nashimoto,M. (2004) A novel four-base-recognizing RNA cutter that can remove the single 3' terminal nuc

10

20

30

40

50

leotides from RNA molecules. *Nucleic Acids Res.*, 32, e91.

【非特許文献 1 3】Shibata,H.S., Takaku,H., Takagi,M. and Nashimoto,M. (2005) The T loop structure is dispensable for substrate recognition by tRNase ZL. *J. Biol. Chem.*, 280, 22326-22334.

【非特許文献 1 4】Appasani,K. (2005) RNA interference technology: from basic science to drug development. Cambridge University Press, Cambridge.

【非特許文献 1 5】Elbarbary,R.A., Takaku,H., Uchiumi,N., Tamiya,H., Abe,M., Takahashi,M., Nishida,H. and Nashimoto,M. (2009) Modulation of gene expression by human cytosolic tRNase ZL through 5'-half-tRNA. *PLoS ONE*, 4, e5908.

【非特許文献 1 6】Elbarbary,R.A., Takaku,H., Uchiumi,N., Tamiya,H., Abe,M., Nishida,H. and Nashimoto,M. (2009) Human cytosolic tRNase ZL can downregulate gene expression through miRNA. *FEBS Lett.*, 583, 3241-3246. 10

【非特許文献 1 7】Hu,W. and Kavanagh,J.J. (2003) Anticancer therapy targeting the apoptotic pathway. *Lancet Oncol.*, 4, 721-729.

【非特許文献 1 8】Loke,S.L., Stein,C.A., Zhang X.H., Mori,K., Nakanishi,M., Subasinghe,C., Cohen,J.S. and Neckers,L.M. (1989) Characterization of oligonucleotide transport into living cells. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 86, 3474-3478.

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】 20

本発明者らによって、ヘプタマー型sg核酸が発がんに関連する遺伝子の発現を効果的に抑制することが示されている。しかしながら、がん治療の観点からは、がん細胞を確実に死滅させる効果が求められる。

【0010】

本発明は、ヒト白血病細胞アポトーシスを確実に誘導することができる新規なヘプタマー型sg核酸を提供することを課題としている。

【課題を解決するための手段】

【0011】

本発明者らは、(A、U、G、C)⁷ = 16,384個もの膨大な数のヘプタマー型スモールガイド核酸から、正常細胞の生存に影響を及ぼすことなく、ヒト白血病細胞のアポトーシスを誘導する15種のヘプタマー型スモールガイド核酸を見出し、本発明を完成させた。すなわち、本発明は、前記の課題を解決するものとして以下の発明を提供する。 30

(1) ヒト白血病細胞のアポトーシスを誘導する、配列番号1から15のいずれかの7塩基配列からなるヘプタマー型スモールガイド核酸。

(2) ヒト白血病細胞のアポトーシスが、3日間で85%以上の細胞死である前記(1)のヘプタマー型スモールガイド核酸。

(3) 前記(1)または(2)に記載のヘプタマー型スモールガイド核酸の1種または2種以上を有効成分として含有する白血病治療薬。

【発明の効果】

【0012】 40

本発明のヘプタマー型sg核酸はいずれも、ヒト白血病細胞のアポトーシス(具体的には、3日間で85%以上のヒト白血病細胞のアポトーシス)を誘導する。これによって効果的な白血病治療手段が提供される。

【図面の簡単な説明】

【0013】

【図1】HL60細胞に無効なsgRNA [Hep3(EGFP)]を導入した場合のフローサイトメトリー実験の結果である。

【図2】HL60細胞にsgRNAを添加しない場合(mock)のフローサイトメトリー実験の結果である。

【図3】HL60細胞にHep1(Bcl-2)(配列番号1)を導入した場合のフローサイトメトリー 50

実験の結果である。

【図4】HL60細胞にHep2(Bcl-2) (配列番号2) を導入した場合のフローサイトメトリー実験の結果である。

【図5】HL60細胞にHep1(MYC) (配列番号4) を導入した場合のフローサイトメトリー実験の結果である。

【図6】HL60細胞にHep8(FGFR3) (配列番号8) を導入した場合のフローサイトメトリー実験の結果である。

【図7】HL60細胞にHep9(FGFR3) (配列番号9) を導入した場合のフローサイトメトリー実験の結果である。

【図8】HL60細胞にHep6 (PRAME) (配列番号14) を導入した場合のフローサイトメトリー実験の結果である。

【図9】HL60細胞にHep7(WT1) (配列番号15) を導入した場合のフローサイトメトリー実験の結果である。

【発明を実施するための形態】

【0014】

本発明のヘプタマー型sg核酸は、表1に示した15種のいずれか一つである。

【0015】

【表1】

配列番号	配列 5'-----3'	名前
1	GGGCCAG	Hep1(bcl-2)
2	GGGGGCG	Hep2(bcl-2)
3	GGGUCCU	Hep5(IRF4)
4	CAGCUCG	Hep1(MYC)
5	GCAGCUC	Hep3(MYC)
6	GUCGUCG	Hep5(MYC)
7	CCGGGGC	Hep2(PKCb)
8	AUCUUCA	Hep8(FGFR3)
9	CACCAGC	Hep9(FGFR3)
10	GCUCUGC	Hep5(PRAME)
11	UCUUUCC	Hep1(HAGE)
12	UAUAUUU	Hep2(HAGE)
13	GCAUGCG	Hep(YW)
14	UCCAGGU	Hep6(PRAME)
15	CUGCUII	Hep7(WT1)

【0016】

表1には各sgRNAの配列を示している。これら15種のヘプタマー型sgRNAは、(A、U、G、C)⁷ = 16,384個のオリゴヌクレオチドから、ヒト白血病細胞のアポトーシス誘導効果を確認して選択されたものである。そのヌクレオチド配列から切断標的となる遺伝子mRNAが想定されるが、標的遺伝子は1つとは限らない。未知の遺伝子を含め、それぞれのオリゴヌクレオチドとアニールする7ヌクレオチド配列を有するmRNAが複数の遺伝子に由来する場合もある。従って、表1における「名前」の括弧内の記号はそれぞれのヘプタマー型sgRNAが切断標的とするmRNAを転写する遺伝子の1例を示したものである。

【0017】

10

20

30

40

50

これらのヘプタマー型sg核酸は、下記実施例に示したように、ヒト白血病細胞の85%以上を3日以内に死滅（アポトーシス）させることができる。

【0018】

これらのヘプタマー型sg核酸は、公知の化学合成を用いる方法、あるいは酵素的転写法等にて製造することができる。公知の化学合成を用いる方法として、ホスホロアミダイト法、ホスフォロチオエート法、ホスホトリエステル法等をあげることができ、例えば、ABI3900ハイスループット核酸合成機（アプライドバイオシステムズ社製）やNTS H-6核酸合成機（日本テクノサービス社製）、Oligoilot10核酸合成機（GEヘルスケア社製）により合成することができる。酵素的転写法としては、目的の塩基配列を有するプラスミドまたはDNAを鋳型として、T7、T3、SP6RNAポリメラーゼ等のRNAポリメラーゼを用いた転写をあげることができる。合成法または転写法により製造したヘプタマー型sg核酸は、次いでHPLC等にて精製する。例えばHPLC精製時には、triethylammonium acetate (TEAA)またはhexylammonium acetate(HAA)とacetonitrileの混合溶液を用いて、ヘプタマー型sg核酸をカラムから溶出する。その後、溶出体積の1000倍量の蒸留水で溶出溶液を10時間透析し、透析溶液を凍結乾燥した後、使用時まで冷凍保存する。使用時には蒸留水で最終濃度が100 μM程度になるように溶解する。

10

【0019】

本発明のヘプタマー型sg核酸に用いられる核酸としては、ヌクレオチドまたはそのヌクレオチドと同等の機能を有する分子が重合した分子であればいかなるものでもよい。ヌクレオチドとしては、例えばリボヌクレオチドの重合体であるRNA、デオキシリボヌクレオチドの重合体であるDNA、RNAおよびDNAが混合した重合体、ヌクレオチド類似体を含むヌクレオチド重合体が、それぞれあげられる。特にRNAが好ましい。

20

【0020】

ヌクレオチド類似体としては、例えばRNAまたはDNAと比較して、ヌクレアーゼ耐性の向上または安定化させるため、相補鎖核酸とのアフィニティーをあげるため、細胞透過性をあげるため、あるいは可視化させるために、リボヌクレオチド、デオキシリボヌクレオチド、RNAまたはDNAに修飾を施した分子を挙げることができる。例えば、糖部修飾ヌクレオチド類似体やリン酸ジエステル結合修飾ヌクレオチド類似体等があげられる。

【0021】

糖部修飾ヌクレオチド類似体とは、ヌクレオチドの糖の化学構造の一部あるいは全てに対し、任意の化学構造物質を付加あるいは置換したものであればいかなるものでもよく、例えば、2'-O-メチルリボースで置換されたヌクレオチド類似体、2'-O-プロピルリボースで置換されたヌクレオチド類似体、2'-メトキシエトキシリボースで置換されたヌクレオチド類似体、2'-O-メトキシエチルリボースで置換されたヌクレオチド類似体、2'-O-[2-(グアニジウム)エチル]リボースで置換されたヌクレオチド類似体、2'-O-フルオロリボースで置換されたヌクレオチド類似体、糖部に架橋構造を導入することにより2つの環状構造を有する架橋構造型人工核酸（Bridged Nucleic Acid）(BNA)、より具体的には、2'位の酸素原子と4'位の炭素原子がメチレンを介して架橋したロックド人工核酸（Locked Nucleic Acid：LNA）、エチレン架橋構造型人工核酸（Ethylene bridged nucleic acid：ENA）[Nucleic Acid Research, 32, e175 (2004)]等があげられ、さらにペプチド核酸（PNA）[Acc. Chem. Res., 32, 624 (1999)]、オキシペプチド核酸（OPNA）[J. Am. Chem. Soc., 123, 4653 (2001)]、およびペプチドリボ核酸（PRNA）[J. Am. Chem. Soc., 122, 6900 (2000)]等をあげることができる。

30

40

【0022】

リン酸ジエステル結合修飾ヌクレオチド類似体としては、ヌクレオチドのリン酸ジエステル結合の化学構造の一部あるいは全てに対し、任意の化学物質を付加あるいは置換したものであればいかなるものでもよく、例えば、ホスフォロチオエート結合に置換されたヌクレオチド類似体、N3'-P5'ホスホアミデート結合に置換されたヌクレオチド類似体等をあげることができる[細胞工学, 16, 1463-1473 (1997)] [RNAi法とアンチセンス法、講談社(2005)]。

50

【0023】

ヌクレオチド類似体としては、その他に、核酸の塩基部分、リボース部分、リン酸ジエステル結合部分等の原子（例えば、水素原子、酸素原子）もしくは官能基（例えば、水酸基、アミノ基）が他の原子（例えば、水素原子、硫黄原子）、官能基（例えば、アミノ基）、もしくは炭素数1～6のアルキル基で置換されたものまたは保護基（例えばメチル基またはアシル基）で保護されたもの、核酸に、例えば脂質、リン脂質、フェナジン、フォレート、フェナントリジン、アントラキノン、アクリジン、フルオレセイン、ローダミン、クマリン、色素など、別の化学物質を付加した分子等を用いてもよい。

【0024】

核酸に別の化学物質を付加した分子としては、例えば、5' - ポリアミン付加誘導体、コレステロール付加誘導体、ステロイド付加誘導体、胆汁酸付加誘導体、ビタミン付加誘導体、Cy5付加誘導体、Cy3付加誘導体、6 - FAM付加誘導体、およびビオチン付加誘導体等をあげることができる。

10

【0025】

本発明のがん治療薬は、本発明のヘプタマー型sg核酸の1種または2種以上を含有する。2種以上のヘプタマー型sg核酸は任意の組み合わせで使用することができる。すなわち、本発明のヘプタマー型sg核酸はそれぞれ単独で、白血病細胞の生存に必要な遺伝子mRNAに対するTRUEジーンサイレンシングによって白血病細胞のアポトーシスを誘導することができる。この場合、各ヘプタマー型sg核酸は、それぞれ異なる標的遺伝子mRNAを切断しているか、同一の標的遺伝子mRNAの異なる箇所を切断している。従って、2種以上のヘプタマー型sg核酸を組み合わせることによって、白血病細胞の生存に必要な2種以上の遺伝子mRNAに対するTRUEジーンサイレンシングが可能となり、効果的な白血病細胞アポトーシスを誘導することができる。あるいは同一の標的遺伝子mRNAでも別の箇所を切断するものを組み合わせることによって白血病細胞のアポトーシスを効果的に誘導することができる。

20

【0026】

ヘプタマー型sg核酸はそれ単独で製剤化することもできるが、通常は薬理的に許容される1つあるいはそれ以上の担体と一緒に混合し、製剤学の技術分野においてよく知られる任意の方法により製造した医薬製剤として投与するのが望ましい。

【0027】

投与経路は、治療に際し最も効果的なものを使用するのが望ましく、経口投与、または口腔内、気道内、直腸内、皮下、筋肉内および静脈内などの非経口投与をあげることができ、望ましくは静脈内投与をあげることができる。

30

【0028】

経口投与に適切な製剤としては、乳剤、シロップ剤、カプセル剤、錠剤、散剤、顆粒剤などがあげられる。乳剤およびシロップ剤のような液体調製物は、水、ショ糖、ソルビトール、果糖などの糖類、ポリエチレングリコール、プロピレングリコールなどのグリコール類、ごま油、オリーブ油、大豆油などの油類、p-ヒドロキシ安息香酸エステル類などの防腐剤、ストロベリーフレーバー、ペパーミントなどのフレーバー類などを添加剤として用いて製造できる。カプセル剤、錠剤、散剤、顆粒剤などは、乳糖、ブドウ糖、ショ糖、マンニトールなどの賦形剤、デンプン、アルギン酸ナトリウムなどの崩壊剤、ステアリン酸マグネシウム、タルクなどの滑沢剤、ポリビニルアルコール、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチンなどの結合剤、脂肪酸エステルなどの界面活性剤、グリセリンなどの可塑剤などを添加剤として用いて製造できる。

40

【0029】

非経口投与に適切な製剤としては、注射剤、座剤、噴霧剤などがあげられる。注射剤は、塩溶液、ブドウ糖溶液あるいは両者の混合物からなる担体などを用いて調製される。座剤はカカオ脂、水素化脂肪またはカルボン酸などの担体を用いて調製される。また、噴霧剤は受容者の口腔および気道粘膜を刺激せず、かつ有効成分を微細な粒子として分散させ吸収を容易にさせる担体などを用いて調製される。

50

【0030】

担体として具体的には乳糖、グリセリンなどが例示される。本発明で用いる核酸、さらには用いる担体の性質により、エアロゾル、ドライパウダーなどの製剤が可能である。また、これらの非経口剤においても経口剤で添加剤として例示した成分を添加することもできる。

【0031】

投与量または投与回数は、目的とする治療効果、投与方法、治療期間、年齢、体重などにより異なるが、通常成人1日当たり10 µg/kg ~ 20 mg/kgである。

【0032】

以下、実施例を示して本発明をさらに詳細かつ具体的に説明するが、本発明は以下の例に限定されるものではない。

【実施例1】

【0033】

(1) 方法

(1-1) ヘプタマー型sgRNAの合成

表1に示した15種のヘプタマー型sgRNA(配列番号1-15)を化学合成機にて合成した。

【0034】

各sgRNAは、5'末端および3'末端がリン酸化され、かつ2'-O-メチル化されている。合成後、各sgRNAはHPLCにて精製した。精製時には、hexylammonium acetate (HAA)とacetonitrileの混合溶液を用いて、合成sgRNAをカラムから溶出した。その後、溶出体積の100倍量の蒸留水で溶出溶液を10時間透析し、透析した溶液は凍結乾燥した後、使用時まで冷凍保存した。使用時に蒸留水で最終濃度が100 µMになるように溶解し、残りの溶液は冷凍保存した。

(1-2) MTTアッセイ

ヒトがん細胞株(1000個/100 µl培地)の入った96ウェル培養プレートに、細胞内導入試薬なしで各sgRNA(最終濃度1 µM)を加え、37°CのCO₂インキュベーターにて培養した。72時間後MTT試薬(テトラカラーワン6 µl、生化学バイオビジネス(株))を加え、3時間後と6時間後に分光光度計で450 nmの吸光度を測定することにより生細胞数の定量(triplicateの平均値として表示)を行なった。ヒトがん細胞株は、白血病細胞HL60、骨髄腫細胞KMM1およびRPMI-8226を使用し、生細胞数をsgRNA非投与群と比較した。また対照として正常細胞HEK293に対して各sgRNAを導入し、同様のMTTアッセイを行なった。

(1-3) フローサイトメトリー実験

ヒトがん細胞株(1000個/100 µl培地)の入った96ウェル培養プレートに、細胞内導入試薬なしでsgRNA(最終濃度1 µM)を加え、37°CのCO₂インキュベーターにて培養した。72時間後、細胞を室温にて15分間phycoerythrin-conjugated Annexin V (BD Pharmingen)および7-AAD (Sigma)により染色し、フローサイトメーター(FACSCalibur)を用いて解析した。

(1-4) マウスゼノグラフト実験

免疫不全マウスであるヌードマウスの皮下に、 2×10^6 個のヒト白血病細胞HL60を細胞外マトリクスと共に移植した。この移植部位に、各ヘプタマー型sgRNA(100 µM)を10 µl毎日1回(連続5日間)投与し、腫瘍の体積を毎日測定した。腫瘍体積が1500 mm³に達した時点で安楽死させた。グループあたり6から8匹のマウスを用いて実験を行い、各sgRNA投与グループの生存日数の中央値と非投与(あるいは効果のないヘプタマー型sgRNA投与)グループの生存日数の中央値の差をヘプタマー型sgRNAによる余命の延長日数とした。

(2) 結果

(2-1) MTTアッセイ

結果は表2に示したとおりである。配列番号1-15のヘプタマー型sgRNAは、ヒト白血病細胞株HL60の85%以上を3日間で死滅させた。また、配列番号8、9のヘプタマー型s

10

20

30

40

50

gRNAは、ヒト白血病細胞のほか、ヒト骨髄腫細胞株KMM1およびRPMI-8226の75%以上を3日間で死滅させた。さらに、配列番号6、12のヘプタマー型sg核酸は骨髄腫細胞株KMM1の72%を、配列番号7のヘプタマー型sg核酸は骨髄腫細胞株RPMI-8226の75%を3日間で死滅させた。従って、これらKMM1細胞やRPMI-8226細胞に対してアポトーシス誘導効果を有するヘプタマー型sg核酸はヒト骨髄腫の治療にも使用することができる。なお、全てのヘプタマー型sg核酸で正常細胞HEK293の死滅率は0%であった。

【0035】

【表2】

配列番号	配列 5'-----3'	名前	MTTアッセイ(生細胞数の減少率)			マウスゼノグラフト実験 (余命延長日数)
			HL60	KMM1	RPMI	
1	GGGCCAG	Hep1(bcl-2)	88%	0%	18%	HL60(+22日)
2	GGGGGCG	Hep2(bcl-2)	99%	24%	69%	HL60(+19日)
3	GGGUCCU	Hep5(IRF4)	86%	69%	6%	
4	CAGCUCG	Hep1(MYC)	90%	56%	16%	
5	GCAGCUC	Hep3(MYC)	90%	67%	2%	
6	GCUCUG	Hep5(MYC)	86%	72%	0%	
7	CCGGGGC	Hep2(PKCb)	93%	48%	75%	
8	AUCUUCA	Hep8(FGFR3)	87%	78%	76%	HL60(+10日)
9	CACCAGC	Hep9(FGFR3)	95%	79%	76%	HL60(+6日)
10	GCUCUGC	Hep5(PRAME)	94%	17%	54%	
11	UCUUUCC	Hep1(HAGE)	91%	61%	5%	
12	UAUAUUU	Hep2(HAGE)	94%	72%	5%	
13	GCAUGCG	Hep(YW)	96%	59%	0%	
14	UCCAGGU	Hep6(PRAME)	95%	15%	10%	
15	CUGCUUU	Hep7(WT1)	98%	24%	46%	

【0036】

(2-2) フローサイトメトリー実験

結果は図1-9に示したとおりである。試験したヘプタマー型sgRNAは、効果のないヘプタマー型sgRNA [(Hep3(EGFP)) およびsgRNA無添加 (mock)] に比べ、遙かに多くの細胞のアポトーシスを誘導することが確認された。

(2-3) マウスゼノグラフト実験

結果は表2に示したとおりである。試験したヘプタマー型sgRNAは少なくとも6日、最大で22日間もHL60細胞移植マウスを延命させた。

【0037】

以上の結果から、本発明のヘプタマー型sg核酸は、ヒト白血病細胞のアポトーシスを有効に誘導させること、またこのアポトーシスの誘導により白血病細胞を有する動物個体を延命させることが可能であることが確認された。

【産業上の利用可能性】

【0038】

本発明によって、ヒト白血病に対する有効な治療法が提供される。

10


20

30

40

【 図 1 】

Hep3(EGFP)




Quadrant Statistics

File: 10.HL60N2.HepEGFP.D10 Log Data Units: Linear Values
 Sample ID: 09.HL60N2.HepEGFP Patient ID:
 Tube: Panel:
 Acquisition Date: 05-Jun-09 Gate: No Gate
 Gated Events: 10000 Total Events: 10000
 X Parameter: Annexin V-PE (Log) Y Parameter: 7AAD (Log)
 Quad Location: 19, 13

Quad	Events	% Gated	% Total	X Mean	X Geo Mean	Y Mean	Y Geo Mean
UL	38	0.38	0.38	4.49	3.32	30.78	22.35
UR	156	1.56	1.56	500.40	337.42	124.07	68.04
LL	9750	97.50	97.50	3.94	3.64	3.27	3.04
LR	56	0.56	0.56	304.97	97.79	4.70	3.70

【 図 2 】

mock




Quadrant Statistics

File: 01.HL60.mock.001 Log Data Units: Linear Values
 Sample ID: 01.HL60.mock Patient ID:
 Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
 Acquisition Date: 01-Feb-10 Gate: No Gate
 Gated Events: 10000 Total Events: 10000
 X Parameter: Annexin V-PE (Log) Y Parameter: 7-AAD (Log)
 Quad Location: 18, 87

Quad	Events	% Gated	% Total	X Mean	X Geo Mean	Y Mean	Y Geo Mean
UL	0	0.00	0.00	***	***	***	***
UR	352	3.52	3.52	204.25	152.51	450.64	359.83
LL	9571	95.71	95.71	4.48	4.27	3.87	3.66
LR	77	0.77	0.77	141.57	92.49	24.36	10.86

【 図 3 】

Hep1(Bcl-2)




Quadrant Statistics

File: 06.HL60fromN.HepBcl2.006 Log Data Units: Linear Values
 Sample ID: 06.HL60fromN.HepBcl2 Patient ID:
 Tube: Panel:
 Acquisition Date: 11-May-09 Gate: No Gate
 Gated Events: 18047 Total Events: 18047
 X Parameter: Annexin V-PE (Log) Y Parameter: 7AAD (Log)
 Quad Location: 33, 110

Quad	Events	% Gated	% Total	X Mean	X Geo Mean	Y Mean	Y Geo Mean
UL	85	0.47	0.47	16.07	9.61	221.04	210.81
UR	1775	9.84	9.84	351.83	244.37	255.61	233.18
LL	11441	63.40	63.40	8.06	7.00	3.62	3.10
LR	4746	26.30	26.30	260.27	212.94	31.16	25.06

【 4 】

Hep2(Bcl-2)




Quadrant Statistics

File: 03.HL60.Hep2(Bcl-2).003 Log Data Units: Linear Values
 Sample ID: 03.HL60.Hep2(Bcl-2) Patient ID:
 Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
 Acquisition Date: 01-Feb-10 Gate: No Gate
 Gated Events: 2775 Total Events: 2775
 X Parameter: Annexin-V PE (Log) Y Parameter: 7-AAD (Log)
 Quad Location: 18, 87

Quad	Events	% Gated	% Total	X Mean	X Geo Mean	Y Mean	Y Geo Mean
UL	0	0.00	0.00	***	***	***	***
UR	1040	37.48	37.48	330.17	287.41	187.07	173.11
LL	142	5.12	5.12	8.10	4.83	5.49	4.32
LR	1593	57.41	57.41	201.04	144.48	24.16	10.82

【 5 】

Hep1(MYC)




Quadrant Statistics

File: 11.HL80N2.HepMyc1.011 Log Data Units: Linear Values
 Sample ID: 11.HL80N2.HepMyc1 Patient ID:
 Tube: Panel:
 Acquisition Date: 05-Jun-09 Gate: No Gate
 Gated Events: 10000 Total Events: 10000
 X Parameter: Annexin V-PE (Log) Y Parameter: 7AAD (Log)
 Quad Location: 19, 13

Quad	Events	% Gated	% Total	X Mean	X Geo Mean	Y Mean	Y Geo Mean
UL	40	0.40	0.40	8.18	5.08	66.11	35.81
UR	662	6.62	6.62	418.27	315.37	109.33	73.48
LL	9214	92.14	92.14	4.12	3.81	3.28	3.05
LR	84	0.84	0.84	189.88	74.70	5.04	4.06

【 6 】

Hep8(FGFR3)




Quadrant Statistics

File: 04.HL60.Hep8(FGFR3).005 Log Data Units: Linear Values
 Sample ID: 05.HL60.Hep8(FGFR3) Patient ID:
 Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
 Acquisition Date: 21-Jan-10 Gate: No Gate
 Gated Events: 2820 Total Events: 2820
 X Parameter: annexin-V PE (Log) Y Parameter: 7-AAD (Log)
 Quad Location: 19, 155

Quad	Events	% Gated	% Total	X Mean	X Geo Mean	Y Mean	Y Geo Mean
UL	0	0.00	0.00	***	***	***	***
UR	353	12.52	12.52	515.80	396.55	308.43	277.74
LL	804	28.51	28.51	7.59	6.29	7.33	6.25
LR	1663	58.97	58.97	456.42	352.61	35.11	15.41

【 図 7 】

Hep9(FGFR3)



Quadrant Statistics


File: 05.HL60.Hep9(FGFR3).004
 Sample ID: 04.HL60.Hep8(FGFR3)
 Tube: Untitled
 Acquisition Date: 21-Jan-10
 Gated Events: 1125
 X Parameter: annexin-V PE (Log)
 Quad Location: 19, 155

Log Data Units: Linear Values
 Patient ID:
 Panel: Untitled Acquisition Tube List
 Gate: No Gate
 Total Events: 1125
 Y Parameter: 7-AAD (Log)

Quad	Events	% Gated	% Total	X Mean	X Geo Mean	Y Mean	Y Geo Mean
UL	0	0.00	0.00	***	***	***	***
UR	75	6.67	6.67	584.14	522.61	235.86	223.93
LL	73	6.49	6.49	4.88	3.05	4.88	3.32
LR	977	86.84	86.84	390.72	312.89	41.25	23.33

【 図 8 】

Hep6(PRAME)



Quadrant Statistics


File: 08.HL60.PRAMEc2.008
 Sample ID: 08.HL60.PRAMEc2
 Tube: Untitled
 Acquisition Date: 17-Oct-10
 Gated Events: 8700
 X Parameter: Annexin V-PE (Log)
 Quad Location: 11, 73

Log Data Units: Linear Values
 Patient ID:
 Panel: Untitled Acquisition Tube List
 Gate: No Gate
 Total Events: 8700
 Y Parameter: 7AAD (Log)

Quad	Events	% Gated	% Total	X Mean	X Geo Mean	Y Mean	Y Geo Mean
UL	0	0.00	0.00	***	***	***	***
UR	2338	26.85	26.85	232.47	179.98	300.71	233.45
LL	5578	64.11	64.11	3.93	3.64	3.44	3.18
LR	786	9.03	9.03	128.83	82.12	15.57	6.70

【 図 9 】

Hep7(WT1)



Quadrant Statistics

File: 16.HL60.WT1c2(O).016
 Sample ID: 16.HL60.WT1c2(O)
 Tube: Untitled
 Acquisition Date: 23-Jul-10
 Gated Events: 960
 X Parameter: Annexin V-PE (Log)
 Quad Location: 7, 79

Log Data Units: Linear Values
 Patient ID:
 Panel: Untitled Acquisition Tube List
 Gate: No Gate
 Total Events: 960
 Y Parameter: 7AAD (Log)

Quad	Events	% Gated	% Total	X Mean	X Geo Mean	Y Mean	Y Geo Mean
UL	0	0.00	0.00	***	***	***	***
UR	88	9.17	9.17	143.43	114.42	142.70	134.19
LL	215	22.40	22.40	3.69	3.21	3.74	3.17
LR	657	68.44	68.44	133.33	92.21	20.58	11.80

【 配列表 】

2013031704000001.app

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/071503

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER C12N15/113(2010.01)i, A61K31/7105(2006.01)i, A61P35/02(2006.01)i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C12N15/113, A61K31/7105, A61P35/02		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2012 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2012 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2012		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CA/BIOSIS/MEDLINE/REGISTRY (STN), JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamII), WPI		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X/Y/A	Hiroaki TAKAHISA, Masayuki NASHIMOTO, "trNase Z to TRUE gene silencing Koritsuteki na mRNA Hatsugen Yokusei ni Yakudatsu tRNA Zenkutai Setsudan Koso to sono Seitainai deno Yakuwari", Kagaku to Seibutsu, 01 March 2011 (01.03.2011), vol.49, no.3, pages 150 to 152, page 150, right column, line 9 to page 151, left column, line 9, page 152, left column, lines 9 to 14, fig. 2	1, 2/1, 2/3
Y/A	TAKAHASHI, Masayuki et al., TRUE Gene Silencing: Finding Blood Cancer Therapeutic sgRNAs, The 16th Annual Meeting of the RNA Society and The 13th Annual Meeting of the RNA Society of Japan, RNA 2011, 2011.06.29(received date), pages 84, 167, lines 6, 7, 9 to 14	1, 2/3
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents:		
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T"
"E"	earlier application or patent but published on or after the international filing date	"X"
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y"
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&"
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	
Date of the actual completion of the international search 12 September, 2012 (12.09.12)		Date of mailing of the international search report 25 September, 2012 (25.09.12)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/071503

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y/A	WO 2004/024314 A2 (EXIQON A/S), 25 March 2004 (25.03.2004), page 8, lines 24 to 29; page 61, line 31 to page 62, line 22 & US 2006/0147924 A1 & EP 1546404 A2 & EP 1882748 A2 & AU 2003260292 A	1, 2/3
Y/A	JP 2001-501479 A (Brax Group Ltd.), 06 February 2001 (06.02.2001), claims & US 6500615 B1 & EP 956366 A1 & WO 1998/015651 A1 & AU 4565297 A & NZ 334987 A & CA 2267524 A & AU 732121 B & CN 1232510 A	1, 2/3
Y/A	JP 2011-024434 A (Galaxy Pharma Inc.), 10 February 2011 (10.02.2011), claims & WO 2011/010583 A1	1, 2/3
P,X	SANO, Takako et al., Expanding the utility of heptamer-type sgRNA for TRUE gene silencing, Biochem. Biophys. Res. Commun., 2011.12.16, Vol. 416, p. 427-432	1-3
A	TAMURA, Masato et al., Intracellular mRNA cleavage by 3' tRNase under the direction of 2'-O-methyl RNA heptamers, Nucleic Acids Res., 2003, Vol. 31, No. 15, p. 4354-4360	1-3
A	Masayuki TAKAHASHI et al., "Hito Bcl-2 mRNA o Hyoteki to suru Hadaka no RNA heptamer ni yoru Apoptosis no Yudo", Dai 11 Kai The RNA Society of Japan Nenkai (Dai 11 Kai RNA Meeting) Yoshishu, 27 July 2009 (27.07.2009), page 106. O-53	1-3
A	Akie YAMAHIRA et al., "Gan Idenshi small guide (sg) RNA o Mochiita Zoketsuki Shuyo Saibo no Apoptosis Yudo", Dai 11 Kai The RNA Society of Japan Nenkai (Dai 11 Kai RNA Meeting) Yoshishu, 27 July 2009 (27.07.2009), page 198, P-88	1-3
A	Akie YAMAHIRA et al., "Inhibition of WT1 protein expression in leukemic cell line by using small guide RNA", Niigata University Igakubu Hoken Gakka Kiyu, 2010, vol.9, no.3, pages 51 to 56	1-3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/071503

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of Item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

Claim 1 describes 15 nucleic acids, including a heptamer-type small guide nucleic acid that comprises a nucleotide sequence composed of 7 nucleotides and represented by SEQ ID NO: 1 and a heptamer-type small guide nucleic acid that comprises a nucleotide sequence composed of 7 nucleotides and represented by SEQ ID NO: 2.

Although the nucleic acids share a common property or activity of inducing the apoptosis of a human leukemia cell, the nucleic acids do not share any common structure. Therefore, the inventions described in claim 1 do not have the same or corresponding special technical feature.

(Continued to extra sheet)

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/071503

Continuation of Box No.III of continuation of first sheet(2)

The following fifteen inventions (invention groups) are involved in claims.

In the inventions described in claims 1-3, a part which relates to SEQ ID NO: 1 (Invention 1); a part which relates to SEQ ID NO: 2 (Invention 2); a part which relates to SEQ ID NO: 3 (Invention 3); a part which relates to SEQ ID NO: 4 (Invention 4); a part which relates to SEQ ID NO: 5 (Invention 5); a part which relates to SEQ ID NO: 6 (Invention 6); a part which relates to SEQ ID NO: 7 (Invention 7); a part which relates to SEQ ID NO: 8 (Invention 8); a part which relates to SEQ ID NO: 9 (Invention 9); a part which relates to SEQ ID NO: 10 (Invention 10); a part which relates to SEQ ID NO: 11 (Invention 11); a part which relates to SEQ ID NO: 12 (Invention 12); a part which relates to SEQ ID NO: 13 (Invention 13); a part which relates to SEQ ID NO: 14 (Invention 14); and a part which relates to SEQ ID NO: 15 (Invention 15).

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2012/071503									
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. C12N15/113(2010.01)i, A61K31/7105(2006.01)i, A61P35/02(2006.01)i											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. C12N15/113, A61K31/7105, A61P35/02											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2012年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2012年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2012年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2012年	日本国実用新案登録公報	1996-2012年	日本国登録実用新案公報	1994-2012年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2012年										
日本国実用新案登録公報	1996-2012年										
日本国登録実用新案公報	1994-2012年										
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CA/BIOSIS/MEDLINE/REGISTRY (STN), JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamII), WPI											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
X/Y/A	高久洋暁、梨本正之, tRNase Z と TRUE gene silencing 効率的な mRNA 発現抑制に役立つ tRNA 前駆体切断酵素とその生体内での役割, 化学と生物, 2011.03.01, Vol. 49, No. 3, p. 150-152, 第150頁右欄第9行-第151頁左欄第9行、第152頁左欄第9-14行、図2	1、2/1、 2/3									
Y/A	TAKAHASHI, Masayuki et al., TRUE Gene Silencing: Finding Blood Cancer Therapeutic sgrNAs, The 16th Annual Meeting of the RNA Society and The 13th Annual Meeting of the RNA Society of Japan,	1、2/3									
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。											
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献									
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの									
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの									
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)		「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの									
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」同一パテントファミリー文献									
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願											
国際調査を完了した日 12.09.2012		国際調査報告の発送日 25.09.2012									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 小倉 梢	4 B 4504								
		電話番号 03-3581-1101 内線 3448									

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 2 / 0 7 1 5 0 3
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
	RNA 2011, 2011.06.29 (受入日) , p. 84, 167, 第6、7行、第9 - 14行	
Y/A	WO 2004/024314 A2 (EXIQON A/S) 2004.03.25, 第8頁第24-29 行、第61頁第31行-第62頁第22行 & US 2006/0147924 A1 & EP 1546404 A2 & EP 1882748 A2 & AU 2003260292 A	1、2/3
Y/A	JP 2001-501479 A (ブラックス グループ リミテッド) 2001.02.06, 特許請求の範囲 & US 6500615 B1 & EP 956366 A1 & WO 1998/015651 A1 & AU 4565297 A & NZ 334987 A & CA 2267524 A & AU 732121 B & CN 1232510 A	1、2/3
Y/A	JP 2011-024434 A (株式会社 Galaxy Pharma) 2011.02.10, 特許請求の範囲 & WO 2011/010583 A1	1、2/3
P, X	SANO, Takako et al., Expanding the utility of heptamer-type sgRNA for TRUE gene silencing, Biochem. Biophys. Res. Commun., 2011.12.16, Vol. 416, p. 427-432	1-3
A	TAMURA, Masato et al., Intracellular mRNA cleavage by 3' tRNase under the direction of 2'-O-methyl RNA heptamers, Nucleic Acids Res., 2003, Vol. 31, No. 15, p. 4354-4360	1-3
A	高橋昌幸他, ヒト Bcl-2 mRNA を標的とする裸の RNA heptamer によ るアポトーシスの誘導, 第11回日本 RNA 学会年会 (第11回 RNA ミ ーティング) 要旨集, 2009.07.27, p. 106. 0-53	1-3
A	山平晶恵他, 癌遺伝子 small guide (sg) RNA を用いた造血器腫瘍細 胞のアポトーシス誘導, 第11回日本 RNA 学会年会 (第11回 RNA ミ ーティング) 要旨集, 2009.07.27, p. 198, P-88	1-3
A	山平晶恵他, small guide RNA を用いた白血病細胞株における WT1 タンパク発現の抑制, 新潟大学医学部保健学科紀要, 2010, Vol. 9, No. 3, p. 51-56	1-3

国際調査報告

国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 2 / 0 7 1 5 0 3

第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. 請求項 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. 請求項 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. 請求項 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第III欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるところの国際調査機関は認めた。

請求項1には、配列番号1の7塩基配列からなるヘプタマー型スモールガイド核酸、配列番号2の7塩基配列からなるヘプタマー型スモールガイド核酸等の15の核酸が記載されている。各核酸は、ヒト白血病細胞のアポトーシスを誘導するという共通の性質又は活性を有するものの、共通の構造を共有していないから、請求項1に係る各発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しない。そして、請求の範囲には以下に示す15の発明(群)が含まれる。

(特別ページに続く)

1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求項について作成した。
2. 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求項について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求項のみについて作成した。
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求項について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、出願人から異議申立てがあった。
- 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあったが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間内に支払われなかった。
- 追加調査手数料の納付はあったが、異議申立てはなかった。

様式PCT/ISA/210 (第1ページの続葉(2)) (2009年7月)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2012/071503

請求項1-3に係る発明のうち、配列番号1に関するもの(発明1)、配列番号2に関するもの(発明2)、配列番号3に関するもの(発明3)、配列番号4に関するもの(発明4)、配列番号5に関するもの(発明5)、配列番号6に関するもの(発明6)、配列番号7に関するもの(発明7)、配列番号8に関するもの(発明8)、配列番号9に関するもの(発明9)、配列番号10に関するもの(発明10)、配列番号11に関するもの(発明11)、配列番号12に関するもの(発明12)、配列番号13に関するもの(発明13)、配列番号14に関するもの(発明14)、及び、配列番号15に関するもの(発明15)。

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN

(72)発明者 高橋 益廣

新潟県新潟市中央区旭町通2番町746番地 国立大学法人新潟大学医学部保健学科内

(72)発明者 成田 美和子

新潟県新潟市中央区旭町通2番町746番地 国立大学法人新潟大学医学部保健学科内

(72)発明者 吉田 哲郎

東京都町田市旭町3丁目6番6号 協和発酵キリン株式会社 バイオ医薬研究所内

(72)発明者 宮澤 達也

東京都町田市旭町3丁目6番6号 協和発酵キリン株式会社 バイオ医薬研究所内

Fターム(参考) 4B024 AA01 BA80 CA11 DA02 DA03 GA11 HA17

4C086 AA01 AA02 EA16 MA01 MA04 NA14 ZB21 ZB27

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。