

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2010-187636

(P2010-187636A)

(43) 公開日 平成22年9月2日(2010.9.2)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>C 1 2 N 15/09 (2006.01)</b>	C 1 2 N 15/00 Z N A A	4 B O 2 4
<b>C 1 2 Q 1/68 (2006.01)</b>	C 1 2 Q 1/68 A	4 B O 6 3

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号	特願2009-38007 (P2009-38007)	(71) 出願人	504132272 国立大学法人京都大学 京都府京都市左京区吉田本町36番地1
(22) 出願日	平成21年2月20日 (2009.2.20)	(71) 出願人	507305428 ビッグ研究所株式会社 滋賀県大津市南郷2丁目36番6号
		(71) 出願人	593028562 社団法人 家畜改良事業団 東京都中央区京橋1-19-8
		(71) 出願人	000229519 日本ハム株式会社 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ウシ脂肪交雑形成に関わる一塩基多型およびその利用

(57) 【要約】

【課題】ウシの脂肪交雑形成能力を遺伝子型解析により判定するウシの脂肪交雑形成能力の予測、遺伝子型判定方法およびそれに使用するキットを提供する。

【解決手段】ウシのR P L 2 7 遺伝子の第1エキソン開始点から - 7 2 7 2 b p 部位におけるSNPタイプをPCR-RFLPで分析することによりウシの脂肪交雑形成能力の予測、遺伝子型を判定する。

【選択図】なし

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

ウシの R P L 2 7 A 遺伝子であって、第 1 エキソン開始点から - 7 2 7 2 b p 部位の塩基が C / T ホモまたはヘテロ型であるウシの脂肪交雑形成能力に關与する遺伝子多型。

## 【請求項 2】

ウシの R P L 2 7 A 遺伝子の第 1 エキソン開始点から - 7 2 7 2 b p 部位における一塩基多型 ( S N P ) タイプを判定することを特徴とするウシの脂肪交雑形成能力の予測、遺伝子型判定方法。

## 【請求項 3】

S N P タイプの判定を制限酵素断片長多型 ( R F L P ) 分析により行う請求項 2 記載の方法。

10

## 【請求項 4】

ウシの R P L 2 7 A 遺伝子の第 1 エキソン開始点から - 7 2 7 2 b p 部位を含む領域を増幅するプライマーを含む請求項 2 記載の方法によるウシの脂肪交雑形成能力の予測、遺伝子型判定用キット。

## 【請求項 5】

さらに、制限酵素を含む請求項 4 記載のキット。

## 【請求項 6】

配列番号 2 および配列番号 3 に示す配列からなるウシの R P L 2 7 A 遺伝子の第 1 エキソン開始点から - 7 2 7 2 b p 部位を含む領域を増幅するプライマー。

20

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、ウシ脂肪交雑形成に関わる一塩基多型 ( S N P ) およびその利用に関する。さらに詳しくは、ウシ脂肪交雑形成に関わる新規な S N P に基づいてウシの遺伝子型を判定し、ウシの脂肪交雑形成能力を予測する方法およびキットに関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

「霜降り」や「サシ」と称されるウシの脂肪交雑は牛肉の肉質を評価、判定する上で重要な因子であり、脂肪交雑形成能力の高い個体とそうでない個体をウシの肥育の早期に判別し、それらの能力に合った肥育計画を立てることができれば、肉用牛の生産において非常に望ましい。さらに、その能力を早期に判定できれば、世代間隔を短縮することができ、育種改良に多大の貢献をする。

30

このような事情に鑑み、ウシの脂肪交雑形成能力を遺伝子型解析により判定すべく、従来から、ウシの脂肪交雑形成に關与する責任遺伝子の探索、同定が試みられている。例えば、特許文献 1 ではウシの脂肪細胞分化のマスターキーといわれているウシ P P A R 遺伝子の 1 つであるウシ P P A R 2 の変異体が開示されている。

また、ウシの脂肪交雑形成に影響する遺伝子を特定することを目的として、系統的に脂肪交雑形成能力の異なることが判明しているウシ群間で、脂肪交雑形成が始まる前後 8 ~ 1 4 ヶ月齢の時期に発現する m R N A 量を調べ、配列既知の 5 つの候補遺伝子を選抜した報告 (平成 1 7 年 3 月 2 7 日 ~ 2 9 日開催の日本畜産学会第 1 0 4 回大会発表) や、これらの遺伝子のゲノム配列を決定し、いくつかの遺伝子において一塩基多型 ( S N P ) が存在するとの報告 (平成 1 7 年 9 月 1 1 日、1 2 日開催の日本動物遺伝育種学会第 6 回大会ポスター発表) がある。

40

このように、ウシの脂肪交雑に影響する遺伝子の同定は試みられているが、脂肪交雑形成能力と統計的に有意な相関を示した遺伝子多型を同定した例は、これまで見当たらない。

本発明者らの発明に係る特許文献 2 には、血管伸長に関連すると推測されるウシ E D G 1 遺伝子の + 1 6 6 b p 部位と、+ 3 6 9 8 b p 部位に S N P が存在し、それらが統計的にウシの脂肪交雑形成と相関し、ウシの脂肪交雑形成能力の予測、遺伝子型判定に利用で

50

ることが開示されている。

さらに、本発明者らは、ウシEDG1遺伝子の他の部位、ウシTTN遺伝子の一部位、ウシMBL1遺伝子の一部位にもSNPが存在し、それらが統計的にウシの脂肪交雑形成と相関し、ウシの脂肪交雑形成能力の予測、遺伝子型判定に利用できることを見出し、特許出願した(特願2007-235628号)。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2001-8688号公報

【特許文献2】特開2007-252271号公報

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

本発明の主な目的は、新たなSNPを見出し、ウシの脂肪交雑形成能力を遺伝子型解析により判別するウシの脂肪交雑形成能力の予測、遺伝子型判定方法およびそれに使用するキットを提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0005】

上記のごとく、本発明者らは、これまでにウシ遺伝子の中で脂肪交雑形成に影響するSNPを3つの遺伝子で計4部位同定し、相関解析によりこの遺伝子多型がウシの脂肪交雑能力に関与することを明らかにしてきたが、今回新たにウシのRPL27A遺伝子(GenBank NW\_001495105)で脂肪交雑形成に関わるマーカーと考えられるSNPを見出し、本発明を完成するに至った。

20

【0006】

すなわち、本発明は、

(1)ウシのRPL27A遺伝子であって、第1エキソン開始点から-7272bp部位の塩基がC/Tホモまたはヘテロ型であるウシの脂肪交雑形成能力に関与する遺伝子多型、

(2)ウシのRPL27A遺伝子の第1エキソン開始点から-7272bp部位におけるSNPタイプを判定することを特徴とするウシの脂肪交雑形成能力の予測、遺伝子型判定方法、

30

(3)SNPタイプの判定を制限酵素断片長多型(RFLP)分析により行う上記(2)記載の方法、

(4)ウシのRPL27A遺伝子の第1エキソン開始点から-7272bp部位を含む領域を増幅するプライマーを含む上記(2)記載の方法によるウシの脂肪交雑形成能力の予測、遺伝子型判定用キット、

(5)さらに、制限酵素を含む上記(4)記載のキット、

(6)配列番号2および配列番号3に示す配列からなるウシのRPL27A遺伝子の第1エキソン開始点から-7272bp部位を含む領域を増幅するプライマーなどを提供するものである。

40

【発明の効果】

【0007】

本発明の方法により、上記の新規SNP部位についてSNPタイプを判定することにより、遺伝子型が判定でき、それに基づいて脂肪交雑形成能力が予測できる。

以下の実施例に示すごとく、黒毛和種雄牛101頭について、肉の脂肪交雑度が高い(評点が高い)上位17頭のグループと、交雑度が低い(評点が高い)下位17頭のグループとで、遺伝子のSNPと脂肪交雑度合いとの相関を独立性検定により解析したところ、RPL27A遺伝子の第1エキソン開始点から-7272bp部位の塩基(以下、RP-7272と称する)がTアリルである場合とCアリルである場合とでは、<sup>2</sup>検定で危険率0.01%以下という相関でTアリルの方が脂肪交雑に関する遺伝的能力すなわち育

50

種価が高かった。次に、種雄牛101頭全てを使った分散分析を行ったところ、危険率0.02%でやはりTアリルの方が有意に育種価が高いことが示された。さらに、このSNP部位がTTホモである系福の後代半きょうだい肥育牛217頭(TT型、CT型の遺伝子型を持つ)について解析したところ、危険率1%でTT型の方がCT型より脂肪交雑育種価が高かった。なお、皮下脂肪厚育種価では有意差は見られなかった。また、このSNP部位がCCホモである系治の後代半きょうだい肥育牛195頭(CT型、CC型の遺伝子型を持つ)について解析したところ、危険率5%でCT型の方がCC型より脂肪交雑育種価が高かった。なお、ここでも皮下脂肪厚育種価では有意差は見られなかった。

RPL27A遺伝子はリボゾームの構成タンパク質として公知であるが、脂肪交雑との関係は明らかにはされていない。

【発明を実施するための最良の形態】

【0008】

本明細書における、「C/Tホモまたはヘテロ型」なる用語は、遺伝子型がTT型、TC型およびCC型のいずれかであることを示す。

また、「ウシの脂肪交雑形成能力の予測、遺伝子型判定方法」なる用語は、ウシの遺伝子型の判定方法およびウシの遺伝子型を判定し、それにより脂肪交雑形成能力を予測する方法の両方を意味する。

【0009】

配列表の配列番号1には、RP-7272部位を含むGenBank NW\_001495105の3108901~3117420の塩基配列を示す。第1エキソン開始点は3116809に相当し、RP-7272は、3109537(配列番号1中637番目)に相当し、その塩基yはtまたはcである。

【0010】

本発明の方法は、ウシ個体から採取した検体から抽出した試料DNAをPCRにより増幅し、SNPタイプを、例えば、制限酵素を用いてRFLP分析により判定するものである。

検体としては、血液、精液等の生物体の一部を使用でき、これらから、常法により試料DNAを抽出して判定を行う。

用いる制限酵素としては、例えば、Bsu36I(NEBJ)を用いることができる。

【0011】

PCRは公知の方法に従って行うことができる。

PCRに使用するプライマーは、RP-7272部位を含む領域を増幅するための配列を適宜設計すればよい。

例えば、センスプライマーとして配列番号2、アンチセンスプライマーとして配列番号3で示す配列が挙げられる。

【0012】

また、RFLP分析も公知の方法に従って行うことができる。

本発明のSNPのTアリルは制限酵素Bsu36Iで切断されるが、Cアリルは切断されない。

これにより、電気泳動で切断の有無を調べることによりSNPタイプが判定できる。

【0013】

本発明のキットは、本発明のSNP部位を含む領域の配列を増幅するプライマーを含む。好ましくは、これらのプライマーと所定の制限酵素を含むPCR-RFLPキットとする。当該キットにはこれ以外に検体からのゲノムDNAの抽出試薬や、必要な器具、判定用の説明書等が含まれていてもよい。

【0014】

上記した本発明者らが既に明らかにした3つのSNP(特願2007-235628号)の検出と、本発明のSNP検出を組み合わせることもできる。かかる4つの遺伝子のSNP診断は、PCR-SSP(Sequence Specific Primer)による同時解析が可能であり、組み合わせることにより高い信頼性で脂肪交雑能力の高い個体を判別することが可能となる。

10

20

30

40

50

以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【実施例 1】

【0015】

PCR-RFLPによる遺伝子型判定

(1) 試料の採取

種雄牛については血液あるいは精液を採取、肥育牛については食肉市場で屠殺された個体から脂肪組織を採取して用いた。これらの検体から常法によりゲノムDNAを抽出した。

血液からの抽出にはReadyAmp™ Genomic DNA Purification System(Promega)を、精液および脂肪組織からの抽出にはWizard SV Genomic DNA Purification System(Promega)を用いた。

(2) DNAの増幅

下記プライマーを使用し、下記反応液を、94.0 で2分間の加熱1サイクルと、94.0 で30秒、最適アニーリング温度57 で30秒、ついで72.0 で1分の加熱を35サイクル繰り返し、最後に72.0 で5分間加熱してDNAを増幅した。

PCR用プライマー配列は、以下のとおりである。

cctgtttcag agaatctaag tcc (配列番号2)

ctgatcagtt tcacttctag ttcag (配列番号3)

PCR反応液

ゲノムDNA溶液	3.0 μl
プライマーミックス(最終)	0.5 μM
5×Go taq buffer	4.0 μl
Go taq(最終)	0.5 U
dNTPs(最終)	0.2 mM
全量	20.0 μl

(3) 制限酵素処理

下記反応液を表1に示す所定温度で所定時間インキュベーションして制限酵素処理した後、制限酵素処理反応液を3%Nusieve GTGアガロースゲルで電気泳動した。

RFLP反応液

PCR反応液	2.00 μl
10x添付buffer	1.00 μl
制限酵素(Bsu361)	最適酵素量
全量	10.00 μl

【表 1】

制限酵素	アレル	切断の有無	期待断片長(bp)	最適酵素量(単位)	反応温度(°C)	反応時間(hr)
Bsu361	T C	有 無	73, 119 192	1	37	1

【実施例 2】

【0016】

統計解析

各種のウシ個体について、実施例1と同様にしてSNPタイプを判定し、分散分析により脂肪交雑形成能力との相関関係を統計的に調べた。

分散分析には最小二乗分散分析法を用いて、計算はSASのGLMプロシジャを用いた。独立性検定にはFisherの直接検定または<sup>2</sup>検定を用いて、計算にはFREQプロシジ

ヤを用いた。

(1) 大分県種雄牛を用いた予備的相関解析

検出されたSNPと脂肪交雑との相関解析を行う予備的な解析として、脂肪交雑に関する育種価が得られている大分県黒毛和種種雄牛101頭について、肉の脂肪交雑に関する育種価の低い下位群17頭と、高い上位群17頭についてSNP遺伝子型を調べた。

その結果を表2に示す。

【0017】

【表2】

試料 No.	登録No.	名号	RP-7272	脂肪交雑育種価
<b>下位群</b>				
52	G598	徳花	CC	-1.07
38	G692	第2賢晴	CC	-0.598
40	G2070	福清勇	CC	-0.312
51	G1354	真弓	CT	0.416
20	G1817	糸栄	CT	0.426
55	G1076	隆福	CT	0.586
45	G3235	八重菊波	CC	0.606
43	G1788	金富士	CC	0.71
47	G165	城竜	CC	0.818
34	G1931	豊桜	CC	0.94
39	G2003	茂福	CT	0.968
73	G1903	平川	CC	0.986
22	11800	糸金	CC	1.146
74	12500	栃太郎	CC	1.206
8	G1546	平茂金	CC	1.3
68	G2879	福竜	CT	1.516
24	G798	八重栄	CC	1.536
<b>上位群</b>				
49	G4016	茂桜	CC	3.974
233	13492	神茂71	CT	4.048
87				
14(糸福後代)	G2850	牧福	TT	4.054
	G3935	重福	CT	4.092
4	G2691	大船7	CT	4.116
86	G3034	糸509	CT	4.326
85	G2880	勝福	CT	4.356
239	13493	75大船	TT	4.356
84	G2566	糸鶴	CT	4.378
81	G1512	糸福	TT	4.524
65	G4083	宮茂997	CC	4.53
83				
15(糸福後代)	G3357	糸藤	CT	4.56
	G4362	安糸美	TT	5.302
44	G4084	藤平茂	CT	5.382
82	G3717	寿恵福	TT	5.78
67	13454	隆茂38	CT	5.788
69	13456	八重福栄	TT	6.942

10

20

30

40

50

## 【 0 0 1 8 】

つぎに、SNPについて、遺伝子頻度を用いた独立性検定により相関解析を行った。  
その結果を表3に示す。

【表3】

SNP	遺伝子	遺伝子数		χ <sup>2</sup> 検定		Fisher 直接検定
		上位群	下位群	χ <sup>2</sup> 値	P値	
RP-7272	C	13	29	15.94	<0.0001	0.00007
	T	21	5			

10

この結果、上位群において、危険率0.01%以下でTアリルの方が高いことが示され、脂肪交雑に関する遺伝的能力すなわち育種価が高いことが示された。

## 【 0 0 1 9 】

(2) 大分県種雄牛101頭についての相関解析

上記の種雄牛101頭について、SNPとの相関を分散分析により解析した。また、これら101頭については、脂肪交雑と同じく脂肪蓄積に関連する形質である皮下脂肪厚の育種価も得られており、皮下脂肪厚の育種価についても同様に解析を行った。

結果を表4および表5に示す。

【表4】

脂肪交雑および皮下脂肪厚の育種価に関する分散分析による相関解析

変動因	自由度	脂肪交雑		皮下脂肪厚	
		平均平方	P値	平均平方	P値
RP-7272	2	14.83	0.0002	55.15	0.0364
残差	98	1.62		16.09	

20

【表5】

遺伝子型ごとの最小二乗平均値

遺伝子型	頭数	脂肪交雑の最小二乗平均値±S.E.	皮下脂肪厚の最小二乗平均値±S.E.
TT	19	3.29±0.29 <sup>a</sup>	-3.25±0.92 <sup>ab</sup>
TC	45	2.88±0.19 <sup>a</sup>	-3.34±0.60 <sup>a</sup>
CC	37	1.92±0.21 <sup>b</sup>	-1.14±0.66 <sup>b</sup>

30

a, b: 脂肪交雑について、同じ肩文字を持たない同列の平均値間に有意な差がある (P<0.01)。皮下脂肪厚について、同じ肩文字を持たない同列の平均値間に有意な差がある (P<0.05)。

40

この結果、脂肪交雑の育種価についてはTアリルの方が0.02%水準で有意に育種価が高かった。

## 【実施例3】

## 【 0 0 2 0 】

上記と同様に、SNP部位がTTホモである種雄牛「系福」の後代去勢肥育牛217頭 (TT型、CT型の遺伝子型を持つ) の脂肪交雑および皮下脂肪厚の育種価について、RP-7272との相関を解析した。

結果を表6および表7に示す。

50

【表 6】

脂肪交雑および皮下脂肪厚の育種価に関する分散分析による相関解析

変動因	自由度	脂肪交雑		皮下脂肪厚	
		平均平方	P 値	平均平方	P 値
RP-7272	1	6.83	0.0103	14.09	0.3691
残差	215	1.02		17.4	

【表 7】

遺伝子型ごとの最小二乗平均値

遺伝子型	頭数	脂肪交雑の最小二乗平均値±S.E.	皮下脂肪厚の最小二乗平均値±S.E.
TT	67	3.58±0.12 <sup>a</sup>	0.81±0.51
CT	150	3.19±0.08 <sup>b</sup>	1.36±0.34

a, b : 同じ肩文字を持たない同列の平均値間に有意な差がある (P &lt; 0.05)。

10

この結果から、脂肪交雑の育種価については危険率 1% で、TT 型の方が CT 型より脂肪交雑の育種価が高かった。皮下脂肪厚の育種価では、遺伝子型の効果は有意でなかった。

20

## 【実施例 4】

## 【0021】

上記と同様に、SNP 部位が CC ホモである種雄牛「系治」の後代去勢肥育牛 195 頭 (CT 型、CC 型の遺伝子型を持つ) の脂肪交雑および皮下脂肪厚の育種価について、RP-7272 との相関を解析した。

結果を表 8 および表 9 に示す。

【表 8】

脂肪交雑および皮下脂肪厚の育種価に関する分散分析による相関解析

変動因	自由度	脂肪交雑		皮下脂肪厚	
		平均平方	P 値	平均平方	P 値
RP-7272	1	3.11	0.04	10.09	0.3798
残差	193	0.73		13.02	

30

【表 9】

遺伝子型ごとの最小二乗平均値

遺伝子型	頭数	脂肪交雑の最小二乗平均値±S.E.	皮下脂肪厚の最小二乗平均値±S.E.
CT	66	3.31±0.09 <sup>a</sup>	0.59±0.36
CC	129	3.06±0.09 <sup>b</sup>	0.13±0.37

a, b : 同じ肩文字を持たない同列の平均値間に有意な差がある (P &lt; 0.05)。

40

この結果、危険率 5% で、CT 型の方が CC 型より脂肪交雑の育種価が高いことが示された。皮下脂肪厚の育種価では、遺伝子型の効果は有意でなかった。

## 【産業上の利用可能性】

## 【0022】

50



以上記載したごとく、本明細書に開示する遺伝子型を判定することにより、肥育牛の早期段階において脂肪交雑能力の高い個体とそうでない個体を判別し、それらの能力に合った肥育計画を立てることができると考えられる。また、雄牛および雌牛の脂肪交雑に関する遺伝的能力を成長の早期に判定することができ、脂肪交雑の改良を著しく促進できる。

脂肪交雑は肥育牛の価格を決める重要な因子であり、肉用牛産業に多大な貢献ができ、さらに、肥育技術への貢献のみならず、種牛雄選抜を含めた育種改良への応用も期待できる。

【配列表フリーテキスト】

【 0 0 2 3 】

配列番号 2 : Designed oligonucleotide primer for amplifying bovine RPL27A gene region containing RP-7272

10

配列番号 3 : Designed oligonucleotide primer for amplifying bovine RPL27A gene region containing RP-7272

【配列表】

2010187636000001.app

## フロントページの続き

- (71)出願人 591224788  
大分県  
大分県大分市大手町3丁目1番1号
- (74)代理人 100081422  
弁理士 田中 光雄
- (74)代理人 100084146  
弁理士 山崎 宏
- (74)代理人 100116311  
弁理士 元山 忠行
- (74)代理人 100122301  
弁理士 富田 憲史
- (72)発明者 山田 宜永  
京都府京都市左京区北白川追分町 国立大学法人京都大学大学院農学研究科内
- (72)発明者 三宅 武  
京都府京都市左京区北白川追分町 国立大学法人京都大学大学院農学研究科内
- (72)発明者 谷口 幸雄  
京都府京都市左京区北白川追分町 国立大学法人京都大学大学院農学研究科内
- (72)発明者 佐々木 義之  
茨城県つくば市松代5丁目16-526-402
- (72)発明者 森田 光夫  
東京都中央区京橋1-19-8 社団法人 家畜改良事業団内
- (72)発明者 佐々木 整輝  
東京都中央区京橋1-19-8 社団法人 家畜改良事業団内
- (72)発明者 村上 博  
茨城県つくば市緑が原3丁目3番地 日本ハム株式会社内
- (72)発明者 助川 慎  
茨城県つくば市緑が原3丁目3番地 日本ハム株式会社内
- (72)発明者 高萩 陽一  
茨城県つくば市緑が原3丁目3番地 日本ハム株式会社内
- (72)発明者 森松 文毅  
茨城県つくば市緑が原3丁目3番地 日本ハム株式会社内
- (72)発明者 藤田 達男  
大分県竹田市久住町大字久住3989-1 大分県農林水産研究センター畜産試験場内
- (72)発明者 渡邊 直人  
大分県竹田市久住町大字久住3989-1 大分県農林水産研究センター畜産試験場内
- (72)発明者 志賀 一穂  
大分県大分市賀来南1丁目4-75
- Fターム(参考) 4B024 AA11 CA03 CA04 CA09 HA12  
4B063 QA12 QQ43 QR14 QR55 QR62 QS25 QS34