

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02014/057983

発行日 平成28年9月5日 (2016.9.5)

(43) 国際公開日 平成26年4月17日 (2014.4.17)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO 1 N 33/574 (2006.01)	GO 1 N 33/574 B	
GO 1 N 33/543 (2006.01)	GO 1 N 33/543 5 4 1 A	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 22 頁)


出願番号 特願2014-540871 (P2014-540871)	(71) 出願人 504229284 国立大学法人弘前大学 青森県弘前市文京町 1 番地
(21) 国際出願番号 PCT/JP2013/077495	
(22) 国際出願日 平成25年10月9日 (2013.10.9)	
(31) 優先権主張番号 特願2012-226489 (P2012-226489)	(71) 出願人 507219686 静岡県公立大学法人 静岡県静岡市駿河区小鹿二丁目 2 番 1 号
(32) 優先日 平成24年10月12日 (2012.10.12)	
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)	(74) 代理人 100106611 弁理士 辻田 幸史
	(74) 代理人 100087745 弁理士 清水 善廣
	(74) 代理人 100098545 弁理士 阿部 伸一
	(72) 発明者 大山 力 青森県弘前市文京町 1 番地 国立大学法人 弘前大学内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 前立腺癌と前立腺肥大を識別するための方法およびキット

(57) 【要約】

本発明の課題は、少ない分析試料で高感度に再現性よく前立腺癌と前立腺肥大を識別する方法を提供することである。その解決手段としての本発明の前立腺癌と前立腺肥大を識別する方法は、前立腺特異抗原 ( P S A ) を含む分析試料と抗フリー P S A 抗体を固定化した担体を接触させて担体に固定化した抗フリー P S A 抗体にフリー P S A を結合させた後、固定化した抗フリー P S A 抗体にフリー P S A が結合した担体と末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を接触させて担体に固定化した抗フリー P S A 抗体に結合したフリー P S A に末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を結合させ、末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した N 型糖鎖を有するフリー P S A 量を測定し、得られた測定量を予め設定された前立腺癌と前立腺肥大のカットオフ値と比較することにより、カットオフ値よりも多い場合は前立腺癌であるかその蓋然性が高く、少ない場合は前立腺肥大であるかその蓋然性が高



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

前立腺癌と前立腺肥大を識別するための方法であって、前立腺特異抗原（PSA）を含む分析試料と抗フリーPSA抗体を固定化した担体を接触させて担体に固定化した抗フリーPSA抗体にフリーPSAを結合させた後、固定化した抗フリーPSA抗体にフリーPSAが結合した担体と末端シアル酸残基が（2，3）結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を接触させて担体に固定化した抗フリーPSA抗体に結合したフリーPSAに末端シアル酸残基が（2，3）結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を結合させ、末端シアル酸残基が（2，3）結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するフリーPSA量を測定し、得られた測定量を予め設定された前立腺癌と前立腺肥大のカットオフ値と比較することにより、カットオフ値よりも多い場合は前立腺癌であるかその蓋然性が高く、少ない場合は前立腺肥大であるかその蓋然性が高いと判定することによる方法。

10

## 【請求項 2】

PSAを含む分析試料が、血清、尿、前立腺組織抽出液、精液、膀胱洗浄液からなる群より選択される少なくとも1つである請求項1記載の方法。

## 【請求項 3】

抗フリーPSA抗体が抗ヒトフリーPSA特異的モノクローナル抗体（コンプレックスPSAと反応しないもの）である請求項1記載の方法。

20

## 【請求項 4】

担体が磁性粒子である請求項1記載の方法。

## 【請求項 5】

抗フリーPSA抗体を固定化した担体と、末端シアル酸残基が（2，3）結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を少なくとも含む前立腺癌と前立腺肥大を識別するためのキット。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、前立腺癌と前立腺肥大を識別するための方法およびキットに関する。

## 【背景技術】

30

## 【0002】

前立腺癌（prostate carcinoma：以下「Pca」と略す）は男性の主要な死亡原因であることは周知の通りであり、前立腺特異抗原（prostate specific antigen：以下「PSA」と略す）はPcaに対する最も重要な腫瘍マーカーとして認識されている（非特許文献1）。PSAは約34kDaの糖蛋白で、糖鎖はその約8%を占める。Pcaの早期診断に対する血清PSAテストの有用性は既に多くの文献に記載されているが、Pcaに罹患している男性と前立腺肥大（benign prostate hyperplasia：以下「BPH」と略す）に罹患している男性の間にはグレーゾーン（gray zone）と呼ばれるPcaともBPHともどちらとも言えない領域がある（非特許文献2）。そこで2つの病変を正確に区別するための試み、例えば、PSA密度、PSA勾配、フリーPSA/トータルPSAの比などを指標にした試みがこれまで実施されてきた。しかしながら、こうした方法では2つの病変を正確に区別することは困難である。そのため、現在の血清PSAテストはPcaに特異的ではなく、感度と特異度を共に満足させる適切なカットオフ値がないことが世界的な問題となっている。

40

## 【0003】

このような背景のもと、本発明者である大山らのグループは、精嚢液から精製したPSAをN-Glycosidase Fで処理し、PSAのN型糖鎖を切り出してmatrix associated laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI TOF) mass spectrom

50

etry (MS) によって解析することで、PSAの糖鎖として19種類を同定し、PSAの糖鎖が非常に多様性に富んでいることを明らかにした(非特許文献3)。それ以前にStameyらのグループは、PSAの糖鎖としては2本鎖で末端にシアル酸が(2,6)結合でガラクトースに結合したN型糖鎖のみが発現していると報告していたが(非特許文献4)、末端のシアル酸は(2,6)結合でのみでなく(2,3)結合でガラクトースに結合しているものも約10%存在することが大山らのグループによって明らかになった。その後、大山らのグループは、PSAを糖鎖のみでなく、PSAのペプチド配列を含む状態でMS-MSによって解析することで、PSAのN型糖鎖の末端シアル酸残基は、癌化に伴い、(2,6)結合でよりも(2,3)結合でガラクトースに結合するものが増加することを明らかにした(非特許文献5)。

10

## 【0004】

以上の知見に鑑みれば、末端シアル酸残基が(2,3)結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するPSA量を指標にしてPcaとBPHを識別することが可能であると考えられ、実際に、本発明者である大山が特許文献1において提案した末端シアル酸残基が(2,3)結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するイヌエンジュレクチンを用いたアフィニティークロマトグラフィーにより、PcaとBPHを識別できることが確認されている。しかしながら、イヌエンジュレクチンを用いたアフィニティークロマトグラフィーによってPcaとBPHを識別する方法は、これまでに提案されてきた方法と全く異なる方法として注目されるが、末端シアル酸残基が(2,3)結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するPSA量はトータルPSA量のわずか1~2%と極微量であるため、精度の高い識別を行うためには分析試料として血清を大量(10ml程度)に必要とするという問題がある。また、使用するイヌエンジュレクチンは天然物からの抽出物であるため、ロット間での品質のばらつきが認められるという問題もある。

20

## 【先行技術文献】

## 【特許文献】

## 【0005】

【特許文献1】特許第4514919号公報

## 【非特許文献】

## 【0006】

【非特許文献1】Stamey TA, Yang N, Hay AR, et al., N Engl J Med. 1987; 317: 909 - 916

30

【非特許文献2】Catalona WJ, et al., JAMA 1998; 279: 1542 - 1547

【非特許文献3】Ohyama C, et al., Glycobiology, 2004; 14: 671 - 679

【非特許文献4】Belanger A, Van Halbeek H, Gravuxes HC, et al. Prostate, 1995; 27: 187 - 197

【非特許文献5】Tajiri M, Ohyama C, Wada Y, Glycobiology, 2008; 18: 2 - 8

40

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0007】

そこで本発明は、少ない分析試料で高感度に再現性よくPcaとBPHを識別する方法を提供することを目的とする。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0008】

本発明者らは上記の点に鑑みて鋭意検討を行った結果、末端シアル酸残基が(2,3)結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を用いた免疫学的測定法によって分析試料中に含まれる末端シアル酸残基が(2,3)結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するフリーPSA量を測定することで、少ない分析試料

50

で高感度に再現性よく P c a と B P H を識別できることを見出した。

【 0 0 0 9 】

上記の知見に基づいてなされた本発明の P c a と B P H を識別するための方法は、請求項 1 記載の通り、P S A を含む分析試料と抗フリー P S A 抗体を固定化した担体を接触させて担体に固定化した抗フリー P S A 抗体にフリー P S A を結合させた後、固定化した抗フリー P S A 抗体にフリー P S A が結合した担体と末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を接触させて担体に固定化した抗フリー P S A 抗体に結合したフリー P S A に末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を結合させ、末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した N 型糖鎖を有するフリー P S A 量を測定し、得られた測定量を予め設定された P c a と B P H のカットオフ値と比較することにより、カットオフ値よりも多い場合は P c a であるかその蓋然性が高く、少ない場合は B P H であるかその蓋然性が高いと判定することによるものである。

10

また、請求項 2 記載の方法は、請求項 1 記載の方法において、P S A を含む分析試料が、血清、尿、前立腺組織抽出液、精液、膀胱洗浄液からなる群より選択される少なくとも 1 つであるものである。

また、請求項 3 記載の方法は、請求項 1 記載の方法において、抗フリー P S A 抗体が抗ヒトフリー P S A 特異的モノクローナル抗体 ( コンプレックス P S A と反応しないもの ) であるものである。

また、請求項 4 記載の方法は、請求項 1 記載の方法において、担体が磁性粒子であるものである。

20

また、本発明の P c a と B P H を識別するためのキットは、請求項 5 記載の通り、抗フリー P S A 抗体を固定化した担体と、末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を少なくとも含むものである。

【発明の効果】

【 0 0 1 0 】

本発明によれば、少ない分析試料で高感度に再現性よく P c a と B P H を識別する方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 1 1 】

【図 1】実施例 1 における、P c a 患者と B P H 患者の血清中の末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した N 型糖鎖を有するフリー P S A 量の測定結果である ( 蛍光強度による ) 。

30

【図 2】同、測定結果に基づく R O C 曲線である。

【図 3】実施例 2 における、P c a 患者と B P H 患者の血清中の末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した N 型糖鎖を有するフリー P S A 量の測定結果 ( 左 ) と、この測定結果に基づく R O C 曲線 ( 右 ) である。

【図 4】実施例 3 における、P c a 患者と B P H 患者の血清中の末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した N 型糖鎖を有するフリー P S A 量の測定結果 ( 左 ) と、この測定結果に基づく R O C 曲線 ( 右 ) である。

40

【図 5】実施例 4 における、P c a 患者と B P H 患者の血清中の末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した N 型糖鎖を有するフリー P S A 量の測定結果である ( ブランク試料の蛍光強度または H L T 試料の蛍光強度で補正したもの ) 。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 1 2 】

本発明の P c a と B P H を識別するための方法は、P S A を含む分析試料と抗フリー P S A 抗体を固定化した担体を接触させて担体に固定化した抗フリー P S A 抗体にフリー P S A を結合させた後、固定化した抗フリー P S A 抗体にフリー P S A が結合した担体と末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を接触させて担体に固定化した抗フリー P S A 抗体に結合したフリー P

50

S Aに末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を結合させ、末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するフリーP S A量を測定し、得られた測定量を予め設定されたP c aとB P Hのカットオフ値と比較することにより、カットオフ値よりも多い場合はP c aであるかその蓋然性が高く、少ない場合はB P Hであるかその蓋然性が高いと判定することによるものである。

#### 【 0 0 1 3 】

本発明において、P S Aを含む分析試料としては、血清、尿、前立腺組織抽出液、精液、膀胱洗浄液などが挙げられる。その調製は自体公知の方法によって行えばよい。分析試料は少量であってよい。望ましくは1 ~ 1 0 0 0  $\mu$  l、より望ましくは5 ~ 5 0 0  $\mu$  l、最も望ましくは1 0 ~ 1 0 0  $\mu$  lである。

10

#### 【 0 0 1 4 】

抗フリーP S A抗体を固定化した担体は、市販の抗フリーP S A抗体と担体を用いて自体公知の方法によって調製することができる。末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するフリーP S A量を高感度で測定するため、抗フリーP S A抗体として、抗ヒトフリーP S A特異的モノクローナル抗体(コンプレックスP S Aと反応しないもの)を用いることが望ましい(例えばクローン2 E 2由来のものやクローン8 A 6由来のものなどが市販されている)。担体は、磁性粒子やウェルプレートなどの抗体を固定化することができるものであればどのようなものであってもよいが、磁力によって容易に回収することができるので取扱い性に優れるという点において磁性粒子が望ましい。なお、本発明において「フリーP S A」は 1 - アンチキモトリブシンなどの蛋白と結合していないP S Aを意味し、非蛋白結合型P S Aや遊離型P S Aとも称される(コンプレックスP S Aは蛋白と結合しているP S Aを意味する)。

20

#### 【 0 0 1 5 】

末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体は、末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖、即ち、S i a ( 2 , 3 ) G a l糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体であればどのようなものであってもよい。市販のものとしては本発明者である鈴木らのグループによって確立されたH Y B 4モノクローナル抗体(和光純薬社)が例示されるがこれに限定されるわけではない。

30

#### 【 0 0 1 6 】

P S Aを含む分析試料と抗フリーP S A抗体を固定化した担体を接触させて担体に固定化した抗フリーP S A抗体にフリーP S Aを結合させる工程と、固定化した抗フリーP S A抗体にフリーP S Aが結合した担体と末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を接触させて担体に固定化した抗フリーP S A抗体に結合したフリーP S Aに末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を結合させる工程は、いずれも例えば、2 ~ 5 の温度条件で1 0分間 ~ 3時間行えばよい。末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するフリーP S A量の測定は、例えばE L I S A ( E n z y m e - L i n k e d I m m u n o s o r b e n t A s s a y ) サンドイッチ法やフローサイトメトリー法によって行うことができる。後者の場合、測定は例えば検出可能な蛍光標識を行った二次抗体を用いて行えばよいが、末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を蛍光標識して二次抗体を用いずに行うこともできる。なお、抗体の標識は検出可能なものであればどのようなものであってもよく、蛍光標識に限定されるわけではない。測定の際に必要な応じて、洗浄、精製、分画といった操作を行ってもよいことは言うまでもない。また、抗フリーP S A抗体を固定化した担体と、末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体は、P c aとB P Hを容易かつ簡便に識別することができるように洗浄液などとともにキット化してもよい。

40

50

## 【0017】

こうして測定された末端シアル酸残基が (2, 3) 結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するフリーPSA量を予め設定されたPcaとBPHのカットオフ値と比較することにより、カットオフ値よりも多い場合はPcaであるかその蓋然性が高く、少ない場合はBPHであるかその蓋然性が高いと判定することができる。カットオフ値は、Pcaに罹患している男性群の測定値とBPHに罹患している男性群の測定値をもとに設定することができる。例えば蛍光標識を用いて測定する場合、カットオフ値は蛍光強度(MFI: Mean Fluorescence Intensity)として、測定条件などに応じて1~10000の範囲にある数値で設定することができる。

## 【実施例】

10

## 【0018】

以下、本発明を実施例によって詳細に説明するが、本発明は以下の記載に限定して解釈されるものではない。

## 【0019】

参考例1: 末端シアル酸残基が (2, 3) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するHYB4モノクローナル抗体の作製

本発明による前立腺癌と前立腺肥大の識別に用いる末端シアル酸残基が (2, 3) 結合でガラクトースに結合した糖鎖を特異的に認識するモノクローナル抗体を次の手順によって作製した。

## 【0020】

20

## (1) 抗原の調製

糖脂質であるIV<sup>3</sup>NeuAcnLc<sub>4</sub>Cer(NeuAc 2-3Gal 1-4GlcNAc 1-3Gal 1-4Glc 1-1' Cer)を免疫原として使用した。

## 【0021】

## (2) ハイブリドーマの作製

IV<sup>3</sup>NeuAcnLc<sub>4</sub>Cer(NeuAc 2-3Gal 1-4GlcNAc 1-3Gal 1-4Glc 1-1' Cer) 228 μgをEtOH 114 μlに溶かし、超音波処理後、PBS 1820 μlを加えて、37℃に加熱した。その後、アジュバントとして酸処理したSalmonella minnesota菌体膜画分をPBSで1mg/mlに懸濁した溶液568 μlを加えて37℃、10分間静置させた。この混合溶液200 μlを0, 4, 7, 11, 21, 25日目にC3Hマウスに尾静脈内投与した。最終投与後3日目に、免疫したマウスの脾臓から調製したリンパ球をケーラーとミルシュタインの常法(Nature, 256, 495, 1975)に従って、細胞融合に供した。融合相手の親細胞に、マウス骨髄腫細胞株であるPA1(ヒューマンサイエンス研究資源バンク、JCRB0113)を用い、融合剤としてはポリエチレングリコール4000(メルク社)を用いた。このようにして融合した細胞は、HAT培地に懸濁し、96穴のマイクロカルチャープレートに分注して培養した。約2週間後、コロニー陽性ウエルの培養上清中の抗体産生をIV<sup>3</sup>NeuAcnLc<sub>4</sub>Cerを抗原とするELISA法でスクリーニングした。スクリーニングは96穴マイクロタイタープレート(ダイナテック社、IMMULON 1B)を用いて次のようにして行った。IV<sup>3</sup>NeuAcnLc<sub>4</sub>Cerを95%EtOHで0.1nmol/50 μlに調製し、50 μl/wellとなるように加えた。ブランクとなるウェルには95%EtOH 50 μlを入れた。減圧下でEtOHを蒸発させ、抗原糖脂質を固相化後、1% human serum albumin(Sigma社、A6784)含有PBS(PBS-1)を200 μl/wellとなるように加え、室温に1時間放置した。PBS-1を除去後、ハイブリドーマ培養上清を50 μl/wellとなるように加え、室温にて1時間反応させた。培養上清を除去後、PBS 100 μl/wellでウェルを1回洗浄した。PBS-1で10000倍希釈した二次抗体(Protein A-HRP)溶液を100 μl/wellとなるように加え、室温にて1時間反応させた。二次抗体溶液を除去後、ウェルをPBS 100 μl/wellで5回洗浄した。ペルオキシダーゼ基質(O-フェニレンジアミン2mgを80

30

40

50

mMクエン酸 - リン酸緩衝液 (pH 5.6) 5 ml、30%過酸化水素 2  $\mu$ l で溶解したものを 100  $\mu$ l / well となるように加えた。遮光放置して発色が見られたところで 1M HCl 100  $\mu$ l / well を加えて発色を停止させた。その後、測定波長 492 nm、対照波長 630 nm に設定したマイクロプレートリーダーで吸光度を測定した。高い抗体産生能、良好な増殖能をもつ3つのハイブリドーマクローンが得られた (抗体産生陽性率: 0.5%)。得られたクローンが産生する抗体のクラス (免疫グロブリンのタイプ) はすべて IgG3 ( ) であった。以上のようにして選択されたハイブリドーマのうち、クローンHYB4由来のモノクローナル抗体が Sia (2,3)Gal糖鎖と特異的に反応した。

#### 【0022】

##### (3) HYB4モノクローナル抗体の調製

(2)において得られたハイブリドーマ(クローンHYB4)を、75 cm<sup>2</sup>フラスコ(CORNING社、430720)を用いて、10% (v/v) Fetal bovine serum (FBS) 含有RPMI 1640培地(ニッスイ社、05918) 25 ml中、37、5% CO<sub>2</sub>存在下で2日間前培養した。75 cm<sup>2</sup>フラスコ2本から細胞を回収し、E-RDF培地(極東社、26500) 1 lに懸濁後、大量培養装置(スピナーフラスコ)に移し、37で4日間回転培養を行った。この培養液中に Sia (2,3)Gal糖鎖と特異的に反応するモノクローナル抗体が高濃度に含まれていた。クローンHYB4由来の培養液は、プロテインAセファロースによるアフィニティクロマトグラフィーで精製した。こうしてハイブリドーマ(クローンHYB4)から調製したHYB4モノクローナル抗体は、免疫グロブリンのタイプがIgG3で、分子量は約15万ダルトンであった。こうして確立されたHYB4モノクローナル抗体は、和光純薬社から市販されている。

#### 【0023】

実施例1: HYB4モノクローナル抗体を用いたPcaとBPHの識別(その1)

以下の手順によって行った。

#### 【0024】

##### (1) 担体への抗フリーPSA抗体の固定化

磁性ビーズであるMagplex microspheres (Luminex社)を担体として使い、その表面に抗フリーPSA抗体をXMAP Antibody Coupling Kitのマニュアルに従って固定した。具体的には、1.5 mlチューブに  $6.25 \times 10^6$  個 / 500  $\mu$ l のMagplex microspheresを添加し、Magnetic Separator上で2分間、静置した。磁性ビーズ沈殿後、上清を吸引し、除去した。チューブへ500  $\mu$ l のActivation bufferを添加し、10秒間混合後、Magnetic Separator上で2分間、静置した。磁性ビーズ沈殿後、上清を吸引し、除去した。再度チューブへ400  $\mu$ l のActivation bufferを添加し、10秒間混合した。次に50  $\mu$ l のSulfo-NHSと50  $\mu$ l のEDC溶液を添加し、10秒間混合後、20分間室温で放置した。Magnetic Separator上で2分間、静置した。磁性ビーズ沈殿後、上清を吸引し、除去した。磁性ビーズを洗浄するため、500  $\mu$ l のWash bufferを添加し、10秒間混合後、Magnetic Separator上で2分間、静置した。磁性ビーズ沈殿後、上清を吸引し、除去した。この洗浄操作を計3回繰り返した。25  $\mu$ gの抗ヒトフリーPSA特異的モノクローナル抗体(クローン2E2由来のコンプレックスPSAと反応しない抗フリーPSA抗体)(フナコシ社)を1000  $\mu$ lのActivation bufferに混合し、磁性ビーズの入ったチューブに添加した。室温で緩やかに混合(15 - 30 rpm)しながら2時間放置した。Magnetic Separator上で2分間、静置した。磁性ビーズ沈殿後、上清を吸引し、除去した。磁性ビーズを洗浄するため、500  $\mu$ lのWash bufferを添加し、10秒間混合後、Magnetic Separator上で2分間、静置した。磁性ビーズ沈殿後、上清を吸引し、除去した。この洗浄操作を計3回繰り返した。最後に1 mlのWash buff

10

20

30

40

50

erを添加し、1 $\mu$ lあたり6250個の抗フリーPSA抗体を固定化したMagplex microspherを調製し、使用するまで4で保存した。

【0025】

(2) LumineXシステムを用いた末端シアル酸残基が(2,3)結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するフリーPSAの定量

(A) 定量対象者

トータルPSAのレベルが20.0ng/ml以下のPca患者79名およびBPH患者96名とし、それぞれの患者から血清を採取し、測定を行った。患者の組織病理学的診断は前立腺生検を行って確認した。患者の年齢、PSA値、病理組織学的悪性度分類および臨床病期を表1に示す。

10

【0026】

【表1】

	BPH	Pca	P-value
患者数	96	79	
年齢(中央値)	69.5 $\pm$ 8.0	72.0 $\pm$ 7.3	0.2634
トータルPSA値 (ng/mL)	2.1-19.7	3.0-17.6	0.1421
トータルPSA値中央値	6.60	7.5	
0-4 ng/mL (%)	2.1	2.5	
4-10 ng/mL (%)	78.1	69.6	
10-20 ng/mL (%)	19.7	27.8	
>20 ng/ml (%)	0	0	
Gleason score			
GS6 (%)	-	3.3	
GS7 (%)	-	43.3	
GS8 (%)	-	18.3	
GS9 (%)	-	35	
GS10 (%)	-	0	
cT stage (臨床的腫瘍径)			
T1c-T2a (%)	-	75.9	
T2b (%)	-	7.6	
T2c-T3 (%)	-	13.9	
T4	-	0	

20

30

40

【0027】

(B) 定量方法

96穴白色プレート(WATMAN社)の各ウェルに(1)において調製した12500個/2 $\mu$ lの抗フリーPSA抗体固定化Magplex microspherを添

50



加した。Carbofree Blocking buffer (フナコシ社)を50  $\mu$ l 添加し、磁性ビーズをブロッキングした後、各ウェルに分析試料である血清を20  $\mu$ l 添加し、1時間、4 で放置後、磁性ビーズを100  $\mu$ lの0.01% Tween 20を含むTris-buffered saline (TBST)で3回洗浄した。次に50  $\mu$ lのHYB4モノクローナル抗体を混合し、1時間、4 で放置した。磁性ビーズを50  $\mu$ lのTBSTで3回洗浄後、50  $\mu$ lのPhycocerythrin 蛍光色素 (PE) 標識抗マウスIgG3抗体 (Santa Cruz Biotechnology社)を混合し、45分、室温で放置後、Luminex 100 フローメトリーに96穴白色プレートを設定し、各ウェルの蛍光強度 (MFI: Mean Fluorescence Intensity) を測定した。

10

## 【0028】

## (C) 定量結果

図1に示す。図1から明らかなように、Pca患者の血清の蛍光強度は、BPH患者の血清の蛍光強度よりも有意に高かった ( $P < 0.001$ , Mann-Whitney U-TEST)。これは即ち、Pca患者の血清中の末端シアル酸残基が (2, 3) 結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するフリーPSA量は、BPH患者の血清中のそれより多いことを意味する。また、この定量結果からRelative Operating Characteristic curve (ROC曲線)により解析を行ったところ、MFI値のcut off = 128.5で、感度0.8354、特異度0.7083、AUC (曲線下面積: Area Under the Curve) = 0.8445であった (図2)。

20

## 【0029】

## (3) PcaとBPHの識別

(2)で設定したMFIのカットオフ値を基準にして本発明の方法によってPcaとBPHの識別を行ったところ、従来のPSA検査でPcaの疑いがあると判断された患者 (177名)で針生検を施行してBPHと診断された患者 (98名)のうちの約75% (73名)の患者についてBPHと判定できた。以上の結果から、本発明によってPcaとBPHを少ない分析試料で高感度に再現性よく識別できることがわかった。現在行われているPca診断法としての血清PSAテストではPcaとBPHの識別は困難であり、PSA値が4 ng/ml以上の場合、前立腺に針を刺入する生検が必要となる。しかしながら、針生検を施行した患者のうちPcaと診断される患者は約20%に過ぎず、結果として残りの約80%の患者には本来不要であった針生検を施行せざるを得ないのが現状である。しかも針生検は侵襲的であり、出血や感染症などの重篤な有害事象を伴うことが懸念される。本発明によれば、PcaとBPHを少ない分析試料で高感度に再現性よく識別できるので、針生検の施行を必要とする症例の絞り込みが可能になるため、これまで困難であった非侵襲的なPca診断の実施ができる。

30

## 【0030】

実施例2: HYB4モノクローナル抗体を用いたPcaとBPHの識別 (その2)

以下の手順によって行った。

## 【0031】

40

## (1) 担体への抗フリーPSA抗体の固定化

磁性ビーズであるMagplex microsphere (Luminex社)を担体として用い、その表面に抗フリーPSA抗体をXMAP Antibody Coupling Kitのマニュアルに従って固定した。具体的には、1.5mlチューブに $1.25 \times 10^7$ 個/1000  $\mu$ lのMagplex microsphereを添加し、Magnetic Separator上で2分間、静置した。磁性ビーズ沈殿後、上清を吸引し、除去した。チューブへ500  $\mu$ lのActivation bufferを添加し、10秒間混合後、Magnetic Separator上で2分間、静置した。磁性ビーズ沈殿後、上清を吸引し、除去した。再度チューブへ400  $\mu$ lのActivation bufferを添加し、10秒間混合した。次に50  $\mu$ lのSulfo-NH

50

Sと50 $\mu$ lのEDC溶液を添加し、10秒間混合後、20分間室温で放置した。Magnetic Separator上で2分間、静置した。磁性ビーズ沈殿後、上清を吸引し、除去した。磁性ビーズを洗浄するため、500 $\mu$ lのWash bufferを添加し、10秒間混合後、Magnetic Separator上で2分間、静置した。磁性ビーズ沈殿後、上清を吸引し、除去した。この洗浄操作を計3回繰り返した。62.5 $\mu$ gの抗ヒトフリーPSA特異的モノクローナル抗体（クローン8A6由来のコンプレックスPSAと反応しない抗フリーPSA抗体）（Abcam社）を500 $\mu$ lのActivation bufferに混合し、磁性ビーズの入ったチューブに添加した。室温で緩やかに混合（15-30rpm）しながら2時間放置した。Magnetic Separator上で2分間、静置した。磁性ビーズ沈殿後、上清を吸引し、除去した。磁性ビーズを洗浄するため、500 $\mu$ lのWash bufferを添加し、10秒間混合後、Magnetic Separator上で2分間、静置した。磁性ビーズ沈殿後、上清を吸引し、除去した。この洗浄操作を計3回繰り返した。最後に2mlのWash bufferを添加し、1 $\mu$ lあたり6250個の抗フリーPSA抗体を固定化したMagnetic microsphereを調製し、使用するまで4℃で保存した。

10

## 【0032】

(2) LumineXシステムを用いた末端シアル酸残基が(2,3)結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するフリーPSAの定量

## (A) 定量対象者

トータルPSAのレベルが10.0ng/ml以下のPca患者138名およびBPH患者176名とし、それぞれの患者から血清を採取し、測定を行った。患者の組織病理学的診断は前立腺生検を行って確認した。患者の年齢、PSA値、病理組織学的悪性度分類および臨床病期を表2に示す（表中、Non-PCaはBPH患者を意味する）。

20

## 【0033】

## 【表2】

Characteristics	Non-PCa	PCa	<i>P</i>
Patients (n)	176	138	
Median Age (range)	68.0 (51-83)	69.0 (50-84)	0.0181
Median PSA, ng/mL (range)	5.8 (2.0-10.0)	6.4 (2.2-10.0)	0.0008
Median fPSA, ng/mL (range)	0.12 (0-2.43)	0.10 (0-4.40)	0.1267
Median %fPSA (% , range)	2.1 (0-51.6)	1.6 (0-44.0)	0.0020
Median S2,3PSA, MFI( range)	940 (395-2221)	1484 (693-2971)	<0.0001
Biopsy Gleason Sum ,n (%)			
5-6		24 (17.5)	
7		66 (48.2)	
8-10		48 (34.3)	
Clinical stage (n, %)			
cT1c-cT2a		127 (92.0)	
cT2b		3 (2.2)	
cT2c		7 (5.1)	
unknown		1 (0.7)	
D'Amico Risk category (n, %)			
low		24 (17.4)	
intermediate		64 (46.4)	
high		50 (36.2)	

30

40

## 【0034】

## (B) 定量方法

50

実施例 1 に記載の方法と同様の方法で行った。

【 0 0 3 5 】

( C ) 定量結果

図 3 左に示す ( 図中、Non - P c a は B P H 患者を意味する ) 。図 3 左から明らか  
 のように、P c a 患者の血清の蛍光強度は、B P H 患者の血清の蛍光強度よりも有意に高  
 かった (  $P < 0 . 0 0 0 1$  , M a n w h i t n e y U - T E S T ) 。これは即ち、P c  
 a 患者の血清中の末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した N 型糖  
 鎖を有するフリー P S A 量は、B P H 患者の血清中のそれより多いことを意味する。また  
 、この定量結果から R e l a t i v e O p e r a t i n g C h a r a c t e r i s t i c c u r v e ( R O C 曲線 ) により解析を行ったところ、M F I 値の c u t o f f =  
 1 1 3 0 で、感度 9 0 . 6 % 、特異度 6 4 . 2 % 、A U C = 0 . 8 4 であった ( 図 3 右 :  
 S 2 , 3 P S A ) 。これに対し、トータル P S A 測定法は A U C = 0 . 6 1 、%フリー P  
 S A 測定法 ( フリー P S A / トータル P S A の比を指標にした方法 ) は A U C = 0 . 6 0  
 であった ( 図 3 右 : 図中、P S A はトータル P S A 測定法、% f P S A は % フリー P S A  
 測定法を意味する ) 。よって、本発明の方法は感度 9 0 % 以上であって A U C = 0 . 8 0  
 以上であることは、本発明の方法が P c a と B P H の識別精度に優れていることを裏付け  
 るものであった。本発明の方法と、トータル P S A 測定法および % フリー P S A 測定法に  
 ついて、特異度、診断精度、陽性診断率、陰性診断率を比較した結果を表 3 に示す ( 表中  
 、S 2 , 3 P S A は本発明の方法、P S A はトータル P S A 測定法、% f P S A は % フリー  
 P S A 測定法を意味する ) 。表 3 から明らかのように、本発明の方法によれば、特異度  
 6 0 % 以上、診断精度 7 0 % 以上、陽性診断率 6 0 % 以上、陰性診断率 8 0 % 以上でもっ  
 て、P c a と B P H を識別できることがわかった。

10

20

【 0 0 3 6 】

【 表 3 】

	S2,3PSA,	PSA	%fPSA
Cutoff values normalized by	>1130 (MFI)	>4.5 ng/mL	<5.39 %
sensitivity for S2,3PSA test	90.6	90.6	90.6
Sensitivity (%)	90.6	90.6	90.6
Specificity (%)	64.2	9.7	11.9
Accuracy (%)	75.8	45.2	46.5
Positive predictive value (%)	66.5	44.0	44.6
Negative predictive value (%)	89.7	56.7	61.8

30

40

【 0 0 3 7 】

実施例 3 : H Y B 4 モノクローナル抗体を用いた P c a と B P H の識別とイヌエンジュレクチンを用いた P c a と B P H の識別の比較

以下の手順によって行った。

【 0 0 3 8 】

( 1 ) 担体への抗フリー P S A 抗体の固定化

実施例 2 に記載の方法と同様の方法で行った。

【 0 0 3 9 】

( 2 ) L u m i n e x システムを用いた末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した N 型糖鎖を有するフリー P S A の定量

50

## (A) 定量対象者

トータルPSAのレベルが20.0 ng/ml以下のPca患者48名およびBPH患者54名とし、それぞれの患者から血清を採取し、測定を行った。患者の組織病理学的診断は前立腺生検を行って確認した。患者の年齢、PSA値、病理組織学的悪性度分類および臨床病期を表4に示す(表中、Non-PCaはBPH患者を意味する)。

【0040】

【表4】

Characteristics	Non-PCa	PCa	P	
Patients (n)	54	48		10
Median Age (range)	69.0 (53–81)	72.5 (58–84)	0.0737	
Median PSA (ng/mL, range)	6.65 (2.4–17.1)	7.10 (3.1–15.3)	0.5989	
Median fPSA (ng/mL, range)	0.23 (0.05–1.09)	0.16 (0.00–0.69)	0.0166	
Median %fPSA (% , range)	3.00 (0.84–18.7)	2.24 (0.14–9.02)	0.0083	
Median S2,3PSA HYB4(MFI, range)	922 (621–2030)	1670 (716–3545)	<0.0001	
Median S2,3PSA MAA(MFI, range)	953 (239–1436)	1095 (118–1970)	0.0288	
Biopsy Gleason Sum (n, %)				
5–6		0 (0)		20
7		26 (54.2)		
8–10		22 (45.8)		
Clinical stage (n, %)				
cT1c–cT2a		39 (81.25)		
cT2b		3 (6.25)		
cT2c–cT3		6 (12.5)		
D’Amico Risk category (n, %)				
low		0 (0)		30
intermediate		23 (47.9)		
high		25 (52.1)		

【0041】

## (B) 定量方法

(i) HYB4モノクローナル抗体を用いる場合

実施例1に記載の方法と同様の方法で行った。

【0042】

(ii) イヌエンジュレクチンを用いる場合

96穴白色プレート(WATMAN社)の各ウェルに(1)において調製した12500個/2μlの抗フリーPSA抗体固定化Magplex microspherを添加した。Carbofree Blocking buffer(フナコシ社)を50μl添加し、磁性ビーズをブロックした後、各ウェルに分析試料である血清を20μl添加し、1時間、4℃で放置後、磁性ビーズを100μlの0.01% Tween 20を含むTris-buffered saline(TBST)で3回洗浄した。次に50μlのビオチン標識イヌエンジュレクチン(Biotinylated MAA: Vector laboratories社)を混合し、1時間、4℃で放置した。磁性ビーズを50μlのTBSTで3回洗浄後、50μlのPhycocerythrin蛍光色素(PE)標識ストレプトアビジン(Santa Cruz Biotechnology社)を混合し、45分、室温で放置後、Luminex 100フローメトリーに96穴白色

40

50

プレートを設定し、各ウェルの蛍光強度 ( M F I ) を測定した。

【 0 0 4 3 】

( C ) 定量結果

図 4 左に示す ( 図中、Non - P c a は B P H 患者、H Y B 4 は本発明の方法、M A A はイヌエンジュレクチンを用いた方法を意味する )。図 4 左から明らかなように、本発明の方法によれば、P c a 患者の血清の蛍光強度と B P H 患者の血清の蛍光強度の違いを、 $20 \mu\text{l}$  という少ない血清量で認識することができたが、イヌエンジュレクチンを用いた方法ではできなかった。また、この定量結果から R e l a t i v e O p e r a t i n g C h a r a c t e r i s t i c c u r v e ( R O C 曲線 ) により解析を行ったところ、図 4 右から明らかなように、本発明の方法は  $AUC = 0.8561$  であった ( S 2 , 3 P S A H Y B 4 )。これに対し、イヌエンジュレクチンを用いた方法は  $AUC = 0.6256$  であり ( S 2 , 3 P S A M A A )、トータル P S A 測定法の  $AUC ( 0.5305 : P S A )$  と % フリー P S A 測定法の  $AUC ( 0.6582 : \% f P S A )$  と大差がなかった。よって、本発明の方法は、イヌエンジュレクチンを用いた方法と比較して、少ない分析試料でも P c a と B P H の識別精度が優れていることがわかった。

10

【 0 0 4 4 】

実施例 4 : H Y B 4 モノクローナル抗体を用いた P c a と B P H の識別のためのカットオフ値の設定

実施例 2 における本発明の方法による P c a と B P H の識別のためのカットオフ値を規格化するため、27 例の血清を含まない試料 ( ブランク試料 : リン酸緩衝液 ) または 80 例の健常者の血清 ( H L T 試料 ) について実施例 2 に記載の方法と同様の方法で測定した蛍光強度で分析試料である血清の蛍光強度を除算することによって比率で表した。結果を図 5 に示す。図 5 から明らかなように、H L T 試料では末端シアル酸残基が ( 2 , 3 ) 結合でガラクトースに結合した N 型糖鎖を有するフリー P S A が存在しないため、その蛍光強度はブランク試料の蛍光強度とほぼ同じであった。27 例のブランク試料の蛍光強度の平均値あるいは中央値または 80 例の H L T 試料の蛍光強度の平均値あるいは中央値で P c a 患者の血清の蛍光強度および B P H 患者の血清の蛍光強度を除算し、比率を求めた結果、検出感度 90 % を満たすカットオフ値は表 5 の通りであり、P c a が疑われる患者の血清の蛍光強度をブランク試料の蛍光強度の平均値あるいは中央値または H L T 試料の蛍光強度の平均値あるいは中央値で除算した値がカットオフ値よりも高い場合は P c a であるかその蓋然性が高く、少ない場合は B P H であるかその蓋然性が高いと判定することができることがわかった。

20

30

【 0 0 4 5 】

【 表 5 】

---

(1) 「分析試料である血清の蛍光強度 / ブランク試料の蛍光強度の平均値」を採用する場合  
カットオフ値 4.975-4.990、感度 90.58%、特異度 71.59-72.16%

---

(2) 「分析試料である血清の蛍光強度 / ブランク試料の蛍光強度の中央値」を採用する場合  
カットオフ値 5.335-5.350、感度 90.65%、特異度 70.79-71.35%

---

(3) 「分析試料である血清の蛍光強度 / H L T 試料の蛍光強度の平均値」を採用する場合  
カットオフ値 5.260-5.300、感度 90.58%、特異度 71.02-72.16%

---

(4) 「分析試料である血清の蛍光強度 / H L T 試料の蛍光強度の中央値」を採用する場合  
カットオフ値 5.565-5.600、感度 90.58%、特異度 71.02-72.16%

---


40

【 産業上の利用可能性 】


【 0 0 4 6 】

本発明は、少ない分析試料で高感度に再現性よく P c a と B P H を識別する方法を提供することができる点において産業上の利用可能性を有する。


【 図 1 】




【 図 3 】



【 図 2 】




【 図 4 】




【 図 5 】

ブランク試料を測定した場合の蛍光強度平均値(242)あるいは、蛍光強度中央値(225)をAとし、測定値比となる[B(分析試料の蛍光強度測定値)/A]の値を算出した結果(左:Aが蛍光強度平均値、右:Aが蛍光強度中央値)



HLT試料を測定した場合の蛍光強度平均値(228)あるいは、蛍光強度中央値(215)をAとし、測定値比となる[B(分析試料の蛍光強度測定値)/A]の値を算出した結果(左:Aが蛍光強度平均値、右:Aが蛍光強度中央値)



## 【手続補正書】

【提出日】平成27年5月23日(2015.5.23)

## 【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0021】

## (2) ハイブリドーマの作製

IV<sup>3</sup>NeuAcnLc<sub>4</sub>Cer (NeuAc 2-3Gal 1-4GlcNAc 1-3Gal 1-4Glc 1-1' Cer) 228 μg を EtOH 114 μl に溶かし、超音波処理後、PBS 1820 μl を加えて、37 に加温した。その後、アジュバントとして酸処理した Salmonella minnesota 菌体膜画分を PBS で 1 mg/ml に懸濁した溶液 568 μl を加えて 37、10 分間静置させた。この混合溶液 200 μl を 0, 4, 7, 11, 21, 25 日目に C3H マウスに尾静脈内投与した。最終投与後 3 日目に、免疫したマウスの脾臓から調製したリンパ球をケーラーとミルシュタインの常法 (Nature, 256, 495, 1975) に従って、細胞融合に供した。融合相手の親細胞に、マウス骨髄腫細胞株である PAI (ヒューマンサイエンス研究資源バンク、JCRB0113) を用い、融合剤としてはポリエチレングリコール 4000 (メルク社) を用いた。このようにして融合した細胞は、HAT 培地に懸濁し、96 穴のマイクロカルチャープレートに分注して培養した。約 2 週間後、コロニー陽性ウエルの培養上清中の抗体産生を IV<sup>3</sup>NeuAcnLc<sub>4</sub>Cer を抗原とする ELISA 法でスクリーニングした。スクリーニングは 96 穴マイクロタイタープレート (ダイナテック社、IMMULON 1B) を用いて次のようにして行った。IV<sup>3</sup>NeuAcnLc<sub>4</sub>Cer を 95% EtOH で 0.1 nmol/50 μl に調製し、50 μl/well となるように加えた。ブランクとなるウェルには 95% EtOH 50 μl を入れた。減圧下で EtOH を蒸発させ、抗原糖脂質を固相化後、1% human serum albumin (Sigma 社、A6784) 含有 PBS (PBS-1) を 200 μl/well となるように加え、室温に 1 時間放置した。PBS-1 を除去後、ハイブリドーマ培養上清を 50 μl/well となるように加え、室温にて 1 時間反応させた。培養上清を除去後、PBS 100 μl/well でウェルを 1 回洗浄した。PBS-1 で 10000 倍希釈した二次抗体 (Protein A-HRP) 溶液を 100 μl/well となるように加え、室温にて 1 時間反応させた。二次抗体溶液を除去後、ウェルを PBS 100 μl/well で 5 回洗浄した。ペルオキシダーゼ基質 (O-フェニレンジアミン 2 mg を 80 mM クエン酸-リン酸緩衝液 (pH 5.6) 5 ml、30% 過酸化水素 2 μl で溶解したもの) を 100 μl/well となるように加えた。遮光放置して発色が見られたところで 1 M HCl 100 μl/well を加えて発色を停止させた。その後、測定波長 492 nm、対照波長 630 nm に設定したマイクロプレートリーダーで吸光度を測定した。高い抗体産生能、良好な増殖能をもつ 3 つのハイブリドーマクローンが得られた (抗体産生陽性率: 0.5%)。得られたクローンが産生する抗体のクラス (免疫グロブリンのタイプ) はすべて IgG3 ( ) であった。以上のようにして選択されたハイブリドーマのうち、クローン HYB4 由来のモノクローナル抗体が Sia (2, 3) Gal 糖鎖と特異的に反応した。

## 【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0027】

## (B) 定量方法

96穴白色プレート(WHATMAN社)の各ウェルに(1)において調製した12500個/2 $\mu$ lの抗フリーPSA抗体固定化Magplex microspherを添加した。Carbofree Blocking buffer(フナコシ社)を50 $\mu$ l添加し、磁性ビーズをブロッキングした後、各ウェルに分析試料である血清を20 $\mu$ l添加し、1時間、4℃で放置後、磁性ビーズを100 $\mu$ lの0.01%Tween20を含むTris-buffered saline(TBST)で3回洗浄した。次に50 $\mu$ lのHYB4モノクローナル抗体を混合し、1時間、4℃で放置した。磁性ビーズを50 $\mu$ lのTBSTで3回洗浄後、50 $\mu$ lのPhycocerythrin蛍光色素(PE)標識抗マウスIgG3抗体(Santa Cruz Biotechnology社)を混合し、45分、室温で放置後、Luminex100フローメトリーに96穴白色プレートをセットし、各ウェルの蛍光強度(MFI: Mean Fluorescence Intensity)を測定した。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0028】

(C) 定量結果

図1に示す。図1から明らかなように、Pca患者の血清の蛍光強度は、BPH患者の血清の蛍光強度よりも有意に高かった( $P < 0.001$ , Mann Whitney U-test)。これは即ち、Pca患者の血清中の末端シアル酸残基が(2,3)結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するフリーPSA量は、BPH患者の血清中のそれより多いことを意味する。また、この定量結果からRelative Operating Characteristic curve(ROC曲線)により解析を行ったところ、MFI値のcut off = 128.5で、感度0.8354、特異度0.7083、AUC(曲線下面積: Area Under the Curve) = 0.8445であった(図2)。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0035

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0035】

(C) 定量結果

図3左に示す(図中、Non-PCaはBPH患者を意味する)。図3左から明らかなように、Pca患者の血清の蛍光強度は、BPH患者の血清の蛍光強度よりも有意に高かった( $P < 0.0001$ , Mann Whitney U-test)。これは即ち、Pca患者の血清中の末端シアル酸残基が(2,3)結合でガラクトースに結合したN型糖鎖を有するフリーPSA量は、BPH患者の血清中のそれより多いことを意味する。また、この定量結果からRelative Operating Characteristic curve(ROC曲線)により解析を行ったところ、MFI値のcut off = 1130で、感度90.6%、特異度64.2%、AUC = 0.84であった(図3右: S2, 3 PSA)。これに対し、トータルPSA測定法はAUC = 0.61、%フリーPSA測定法(フリーPSA/トータルPSAの比を指標にした方法)はAUC = 0.60であった(図3右: 図中、PSAはトータルPSA測定法、%fPSAは%フリーPSA測定法を意味する)。よって、本発明の方法は感度90%以上であってAUC = 0.80以上であることは、本発明の方法がPcaとBPHの識別精度に優れていることを裏付けるものであった。本発明の方法と、トータルPSA測定法および%フリーPSA測定法について、特異度、診断精度、陽性診断率、陰性診断率を比較した結果を表3に示す(表



中、S2, 3 PSAは本発明の方法、PSAはトータルPSA測定法、%fPSAは%フリーPSA測定法を意味する)。表3から明らかなように、本発明の方法によれば、特異度60%以上、診断精度70%以上、陽性診断率60%以上、陰性診断率80%以上でもって、PcaとBPHを識別できることがわかった。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0042

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0042】

(ii) イヌエンジュレクチンを用いる場合

96穴白色プレート(WHATMAN社)の各ウェルに(1)において調製した12500個/2 $\mu$ lの抗フリーPSA抗体固定化Magplex microspheresを添加した。Carbofree Blocking buffer(フナコシ社)を50 $\mu$ l添加し、磁性ビーズをブロッキングした後、各ウェルに分析試料である血清を20 $\mu$ l添加し、1時間、4℃で放置後、磁性ビーズを100 $\mu$ lの0.01% Tween 20を含むTris-buffered saline(TBST)で3回洗浄した。次に50 $\mu$ lのビオチン標識イヌエンジュレクチン(Biotinylated MAA: Vector laboratories社)を混合し、1時間、4℃で放置した。磁性ビーズを50 $\mu$ lのTBSTで3回洗浄後、50 $\mu$ lのPhycoerythrin 蛍光色素(PE)標識ストレプトアビジン(Santa Cruz Biotechnology社)を混合し、45分、室温で放置後、Luminex 100フローメトリーに96穴白色プレートをセットし、各ウェルの蛍光強度(MFI)を測定した。

## 【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2013/077495
<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> G01N33/574(2006.01)i, G01N33/553(2006.01)i  According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G01N33/574, G01N33/553  Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2013 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2013 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2013  Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamIII)		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2002-55108 A (Tsutomu OYAMA), 20 February 2002 (20.02.2002), fig. 1; paragraphs [0012], [0006], [0009] (Family: none)	1-5
Y	Taro KINOSHITA, "Tosa no Seibutsu Kino no Kaimei to Riyo Gijutsu", URL ( <a href="http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/heisei17/pdf/a10/f01/s013.pdf">http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/heisei17/pdf/a10/f01/s013.pdf</a> ), 2005	1-5
Y	JP 2011-529184 A (The Johns Hopkins University), 01 December 2011 (01.12.2011), paragraphs [0019], [0020], [0054] & US 2011/0129849 A1 & EP 2316033 A	1-5
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 22 October, 2013 (22.10.13)		Date of mailing of the international search report 05 November, 2013 (05.11.13)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2013/077495

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	Susumu AKIMOTO, "Measurement of serum prostate-specific antigen by DPC immulyze PSA kit and clinical evaluation in patients with prostate cancer", Hinyoki Geka, 1995.10, vol.8, no.10, 939 to 943	1-5

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 3 / 0 7 7 4 9 5	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G01N33/574(2006,01)i, G01N33/553(2006,01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G01N33/574, G01N33/553			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2013年 日本国実用新案登録公報 1996-2013年 日本国登録実用新案公報 1994-2013年			
国際調査で使用了電子データベース (データベースの名称、調査に使用了用語) JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamIII)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	
Y	JP 2002-55108 A (大山力) 2002.02.20, 【図1】【0012】【0006】【0009】 (ファミリーなし)	1-5	
Y	木下タロウ, 「糖鎖の生物機能の解明と利用技術」, URL( <a href="http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/heisei17/pdf/a10/f01/s013.pdf">http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/heisei17/pdf/a10/f01/s013.pdf</a> ), 2005	1-5	
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。		<input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 22.10.2013		国際調査報告の発送日 05.11.2013	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 吉田 将志	2 J   4 6 3 6 電話番号 03-3581-1101 内線 3252

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 3 / 0 7 7 4 9 5
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2011-529184 A (ザ・ジョンズ・ホプキンス・ユニバーシティ) 2011.12.01, 【0019】【0020】【0054】 & US 2011/0129849 A1 & EP 2316033 A	1-5
A	秋元晋, DPC-イムライズ PSA キットの臨床的検討, 泌尿器外科, 1995.10, Vol.8/No.10, 939-943	1-5

## フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

(出願人による申告)平成23年度、独立行政法人科学技術振興機構、研究成果展開事業、研究成果最適展開支援プログラム、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願

- (72)発明者 米山 徹  
青森県弘前市文京町1番地 国立大学法人弘前大学内
- (72)発明者 飛澤 悠葵  
青森県弘前市文京町1番地 国立大学法人弘前大学内
- (72)発明者 島山 真吾  
青森県弘前市文京町1番地 国立大学法人弘前大学内
- (72)発明者 鈴木 隆  
静岡県静岡市駿河区谷田5-2-1 静岡県公立大学法人静岡県立大学内
- (72)発明者 左 一八  
静岡県静岡市駿河区谷田5-2-1 静岡県公立大学法人静岡県立大学内
- (72)発明者 山口 真帆  
静岡県静岡市駿河区谷田5-2-1 静岡県公立大学法人静岡県立大学内

## 【要約の続き】

いと判定することによる。

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。