

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02018/051903

発行日 令和1年6月24日(2019.6.24)

(43) 国際公開日 平成30年3月22日(2018.3.22)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード(参考)
C08B 30/18 (2006.01)	C08B 30/18	4C086
A61K 31/715 (2006.01)	A61K 31/715	4C090
A61P 31/04 (2006.01)	A61P 31/04	

審査請求有 予備審査請求有 (全29頁)

出願番号 特願2018-539674 (P2018-539674)	(71) 出願人 304021277 国立大学法人 名古屋工業大学 愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番
(21) 国際出願番号 PCT/JP2017/032426	
(22) 国際出願日 平成29年9月8日(2017.9.8)	
(31) 優先権主張番号 特願2016-178594 (P2016-178594)	(74) 代理人 110001128 特許業務法人ゆうあい特許事務所
(32) 優先日 平成28年9月13日(2016.9.13)	(72) 発明者 山村 初雄 愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番 国立大学法人名古屋工業大学内
(33) 優先権主張国 日本国(JP)	(72) 発明者 官川 淳 愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番 国立大学法人名古屋工業大学内
	Fターム(参考) 4C086 AA01 AA02 AA03 EA20 MA01 MA04 NA14 ZB35

最終頁に続く




(54) 【発明の名称】 糖誘導体またはその塩、それらを用いた抗菌剤または抗菌活性増強剤

(57) 【要約】

【課題】 抗菌性に優れた化合物を提供するとともに、他の抗菌剤の抗菌性を増強することに優れた化合物を提供する。

【解決手段】 下記の(1)または(2)の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した抗菌作用のある糖誘導体又はその塩。ここで、R¹はアミノ基を含む構造を示す。nは3以上の整数を示す。また、下記の(5)または(6)の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した抗菌活性増強作用のある糖誘導体又はその塩。ここで、R³はアミノ基を含む構造を示す。R⁴はアセチル基又はプロパノイル基である。nは3以上の整数を示す。

【化1】



AA Monosaccharide


【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記の(1)または(2)の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した抗菌作用のある糖誘導体又はその塩。

ここで、 R^1 はアミノ基を含む構造を示す。単糖の一級水酸基には、 R^1 を結合したトリアゾールが置換している。プロパノイル基は、単糖の二級水酸基の水素原子と置換している。 n は3以上の整数を示す。

【化 1】




10

【請求項 2】

下記の(3)または(4)の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した抗菌作用のある糖誘導体又はその塩。

ここで、 R^2 はアルキレン基を示す。単糖の一級水酸基とは、 $R^2 NH_2$ を結合したトリアゾールが置換している。プロパノイル基は、単糖の二級水酸基の水素原子と置換している。 n は3以上の整数を示す。

【化 2】



30

【請求項 3】

前記化学式(3)または(4)中の R^2 がメチレン基であることを特徴とする請求項2に記載の糖誘導体又はその塩。

【請求項 4】

前記化学式中の単糖がグルコースであることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1つに記載の糖誘導体又はその塩。

40

【請求項 5】

前記化学式中の単糖がグルコースであり、このグルコースが環状に連結したオリゴ糖であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1つに記載の糖誘導体又はその塩。

【請求項 6】

請求項1乃至5のいずれか1つに記載の糖誘導体又はその塩を有効成分として含有する抗菌剤。


【請求項 7】

下記の(5)または(6)の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した抗菌活性増強作用のある糖誘導体又はその塩。


50

ここで、 R^3 はアミノ基を含む構造を示す。単糖の一級水酸基とは、 R^3 を結合したトリアゾールが置換している。 R^4 はアセチル基又はプロパノイル基であり、単糖の二級水酸基の水素原子と置換している。 n は3以上の整数を示す。

【化3】



(5)



(6)

10


【請求項8】

下記の(7)または(8)の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した抗菌作用または抗菌活性増強作用のある請求項7に記載の糖誘導体又はその塩。


ここで、 R^5 はアルキレン基を示す。単糖の一級水酸基とは、 $R^5 NH_2$ を結合したトリアゾールが置換している。 R^6 はアセチル基又はプロパノイル基であり、単糖の二級水酸基の水素原子と置換している。 n は3以上の整数を示す。

20

【化4】



(7)



(8)

30

【請求項9】

前記化学式(7)または(8)中の R^5 がメチレン基であることであることを特徴とする請求項8に記載の糖誘導体又はその塩。

【請求項10】

前記化学式中の単糖がグルコースであることを特徴とする発明7乃至9のいずれか1つに記載の糖誘導体又はその塩。

【請求項11】

前記化学式中の単糖がグルコースであり、このグルコースが環状に連結したオリゴ糖であることを特徴とする請求項7乃至9のいずれか1つに記載の糖誘導体又はその塩。

40

【請求項12】

請求項7乃至11のいずれか1つに記載の糖誘導体又はその塩を有効成分として含有する抗菌活性増強剤。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、糖誘導体またはその塩、それを用いた抗菌剤または抗菌活性増強剤に関する。

【背景技術】

50

【 0 0 0 2 】

ペニシリンの発見以来、様々な抗生物質や合成抗菌薬が開発され、感染症治療のために使用されてきた。しかし、メシチリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）に代表される既存の抗菌薬に対して耐性を持つ多剤耐性菌が深刻なまでに増加し、新たな抗菌薬の発展が渴望されている。

【 0 0 0 3 】

一般に薬剤耐性が起こりにくい抗菌物質として、ポリミキシンBなどの膜作動型機構により抗菌性を示す物質が存在する。しかし、これらは複雑な構造を有する天然物であり、人工的な製造、さらには優れた活性を持つように改良することは容易ではない。このため、人工的な抗菌性物質を合成することも行われており、特異な化学構造を有するシクロデキストリンを化学修飾して抗菌剤として用いることが行われている（例えば特許文献1、2、3参照）。

10

【 先行技術文献 】

【 特許文献 】

【 0 0 0 4 】

【 特許文献 1 】 国際公開 2 0 0 6 / 0 7 5 5 8 0 号（特許 5 0 9 8 0 1 5 号公報）

【 特許文献 2 】 国際公開 2 0 0 6 / 0 8 3 6 7 8 号

【 特許文献 3 】 特開 2 0 1 3 - 1 7 7 4 7 7 号

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

20

【 0 0 0 5 】

しかしながら、薬剤耐性などの細菌の変化に対応するためには、上記した従来技術よりも優れた抗菌性や抗菌活性増強性が望まれる。本発明は、この実情に鑑みてなされたものであって、従来技術（例えば、特許文献3に記載の化合物）よりも抗菌性に優れ、他の抗菌剤の抗菌性を増強することに優れた化合物を化学式で特定し、その化合物を用いた抗菌剤及び他の抗菌剤の活性を増強する物質を提供することを解決すべき課題としている。

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 0 6 】

発明1は、下記の(1)または(2)の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した抗菌作用のある糖誘導体又はその塩である。


30

【 0 0 0 7 】


ここで、 R^1 はアミノ基を含む構造を示す。単糖の一級水酸基には、 R^1 を結合したトリアゾールが置換している。プロパノイル基は、単糖の二級水酸基の水素原子と置換している。 n は3以上の整数を示す。

【 0 0 0 8 】

【 化 1 】



(1)



(2)

40

【 0 0 0 9 】


発明2は、下記の(3)または(4)の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した抗菌作用のある糖誘導体又はその塩である。ここで、 R^2 はアルキ

50


レン基を示す。単糖の一級水酸基とは、 R^2NH_2 を結合したトリアゾールが置換している。プロパノイル基は、単糖の二級水酸基の水素原子と置換している。nは3以上の整数を示す。

【0010】

【化2】



(3)



(4)

10

【0011】

発明3は、化学式(3)または(4)中の R^2 がメチレン基であることを特徴とする発明2に記載の糖誘導体又はその塩である。

【0012】

発明4は、化学式中の単糖がグルコースであることを特徴とする発明1乃至3のいずれか1つに記載の糖誘導体又はその塩である。

【0013】

発明5は、化学式中の単糖がグルコースであり、このグルコースが環状に連結したオリゴ糖であることを特徴とする発明1乃至3のいずれか1つに記載の糖誘導体又はその塩である。

【0014】


発明6は、発明1乃至5のいずれか1つに記載の糖誘導体又はその塩を有効成分として含有する抗菌剤である。

【0015】


発明7は、下記の(5)または(6)の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した抗菌活性増強作用のある糖誘導体又はその塩である。ここで、 R^3 はアミノ基を含む構造を示す。単糖の一級水酸基とは、 R^3 を結合したトリアゾールが置換している。このアミノ基を含む構造は例えばアミノアルキル基である。 R^4 はアセチル基又はプロパノイル基であり、単糖の二級水酸基の水素原子と置換している。nは3以上の整数を示す。

【0016】

【化3】



(5)



(6)

40

【0017】



発明8は、下記の(7)または(8)の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖

50

状又は環状に連結した抗菌作用または抗菌活性増強作用のある糖誘導体又はその塩である。ここで、 R^5 はアルキレン基を示す。単糖の一級水酸基とは、 $R^5 NH_2$ を結合したトリアゾールが置換している。 R^6 はアセチル基又はプロパノイル基であり、単糖の二級水酸基の水素原子と置換している。 n は3以上の整数を示す。

【0018】

【化4】



10

【0019】

発明9は、化学式(7)または(8)中の R^5 がメチレン基であることであることを特徴とする発明8に記載の糖誘導体又はその塩である。

20

【0020】

発明10は、化学式中の単糖がグルコースであることを特徴とする発明7乃至9のいずれか1つに記載の糖誘導体又はその塩である。

【0021】

発明11は、化学式中の単糖がグルコースであり、このグルコースが環状に連結したオリゴ糖であることを特徴とする発明7乃至9のいずれか1つに記載の糖誘導体又はその塩である。

【0022】

発明12は、発明7乃至11のいずれか1つに記載の糖誘導体又はその塩を有効成分として含有する抗菌活性増強剤である。

30

【発明の効果】

【0023】

本発明は、上記従来の実情に鑑みてなされたものであって、従来技術よりも抗菌剤及び他の抗菌剤の活性を増強する物質としての性能に優れた化合物を化学式で特定し、その化合物を用いた抗菌剤及び他の抗菌剤の活性を増強する抗菌活性増強剤を提供できる。

【0024】

発明1によれば、一級水酸基に、アミノ基を含む構造を結合したトリアゾール環が置換し、および二級水酸基上の置換基がプロパノイル基である単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した糖誘導体又はその塩を、抗菌作用のある糖誘導体またはその塩として、(1)または(2)の化学式で提供する効果がある。

40

【0025】

発明2によれば、一級水酸基と、アミノアルキル基を結合したトリアゾール環が置換し、および二級水酸基上の置換基がプロパノイル基である単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した糖誘導体又はその塩を、抗菌作用のある糖誘導体またはその塩として、(3)または(4)の化学式で提供する効果がある。

【0026】

発明3によれば、アミノアルキル基がアミノメチル基であることを特徴とする発明2に記載の糖誘導体又はその塩を、抗菌作用のある糖誘導体またはその塩として化学式で提供する効果がある。

【0027】

50

発明 4 によれば、単糖がグルコースであることを特徴とする発明 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の糖誘導体又はその塩を、抗菌作用のある糖誘導体またはその塩として化学式で提供する効果がある。

【0028】

発明 5 によれば、単糖がグルコースであり、このグルコースが環状に連結したオリゴ糖であることを特徴とする発明 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の糖誘導体又はその塩を、抗菌作用のある糖誘導体またはその塩として化学式で提供する効果がある。

【0029】

発明 6 によれば、発明 1 乃至 5 のいずれか 1 項に記載の糖誘導体又はその塩である抗菌作用に優れた化合物を有効成分として含有する抗菌剤を提供できる効果がある。

10

【0030】

発明 7 によれば、一級水酸基と、アミノ基を含む構造を結合したトリアゾール環が置換し、および二級水酸基上の R^4 がアセチル基又はプロパノイル基である単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した糖誘導体又はその塩を、抗菌活性増強作用のある糖誘導体またはその塩として、(5) または (6) の化学式で提供する効果がある。

【0031】

発明 8 によれば、一級水酸基と、アミノアルキル基を結合したトリアゾール環が置換し、および二級水酸基上の R^4 がアセチル基又はプロパノイル基である単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した糖誘導体又はその塩を、抗菌作用または抗菌活性増強作用のある糖誘導体またはその塩として、(7) または (8) の化学式で提供する効果がある。

20

【0032】

発明 9 によれば、アミノアルキル基がアミノメチル基であることを特徴とする発明 8 に記載の糖誘導体又はその塩を、抗菌活性増強作用のある糖誘導体またはその塩として化学式で提供する効果がある。

【0033】

発明 10 によれば、単糖がグルコースであることを特徴とする発明 7 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の糖誘導体又はその塩を、抗菌活性増強作用のある糖誘導体またはその塩として化学式で提供する効果がある。

【0034】

発明 11 によれば、単糖がグルコースであり、このグルコースが環状に連結したオリゴ糖であることを特徴とする発明 7 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の糖誘導体又はその塩を、抗菌活性増強作用のある糖誘導体またはその塩として化学式で提供する効果がある。

30

【0035】

発明 12 によれば、発明 7 乃至 11 のいずれか 1 項に記載の糖誘導体又はその塩である抗菌活性増強作用に優れた化合物を有効成分として含有する抗菌活性増強剤を提供できる効果がある。

【0036】

上記により本発明は従来技術よりも優れた抗菌性、抗菌活性増強作用のある糖誘導体を提供することで課題を解決できる。

【発明を実施するための形態】

40

【0037】

以下、本発明の実施の形態について説明する。本発明は、以下の実施形態に限定されるものではなく、発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、変更、修正、改良を加え得るものである。

【0038】

まず本発明者は、以下に示すシクロデキストリンの化学構造に着目し、これが新たな抗菌物質に利用できるのではないかと発想し、次のような分子設計を考えた。

【0039】


シクロデキストリンは単糖であるグルコースが環状に連なった約 1 ナノメートルの直径を持つ環状糖質である。グルコースの数が 8 個のものは、シクロデキストリンと呼ばれて

50

いる（化学式（9）参照）。シクロデキストリンのグルコースの6位に存在する第一級水酸基は環状構造の一方の開口部に、2位と3位に存在する第二級水酸基は他方の開口部に配向している。また、上記それぞれの水酸基は反応性に違いがあり、選択的に化学修飾をすることが可能である。

【0040】

【化5】



10

【0041】

化学式（9）に示す環状糖質であるシクロデキストリンには、それを構成するグルコースの数が異なる類縁体があり、グルコースの数が5個以上のものが知られている。また、グルコースは2つ以上が鎖状に連なり、オリゴ糖～多糖を形成する。これにはアミロースに代表されるグルカンが含まれる。さらに、グルコースの異性体である単糖が連なった多糖があり、マンノースを繰り返し構造とするマンナンなどがある。これらもまた同様に、その繰り返し構造である単糖の上に反応性の異なる水酸基を持つため、選択的に化学修飾をすることが可能である。


20

【0042】

細菌に抗菌性を示すペプチドであるポリミキシンBの構造を化学式（10）に示す。これは天然に存在する環状ペプチドである。ポリミキシンBは細菌の膜構造を傷害して抗菌性を示す。それを可能にする要因である構造的な特徴として、陽イオン性アミノ基を持つアミノ酸を複数個有することが挙げられる。

【0043】

【化6】



30

【0044】

そこで、本発明者は細菌への抗菌性を実現するべく、シクロデキストリン上に陽イオン性アミノ基を持つアミノ酸を複数個集積させることを考えた。

【0045】

アミノ酸の集積については、シクロデキストリン上に導入したアジド基を利用してクリックケミストリーで導入する方法を検討した。クリックケミストリーとは、以下のような特徴を有する反応のことである。

40

- (1) 汎用性が高い
- (2) 高効率、高収率
- (3) 副生成物を生じない
- (4) 立体特異的である

50

(5) 精製が容易である

(6) 出発物質と試薬が手に入れやすい。


【0046】

クリックケミストリーとして最も一般的なものとされているのが H u i s g e n 反応である(下記の化学反応式参照)。この反応は、アジドと末端アルキンがトリアゾール環を形成する反応である。銅を触媒にすることで1,4-二置換体が選択的に形成し、かつ反応は大幅に加速する。また、アジドとアルキンは互いの間でのみ穏やかに反応し、そして標準的な反応条件でよく用いられる求核剤、求電子剤および溶媒に対して安定である。生成するトリアゾール環も安定な官能基である。このような特徴から H u i s g e n 反応は広い分野で利用されている。

10

【0047】

【化7】



【0048】

発明者らは、H u i s g e n 反応を利用してアミノ基を含む構造を導入し、かつ特定のアルキル基をシクロデキストリンに導入した化合物を合成した。発明者らは、この合成した化合物が抗菌剤および/または他の抗菌剤の活性を増強する物質として既知の化合物に比べて著しく優れて機能することを見出し、本発明を完成するに至った。

20

【0049】


[発明 1 ~ 1 2 の実施形態]

発明 1 は (1) または (2) の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した、抗菌作用のある糖誘導体又はその塩である。ここで、R¹ はアミノ基を含む構造である。単糖の一級水酸基とは、R¹ を結合したトリアゾール環が置換している。このアミノ基を含む構造 (R¹) は、例えばアミノ基を末端に含むアミノアルキル基あるいはアミノ基を内部に含むアルキルアミノアルキル基である。プロパノイル基は、単糖の二級水酸基の水素原子と置換している。n は 3 以上の整数を示す。

30

【0050】

【化1】



40


【0051】

また、発明 2 は (3) または (4) の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した抗菌作用のある、糖誘導体又はその塩である。ここで、単糖の一級水酸基には、R² N H₂ を結合したトリアゾールが置換している。プロパノイル基は、単糖の二級水酸基の水素原子と置換している。n は 3 以上の整数を示す。発明 2 では、発明 1 における R¹ を、R² N H₂ (R² はアルキレン基である) とすることで化学式をさらに特定している。


50

【0052】

【化2】



(3)



(4)

10

【0053】

ここで、 R^2 はメチレン基とすることが好ましい。これは発明3の糖誘導体又はその塩を示す。

【0054】

n は実際に存在するオリゴ糖又は多糖を構成する数とする。例えば、1000以下とすることができる。 n は5~100とすることが好ましい。

【0055】

本発明の化合物としては、単糖がグルコース、マンノース、フルクトース、またはガラクトースに代表される炭素6個からなるヘキソースである糖誘導体又はその塩が挙げられる。

20

【0056】

また、本発明の化合物としては、単糖がグルコースである糖誘導体又はその塩が挙げられる。これは発明4の糖誘導体又はその塩を示す。

【0057】

また、単糖がグルコースであり、このグルコースが環状に連結したオリゴ糖誘導体又はその塩が挙げられる。より具体的には、 n が8であり、グルコースが環状に連結したオリゴ糖の誘導体又はその塩が挙げられる。これは発明5の糖誘導体又はその塩を示す。

【0058】

また、本発明の抗菌剤は、上記した糖誘導体又はその塩を有効成分として含有することを特徴とする。ここで「有効成分として含有する」には、糖誘導体又はその塩が抗菌剤の構造全体を構成する場合に限らず、抗菌剤の構造の一部を構成する場合も含まれる。これは発明6の抗菌剤を示す。

30


【0059】

発明7は(5)または(6)の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した、抗菌活性増強作用のある糖誘導体又はその塩である。ここで、 R^3 はアミノ基を含む構造である。単糖の一級水酸基には、 R^3 を結合したトリアゾール環が置換している。このアミノ基を含む構造(R^3)は、例えばアミノ基を末端に含むアミノアルキル基あるいはアミノ基を内部に含むアルキルアミノアルキル基である。 R^4 がアセチル基又はプロパノイル基であり、単糖の二級水酸基の水素原子と置換している。 n は3以上の整数を示す。


40

【0060】

【化3】



(5)



(6)

10


【0061】

また、発明8は(7)または(8)の化学式で示される、単糖がグリコシド結合で鎖状又は環状に連結した抗菌作用または抗菌活性増強作用のある糖誘導体又はその塩である。ここで、単糖の一級水酸基には、 R^5NH_2 を結合したトリアゾールが置換している。 R^6 はアセチル基又はプロパノイル基であり、単糖の二級水酸基の水素原子と置換している。 n は3以上の整数を示す。発明8では、発明7における R^3 を、 R^5NH_2 (R^5 はアルキレン基である)とすることで化学式をさらに特定している。


【0062】

【化4】

20



(7)



(8)

30

【0063】

ここで、 R^5 はメチレン基とすることが好ましい。これは発明9の糖誘導体又はその塩を示す。

【0064】

n は実際に存在するオリゴ糖又は多糖を構成する数とする。例えば、1000以下とすることができる。 n は5~100とすることが好ましい。

【0065】

本発明の化合物としては、単糖がグルコース、マンノース、フルクトース、またはガラクトースに代表される炭素6個からなるヘキソースである糖誘導体又はその塩が挙げられる。

40

【0066】

また、本発明の化合物としては、単糖がグルコースである糖誘導体又はその塩が挙げられる。これは発明10の糖誘導体又はその塩を示す。

【0067】

また、本発明の化合物としては、単糖がグルコースであり、このグルコースが環状に連結したオリゴ糖誘導体又はその塩が挙げられる。これは発明11の糖誘導体又はその塩を示す。より具体的には、 n が8であり、グルコースが環状に連結したオリゴ糖の誘導体又はその塩が挙げられる。

【0068】

また、本発明の抗菌活性増強剤は、上記した糖誘導体又はその塩を有効成分として含有

50

することを特徴とする。ここで「有効成分として含有する」には、糖誘導体又はその塩が抗菌活性増強剤の構造全体を構成する場合に限らず、抗菌活性増強剤の構造の一部を構成する場合も含まれる。これは発明12の抗菌活性増強剤を示す。

【0069】

<分子設計>

本発明の抗菌物質を合成するにあたっては、以下のコンセプトにより分子設計を行った。

【0070】

ペプチドが細菌膜を傷害して細菌への抗菌性(すなわち、抗菌作用)を実現するためには、アミノ基を持つアミノ酸が複数個存在することが重要になる。そこで、シクロデキストリン上にアミノ基を集積させる。そのためにシクロデキストリンのグルコース部分にトリアゾール部を介してアミノ基を含む構造を連結することで、親水性でかつ陽イオン性部分を構成する。細菌膜を傷害する際には、この部分がまず細菌膜の陰イオン性リン酸部と結合することで細菌膜を傷害する。これに加えて疎水性部がある場合には細菌膜の脂肪鎖と相互作用する。しかし、陽イオン性部分と疎水性部のバランスがとれていなければ、抗菌性または抗菌活性増強性は現れない。それを可能にするのが疎水性部として二級水酸基の水素原子と置換したプロパノイル基である。このようにアミノ基を含む構造がトリアゾール部を介して導入され、かつ疎水性部を併せ持つグルコースを複数個含むことが、シクロデキストリン誘導体が抗菌物質として機能するために重要である。これが発明5の糖誘導体又はその塩とその作用である。そして同様にグルコースが鎖状に連なって形成されたオリゴ糖、さらには鎖状又は環状に連なって形成された多糖において、そのグルコース部に同様に構造を導入すれば抗菌性を現すと考えられる。これが発明4の糖誘導体又はその塩とその作用である。

10

20

【0071】

さらに、グルコースの異性体にはマンノースに代表される単糖ヘキソースがある。これらはグルコースと同じ数の炭素と水酸基を持ち、同様の親水性を持つ。そして、それが連なったオリゴ糖~多糖が存在し、代表としてマンナンがある。これらもまた、その繰り返し構造である単糖の上に同様にして構造を導入すれば抗菌性を現すと考えられる。これが発明1乃至3の糖誘導体又はその塩とその作用である。

【0072】

そして、上記のいずれか1項に記載のオリゴ糖~多糖の誘導体又はその塩を有効成分として含有するものは抗菌剤となる。これは発明6の抗菌剤を示す。ここで「有効成分として含有する」には、オリゴ糖~多糖の誘導体又はその塩が抗菌剤の構造全体を構成する場合に限らず、構造の一部を構成する場合も含まれる。

30

【0073】

一方で、疎水性部として二級水酸基の水素原子と置換したアセチル基またはプロパノイル基である場合、このようにアミノ基を含む構造がトリアゾール部を介して導入され、かつ疎水性部を併せ持つグルコースを複数個含むことが、シクロデキストリン誘導体が抗菌活性増強剤として機能するために重要である。これは、グルコースが環状に連なって形成されたオリゴ糖でも同様と考えられる。これが発明11の糖誘導体又はその塩とその作用である。そして同様にグルコースが鎖状に連なって形成されたオリゴ糖、さらには鎖状又は環状に連なって形成された多糖において、そのグルコース部に同様に構造を導入すれば抗菌活性増強剤を現すと考えられる。これが発明10の糖誘導体又はその塩とその作用である。

40

【0074】

さらに、グルコースの異性体にはマンノースに代表される単糖ヘキソースがある。これらはグルコースと同じ数の炭素と水酸基を持ち、同様の親水性を持つ。そして、それが連なったオリゴ糖~多糖が存在し、代表としてマンナンがある。これらもまた、その繰り返し構造である単糖の上に同様にして構造を導入すれば抗菌活性増強性を現すと考えられる。これが発明7乃至9の糖誘導体又はその塩とその作用である。

50

【 0 0 7 5 】

そして、上記のいずれか 1 項に記載のオリゴ糖～多糖の誘導体又はその塩を有効成分として含有するものは抗菌活性増強剤となる。これは発明 1 2 の抗菌活性増強剤を示す。ここで「有効成分として含有する」には、オリゴ糖～多糖の誘導体又はその塩が抗菌剤および抗菌活性増強剤の構造全体を構成する場合に限らず、構造の一部を構成する場合も含まれる。

【実施例】


【 0 0 7 6 】

実施例 1 にて化学式 (1 1) に示す化合物 (a)、すなわち、シクロデキストリン誘導体 (a) を合成すると共に抗菌性と抗菌活性増強作用を実施例 2 から 4 で確認した。化合物 (a) は、一般式 (2) において、 $R^1 = CH_2NH_2$ 、 $n = 8$ とした化合物に相当する。

10

【 0 0 7 7 】

【化 8】



20

(11)

【 0 0 7 8 】

(実施例 1)

化学式 (1 1) に示すシクロデキストリン誘導体 (a) の合成法について詳細に記載する。オクタアジ化シクロデキストリン 3 2 7 . 2 m g ($2 . 1 9 \times 1 0^{-4} m o l$) をピリジン 1 0 . 0 m l に溶解し、DMA P 8 5 . 2 m g ($6 . 9 7 \times 1 0^{-4} m o l$)、無水プロピオン酸 計 5 . 4 m l ($4 . 2 \times 1 0^{-2} m o l$) を加え、攪拌した。4 7 時間後、メタノールを加え、溶液を減圧留去し、酢酸エチル 1 0 0 m l を加え、水、塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水を用いて洗浄した。溶媒を減圧留去し、順相シリカゲルカラム (ヘキサン/酢酸エチル) にて精製した。該当分画を回収し、溶媒を減圧留去し、プロパノエート 3 6 2 . 5 m g ($1 . 5 1 \times 1 0^{-4} m o l$ 、6 9 . 3 %) を得た。このプロパノエートのアセトン溶液 2 . 0 m l (2 4 . 2 m g / m l、 $2 . 0 2 \times 1 0^{-5} m o l$) に、 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 水溶液 4 0 0 μ l (1 0 . 3 m g / m l、 $1 . 6 4 \times 1 0^{-5} m o l$)、Boc-プロパルギルアミンの DMSO 溶液 2 . 0 m l (1 5 . 7 m g / m l、 $2 . 0 2 \times 1 0^{-4} m o l$) を加え、マイクロ波加熱 (1 0 0) 下で 3 0 分間攪拌した。反応溶液に酢酸エチル 5 0 m l を加え、5 % EDTA 二ナトリウム二水和物水溶液を用いた洗浄し、和食塩水、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、順相シリカゲルカラム (塩化メチレン/メタノール) にて精製した。該当分画を回収し、溶媒を減圧留去し、クリック反応生成物 6 5 . 3 m g ($1 . 8 0 \times 1 0^{-5} m o l$ 、8 9 . 0 %) を得た。このクリック反応生成物 4 2 . 1 m g ($1 . 1 6 \times 1 0^{-5} m o l$) にトリフルオロ酢酸 2 . 0 m l を加え、室温で 3 . 5 時間攪拌した。溶液を減圧留去して、凍結乾燥によりシクロデキストリン誘導体 (a) 3 8 . 4 m g ($1 . 0 3 \times 1 0^{-5} m o l$ 、8 個のトリフルオロ酢酸塩として 8 8 . 5 %) を得た。これ

30

40

50

は発明 1 乃至 6 記載の糖誘導体の塩が製造できることを示す。

【 0 0 7 9 】

^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ = 1.03(42H, OCOCH₂CH₃), 2.38-2.16(28H, OCOCH₂CH₃), 3.61(7H, H-4), 4.06-3.99(14H, CH₂NH₃⁺), 4.39(7H, H-5), 4.72-4.65(21H, H-2, 6), 5.35-5.29(14H, H-1, 3), 8.11(7H, CH-triazole), 8.39(21H, CH₂NH₃⁺),

^{13}C NMR (125 MHz, DMSO- d_6): δ = 173.18-172.63(C=O), 140.32(CH-triazole), 126.19(C-triazole), 96.00(C-1), 76.21(C-4), 69.63(C-2,3,5), 49.52(C-6), 33.88(CH₂NH₃⁺), 26.64(CH₂CH₃), 8.69-8.56(CH₂CH₃)

MS: [M+Na]⁺ Calcd. for C₁₂₀H₁₇₆N₃₂NaO₄₈: 2856.2212, Found: 2856.5737

Anal: Calcd For C₁₂₀H₁₇₆N₃₂O₄₈+ 16H₂O+8CF₃COOH: C 40.48, H 5.40, N 11.11. Found: C 40.63, H 5.30, N 10.84

10

【 0 0 8 0 】

(実施例 2)

上記のようにして合成した実施例 1 のシクロデキストリン誘導体 (a) の抗菌性を最小発育阻止濃度で評価した。評価にはグラム陽性菌として枯草菌、グラム陰性菌として大腸菌を使用した。また、グラム陽性菌として黄色ブドウ球菌、グラム陰性菌としてネズミチフス菌、緑膿菌も使用した。

【 0 0 8 1 】

評価方法は以下の通りである。すなわち、細菌は一般細菌用乾燥ブイヨンあるいはポリペプトンを加えた最小塩培地で培養し、対数増殖期の状態のものを使用し、37℃で20時間、培養することにより、試験化合物がその細菌の生育を阻止した最小濃度とした。なお初期の菌濃度は 1×10^4 細胞/mL とした。求めた最小発育阻止濃度 (MIC) を表 1 に示す。

20

【 0 0 8 2 】

【表 1】

	最小発育阻止濃度 ($\mu\text{g}/\text{mL}$)				
	枯草菌	黄色ブドウ球菌	大腸菌	ネズミチフス菌	緑膿菌
化合物 (a) (実施例 1)	8	32	16	32	8
化合物 (b)	> 256	> 256	> 256	> 256	> 256
化合物 (c)	256	> 256	> 256	> 256	

30

【 0 0 8 3 】

上記表 1 に示すように、実施例 1 の化合物 (a) は強力な抗菌性を示した。化学式 (12) に示す化合物 (b) および化学式 (13) に示す化合物 (c) を比較対象とした。化合物 (b)、(c) は、抗菌性を有する化合物として特許文献 3 に記載されている。化合物 (b) は、一般式 (2) において、R¹ = CH₂NH₂、n = 8 とし、プロパノイル基をアセチル基に置き換えた化合物に相当する。化合物 (c) は、一般式 (2) において、R¹ = CH₂NH₂、n = 8 とし、プロパノイル基をブタノイル基に置き換えた化合物に相当する。

40

【 0 0 8 4 】


ここで、化合物 (a) と化合物 (b) を、同一条件下で最小発育阻止濃度を測定した結果、表 1 に示すように化合物 (a) の大腸菌に対する最小発育阻止濃度は $16 \mu\text{g}/\text{mL}$ であり、一方、化合物 (b) のそれは $> 256 \mu\text{g}/\text{mL}$ であった。化合物 (a) の抗菌性は化合物 (b)、(c) のそれに比べて著しく優れていることが示された。さらに、他の細菌に対しても化合物 (a) の最小発育阻止濃度は化合物 (b)、(c) のそれよりも顕著に小さい。特に、枯草菌、緑膿菌に対する最小発育阻止濃度は一般に強力な抗菌性ありとされ

50

る $10 \mu\text{g}/\text{mL}$ 以下であることは特筆に価する。総じて、化合物(a)が抗菌剤として化合物(b)、(c)に比べて著しく進歩していることを示している。


【0085】

【化9】



(12)

10



(13)

20

30

【0086】

(実施例3)

別に、化合物(b)について他の抗菌物質の活性増強作用について検討した。化合物(b)による他の抗菌物質の活性増強作用についての試験結果を表2に示す。化合物(b)は、化学式(6)において、 R^3 がアミノメチル基であり、 R^4 がアセチル基であり、 n が8である化合物に相当する。なお、特許文献3には、化合物(b)の活性増強作用については記載されていない。

【0087】

既存の抗菌物質の中には、細菌膜が物理的障壁となり、本来の抗菌性を発揮できないものが存在する。この場合、その物質の細菌の発育を阻止するために必要な最小濃度(最小発育阻止濃度(MIC))は大きな値となり、抗菌活性はないと見なされる。特に、細胞質膜に加えて外膜を擁するグラム陰性菌については、これによる薬剤耐性が顕著である。それゆえ細菌膜を傷害して物理的障壁を排除できる膜傷害性物質と抗菌物質とを併用すれば抗菌性がより増強される、さらには抗菌性がなかったものが有効になる、と合理的に推定できる。この場合、最小発育阻止濃度(MIC)は単独で使用した場合より減少して小さな値となる。ここではグラム陰性菌について効果が弱いと一般的にされるノボピオシンまたはエリスロマイシンを、他の抗菌物質として用いた。

【0088】

40

50

細菌として大腸菌と緑膿菌を用いて試験を行った。大腸菌に対するノボピオシンの単独での最小発育阻止濃度は128 $\mu\text{g}/\text{mL}$ であり、緑膿菌に対するそれは2046 $\mu\text{g}/\text{mL}$ である。またシクロデキストリン誘導体(b)の大腸菌に対する最小発育阻止濃度は表1に示すように>256 $\mu\text{g}/\text{mL}$ であり、本試験でのシクロデキストリン誘導体(b)併用濃度では抗菌性を示さない。この条件下での試験において、シクロデキストリン誘導体(b)併用投与下でのノボピオシンの最小発育阻止濃度は著しく減少し、ノボピオシンは顕著な抗菌活性を示した。シクロデキストリン誘導体(b)は大腸菌に対しては128倍(128/1)、一般に抗菌剤に耐性を示す緑膿菌に対しても、16倍(2048/128)の強力な抗菌性をノボピオシンに現せしめた。さらにエリスロマイシンの最小発育阻止濃度も著しく減少させ、シクロデキストリン誘導体(b)は顕著な抗菌活性増強作用を示した。

10

【0089】

すなわち、大腸菌において、シクロデキストリン誘導体(b)の併用濃度が0 $\mu\text{g}/\text{mL}$ の場合、ノボピオシンの最小発育阻止濃度(MIC)は、128 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 、エリスロマイシンの最小発育阻止濃度(MIC)は、64 $\mu\text{g}/\text{mL}$ である。一方、シクロデキストリン誘導体(b)の併用濃度が32 $\mu\text{g}/\text{mL}$ の場合、ノボピオシンの最小発育阻止濃度(MIC)は、1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 、エリスロマイシンの最小発育阻止濃度(MIC)は、1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ となる。

【0090】

【表2】

20

細菌	シクロデキストリン誘導体(b)の併用濃度 $\mu\text{g}/\text{mL}$	ノボピオシンの最小発育阻止濃度(MIC) $\mu\text{g}/\text{mL}$	エリスロマイシンの最小発育阻止濃度(MIC) $\mu\text{g}/\text{mL}$
大腸菌	0	128	64
	8	16	
	16	2	1
	32	1	1
緑膿菌	0	2048	256
	16	256	32
	32	128	32

30

【0091】

(実施例4)

次に、化学式(11)に示す化合物(a)の抗菌活性増強作用について実施例3と同様に試験を行った。その試験結果を表3に示す。シクロデキストリン誘導体(a)の大腸菌に対する最小発育阻止濃度は表1に示すように16 $\mu\text{g}/\text{mL}$ であり、表3に示す本試験でのシクロデキストリン誘導体(a)の併用濃度では抗菌性を示さない。この条件下での試験において、シクロデキストリン誘導体(a)併用投与下でのノボピオシンまたはエリスロマイシンの最小発育阻止濃度は著しく減少し、化合物(a)は顕著な抗菌活性増強作用を示した。

40

【0092】

一方、比較として試験したシクロデキストリン誘導体(c)は32 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 併用してもノボピオシンの発育阻止濃度は128 $\mu\text{g}/\text{mL}$ のままであり、抗菌活性増強は見られなかった。これは、アミノ基を含む構造を導入しても、それと疎水性部のバランスがとれていなければ抗菌活性増強性は現れないことを示し、疎水性部として二級水酸基の水素原子と置換したアセチル基またはプロパノイル基が抗菌活性増強性を可能にした結果である。これは、発明12記載の抗菌活性増強剤としての作用を示す。

【0093】

【表 3】

細菌	シクロデキストリン誘導体(a)の併用濃度 $\mu\text{g}/\text{mL}$	ノビオシンの最小発育阻止濃度 (MIC) $\mu\text{g}/\text{mL}$	エリスロマイシンの最小発育阻止濃度 (MIC) $\mu\text{g}/\text{mL}$
大腸菌	0	128	64
	2	8~64	
	4	8~32	4


【0094】

(実施例5)


その他として、化学式(14)に示す化合物(d)と、化学式(15)に示す化合物(e)を合成した。化合物(d)は、一般式(2)において、 $R^1 = \text{CH}_2\text{NH}_2$ 、 $n = 7$ とした化合物に相当する。化合物(e)は、一般式(2)において、 $R^1 = \text{CH}_2\text{NH}_2$ 、 $n = 6$ とした化合物に相当する。化合物(d)、(e)の合成では、化学式(11)に示す化合物(a)の合成に使用したオクタアジ化シクロデキストリンに換えて、ヘプタアジ化シクロデキストリン、ヘキサアジ化シクロデキストリンをそれぞれ用いた。そして、化合物(d)、(e)の抗菌性を、実施例3に記載の方法と同様に、最小発育阻止濃度で評価した。最小発育阻止濃度の測定結果を表4に示す。

【0095】

【化10】



(14)



(15)

【0096】

10

20

30

40

【表 4】

	最小発育阻止濃度 ($\mu\text{g}/\text{mL}$)				
	枯草菌	黄色ブドウ球菌	大腸菌	ネズミチフス菌	緑膿菌
化合物 (d)	4	16	8	16	8
化合物 (e)	8	16	8	16	8

【0097】

上記表 4 に示すように、化合物 (d)、(e) は、強力な抗菌性を示した。したがって、化合物 (a)、(d)、(e) のいずれも、グラム陽性菌、グラム陰性菌に対しても強い抗菌性を有する。

10

【0098】


(実施例 6)

さらに、化学式 (16) に示す化合物 (f) を合成した。化合物 (f) は、一般式 (2) において、 $R^1 = \text{CH}_2\text{NH}_2$ 、 $n = 7$ とし、プロパノイル基をアセチル基に置き換えた化合物に相当する。また、化合物 (f) は、一般式 (6) において、 $R^3 = \text{CH}_2\text{NH}_2$ 、 $R^4 = \text{アセチル基}$ 、 $n = 7$ とした化合物に相当する。化合物 (f) の合成では、化学式 (11) に示す化合物 (a) の合成に使用したオクタアジ化シクロデキストリンに換えてヘプタアジ化シクロデキストリンを用い、無水プロピオン酸に換えて無水酢酸を用いた。

20

【0099】

【化 11】



30

(16)

【0100】

40

【表 5】

細菌	シクロデキストリン誘導体(f)の併用濃度 μg/mL	ノボビオシンの最小発育阻止濃度(MIC) μg/mL	エリスロマイシンの最小発育阻止濃度(MIC) μg/mL
大腸菌	0	128	64
	8	16	16
	16	4	1
	32	2	1
緑膿菌	0	2048	256
	16	256	64
	32	256	64

10

【0101】

上記表5に示すように、化合物(f)、すなわち、シクロデキストリン誘導体(f)併用投与下でのノボビオシンまたはエリスロマイシンの最小発育阻止濃度は著しく減少した。このように、化合物(f)は顕著な抗菌活性増強作用を示した。したがって、化合物(b)、(f)のいずれも、強い抗菌活性増強剤としての作用を有する。

【0102】

以上の結果から、シクロデキストリンにアミノ基をクリック反応で導入し、二級水酸基上にプロパノイル基を導入した化合物は、抗菌性を発現する上で有効であることが分かった。また、ここで示された抗菌性はその分子設計から膜傷害機構に起因するものと合理的に推定され、シクロデキストリンを利用して抗菌性を発現する物質を構築する前述の分子設計の有効性を実証している。

20

【0103】

そして、ここでは、シクロデキストリンのグルコース部分にトリアゾール部を介してアミノ基を含む構造を連結し、あわせてプロパノイル基を導入することで細菌への抗菌性を発現させた。これはグルコースの性質を利用して抗菌物質ができることを示している。それゆえに、シクロデキストリンと同様にグルコースからなるオリゴ糖～多糖に構造を導入することで抗菌物質ができると考えられる。さらに、グルコースの異性体で同様の性質を持つ単糖からなるオリゴ糖～多糖、そして環状に連結した糖のみならず鎖状に連結した糖、からも抗菌物質ができることを合理的に推論できる。

30

【0104】

なお、ここでは、アミノ基を含む構造としてアミノメチル基を用いた。上述の通り、シクロデキストリンにアミノ基を導入し、二級水酸基上にプロパノイル基を導入することで抗菌性が発現した。このため、アミノ基を含む構造がアミノメチル基以外の構造であっても、抗菌物質が得られることは合理的に推論できる。

【0105】

シクロデキストリンにアミノ基をクリック反応で導入し、二級水酸基上にアセチル基、プロパノイル基を導入した化合物については抗菌活性増強作用を発現する上で有効である。その性能はその分子設計から膜傷害機構に起因するものと合理的に推定され、シクロデキストリンを利用して抗菌活性増強作用を発現する物質を構築する前述の分子設計の有効性を実証している。また、これはシクロデキストリンと同様にグルコースからなるオリゴ糖～多糖に構造を導入することで抗菌活性増強作用物質ができると考えられる。さらに、グルコースの異性体で同様の性質を持つ単糖からなるオリゴ糖～多糖、さらに環状に連結した糖のみならず鎖状に連結した糖からも抗菌活性増強作用物質ができることを合理的に推論できる。

40

【0106】

なお、ここでは、アミノ基を含む構造としてアミノメチル基を用いた。上述の通り、シクロデキストリンにアミノ基をクリック反応で導入し、二級水酸基上にアセチル基、プロパノイル基を導入することで、抗菌活性増強作用が発現したと考えられる。このため、ア

50

ミノ基を含む構造がアミノメチル基以外の構造であっても、抗菌活性増強作用物質が得られることは合理的に推論できる。

【0107】

この発明は上記発明の実施の態様及び実施例の説明に何ら限定されるものではない。特許請求の範囲を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの発明に含まれる。

【産業上の利用可能性】

【0108】

本発明の糖誘導体又はその塩は抗菌剤や抗菌活性増強剤として利用可能である。

【手続補正書】

【提出日】平成30年5月23日(2018.5.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】


(削除)

【請求項2】

下記の(18)の化学式で示される、抗菌作用のある糖誘導体又はその塩。

ここで、(18)の化学式はグルコースがグリコシド結合で環状に連結したシクロデキストリンの誘導体を示す。R²はメチレン基を示す。nは6、7または8である。

【化12】



(18)

【請求項3】

nは8である請求項2に記載の糖誘導体又はその塩。

【請求項4】

(削除)

【請求項5】

(削除)

【請求項6】

請求項2または3に記載の糖誘導体又はその塩を有効成分として含有する抗菌剤。

【請求項7】


(削除)

【請求項8】

下記の(19)または(20)の化学式で示される、抗菌活性増強作用のある糖誘導体又はその塩を有効成分として含有する抗菌活性増強剤。

ここで、(20)の化学式はグルコースがグリコシド結合で環状に連結したシクロデキストリンの誘導体を示す。(19)の化学式はグルコースがグリコシド結合で鎖状に連結した糖の誘導体を示す。R⁵はアルキレン基を示す。nは5以上100以下の整数を示す

【化 1 3】



【請求項 9】

前記(20)の化学式で示され、

R⁵ はメチレン基であり、n は 8 である請求項 8 に記載の抗菌活性増強剤。

【請求項 10】

(削除)

【請求項 11】

(削除)

【請求項 12】


(削除)

【請求項 13】

下記の(21)または(22)の化学式で示される糖誘導体又はその塩を有効成分として含有する抗菌活性増強剤。

ここで、(22)の化学式はグルコースがグリコシド結合で環状に連結したシクロデキストリンの誘導体を示す。(21)の化学式はグルコースがグリコシド結合で鎖状に連結した糖の誘導体を示す。R⁵ はアルキレン基を示す。n は 5 以上 100 以下の整数を示す。

【化 1 4】



【請求項 14】

前記糖誘導体は前記(22)の化学式で示され、

R⁵ はメチレン基であり、n は 7 または 8 である請求項 13 に記載の抗菌活性増強剤。

【請求項 15】

(削除)

【請求項 16】

(削除)

【請求項 17】

(削除)

【請求項 18】

前記(20)の化学式で示される請求項 8 に記載の抗菌活性増強剤。

【請求項 19】

前記 R⁵ はメチレン基である請求項 8 または 18 に記載の抗菌活性増強剤。

【請求項 20】

前記 n は 6、7 または 8 である請求項 8 または 18 に記載の抗菌活性増強剤。

【請求項 21】

前記糖誘導体は前記 (22) の化学式で示される請求項 13 に記載の抗菌活性増強剤。

【請求項 22】

前記 R⁵ はメチレン基である請求項 13 または 21 に記載の抗菌活性増強剤。

【請求項 23】

前記 n は 6、7 または 8 である請求項 13 または 21 に記載の抗菌活性増強剤。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2017/032426
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
Int.Cl. C08B30/18 (2006. 01)i, A61K31/724 (2006. 01)i, A61P31/04 (2006. 01)i, C07H19/056 (2006. 01)i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl. C08B30/18, A61K31/724, A61P31/04, C07H19/056		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Japanese Published Examined Utility Model Applications		1922-1996
Japanese Published Unexamined Utility Model Applications		1971-2017
Japanese Examined Utility Model Registrations		1996-2017
Japanese Registered Utility Model Specifications		1994-2017
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAplus/REGISTRY (STN)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2013-177477 A (NAGOYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 09 September 2013, paragraphs [0047], [0050], table 1, claims 3, 4 etc (Family: none)	1-6, 8-11
X	JP 2016-53152 A (NAGOYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 14 April 2016, paragraph [0046], example 1, tables 1-2, claims 3, 5 etc (Family: none)	1, 4-7, 10-12
A	JP 2012-523489 A (CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)) 4 October 2012, entire text & US 2012/0129919 A1 & WO 2010/119158 A1 & EP 2420518 A1	1-12
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 09 November 2017 (09.11.2017)		Date of mailing of the international search report 28 November 2017 (28.11.2017)
Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan		Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/032426

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	MENDEZ-ARDOY, A. et al, B-Cyclodextrin-based polycationic amphiphilic "click" clusters. Effect of structural modifications in their DNA complexing and delivery properties, <i>Journal of Organic Chemistry</i> , 2011, vol. 76, no. 15, pp. 5882-5894, ISSN: 0022-3263	1-12
A	JP 2014-111562 A (NAGOYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 19 June 2014, entire text (Family: none)	1-12
A	CN 105085693 A (YANTAI INSTITUTE OF COASTAL ZONE RESEARCH, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES) 25 November 2015, entire text (Family: none)	1-12
A	下原恭兵他, 1027 クリック反応を用いた多置換シクロデキストリンの合成, 第 39 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会講演予稿集, 2008, pp. 94, (39th Annual Meeting of Union of Chemistry-Related Societies in Chubu Area, Japan) non-official translation (SHIMOHARA, Kyohei et al., Synthesis of polysubstituted cyclodextrin using 1027 click reaction)	1-12
A	倉田竜児他, 2B3-43 マイクロ波支援クリック反応を用いた抗菌性シクロデキストリンの合成, 日本化学会第 90 春季年会 (2010) 講演予稿集 III, 2010, pp. 625 non-official translation (KURATA, Ryuji et al., Synthesis of antibiotic cyclodextrin using 2B3-43 microwave-supported click reaction, Abstracts III of the meeting, The Chemical Society of Japan, 90th Spring Annual Meeting (2010))	1-12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/032426

<Limitation of search scope>

Since the invention in claims 1-12 is unclear and not fully supported by the description under PCT Articles 5 and 6, sufficient and meaningful search for prior arts cannot be carried out. Therefore, the search report was made after limiting the invention in claims 1-12 to the scope that is supported and disclosed by the description, that is, limiting the invention in claims 1-6 to compounds based on the chemical structure of the compounds represented by formulae (11) and (14)-(15) that have been specifically produced/used in examples of the description; and limiting the invention in claims 7-12 to compounds that are based on the chemical structure of the compounds represented by formulae (11)-(12) and (14)-(16) and have 1,4-glycosidic linkages.

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 7 / 0 3 2 4 2 6	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. C08B30/18(2006.01)i, A61K31/724(2006.01)i, A61P31/04(2006.01)i, C07H19/056(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. C08B30/18, A61K31/724, A61P31/04, C07H19/056			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2017年 日本国実用新案登録公報 1996-2017年 日本国登録実用新案公報 1994-2017年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CAplus/REGISTRY (STN)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	
X	JP 2013-177477 A (国立大学法人 名古屋工業大学) 2013.9.9, 段落【0047】、【0050】、表1および請求項3, 4等 (ファミリーなし)	1-6, 8-11	
X	JP 2016-53152 A (国立大学法人 名古屋工業大学) 2016.4.14, 段落【0046】、実施例1、表1~2および請求項3, 5等 (ファミリーなし)	1, 4-7, 10-12	
A	JP 2012-523489 A (コンセホ スペリオール デ インベスティガシオ	1-12	
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献	
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの	
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの	
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)		「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの	
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」同一パテントファミリー文献	
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願			
国際調査を完了した日 09.11.2017		国際調査報告の発送日 28.11.2017	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 早川 裕之	4 P 4500
		電話番号 03-3581-1101 内線 3492	

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2017/032426
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
	ネス シエンティフィカス (セエセイセ) 2012. 10. 4, 全文 & US 2012/0129919 A1 & WO 2010/119158 A1 & EP 2420518 A1	
A	MENDEZ-ARDOY, A. et al, β -Cyclodextrin-based polycationic amphiphilic "click" clusters. Effect of structural modifications in their DNA complexing and delivery properties, Journal of Organic Chemistry, 2011, Vol. 76, No. 15, p. 5882-5894, ISSN: 0022-3263	1-12
A	JP 2014-111562 A (国立大学法人 名古屋工業大学) 2014. 6. 19, 全文 (ファミリーなし)	1-12
A	CN 105085693 A (YANTAI INSTITUTE OF COASTAL ZONE RESEARCH, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES) 2015. 11. 25, 全文 (ファミリーなし)	1-12
A	下原恭兵 他, 1027 クリック反応を用いた多置換シクロデキストリンの合成, 第 39 回中部化学関係学協会支部連合秋季大会講演予稿集, 2008, pp. 94	1-12
A	倉田竜児 他, 2 B3-43 マイクロ波支援クリック反応を用いた抗菌性シクロデキストリンの合成, 日本化学会第90春季年会(2010)講演予稿集 III, 2010, pp. 625	1-12

国際調査報告

国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 7 / 0 3 2 4 2 6

<調査範囲限定>

請求項1-12に係る発明はPCT第5条および第6条の意味において明確性、明細書による十分な裏付けを欠いたものであるから、十分かつ有意義な先行技術調査をすることができない。したがって、請求項1-12に係る発明については明細書に裏付けられ開示されている範囲、すなわち、請求項1-6に記載の発明については明細書の実施例で具体的に製造/使用されたと解される化学式(11)、(14)～(15)で表される化合物の化学構造を基にする化合物であって1,4-グリコシド結合を有する化合物;請求項7-12に記載の発明については同化学式(11)～(12)、(14)～(16)で表される化合物の化学構造を基にする化合物であって1,4-グリコシド結合を有する化合物に限定して調査報告を作成した。



フロントページの続き

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT

Fターム(参考) 4C090 AA02 AA09 BB02 BB04 BB12 BB36 BB53 BB62 DA23

【要約の続き】

【化3】



【選択図】なし

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。